


ALGIRDAS AMBRAZEVIČIUS

Matematinis modeliavimas



Vilniaus universitetas
2004

TURINYS

1 SKYRIUS

PAPRASČIAUSI MATEMATINIAI MODELIAI	4
1.1 Pagrindinės sąvokos	4
1.2 Fundamentaliai gamtos dėsnių taikymas	8
1.3 Variacinio skaičiavimo elementai	16
1.4 Variaciinių principų taikymas	24
1.5 Keli paprasčiausiai netiesinių procesų modeliai	33
1.6 Stygos svyravimų lygtis	39
1.7 Membranos svyravimas ir pusiausvyra	42
1.8 Šilumos laidumas ir dujų difuzija	45
1.9 Ekologiniai modeliai	49

2 SKYRIUS

PIRMOS EILĖS DIFERENCIALINĖS LYGTYS	63
2.1 Pirmosios eilės paprastosios diferencialinės lygtys išreikštос išvestinės atžvilgiu	63
2.2 Sprendinių egzistavimas, vienatis, pratęsimas	67
2.3 Lygtys su atskiriamais kintamaisiais	71
2.4 Tiesinės pirmos eilės lygtys	76
2.5 Pirmos eilės diferencialinių lygčių simetrinė forma	81
2.6 Pirmos eilės diferencialinės lygtys neišreikštос išvestinės atžvilgiu	84

3 SKYRIUS

AUKŠTESNĖS EILĖS PAPRASTOSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS	87
3.1 Paprasčiausios aukštesnės eilės diferencialinės lygtys, kurių eilę galima sumažinti	87
3.2 Tiesinės homogeninės antros eilės lygtys	90
3.3 Konstantų variavimo metodas	94
3.4 Tiesinės antros eilės lygtys su pastoviais realiais koeficientais	99

4 SKYRIUS

DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS	106
4.1 Bendros sąvokos	106
4.2 Tiesinės homogeninių diferencialinių lygčių sistemos	110
4.3 Nehomogeninės tiesinių diferencialinių lygčių sistemos	114
4.4 Tiesinių diferencialinių lygčių sistemos su pastoviais realiais koeficientais	116
4.5 Kanoninių sistemų plokštumoje faziniai portretai	123

5 SKYRIUS

AUTONOMINĖS SISTEMOS	130
5.1 Autonominių lygtys tiesėje	130
5.2 Autonominių sistemų plokštumoje	133
5.3 Autonominių sistemų trajektorijos	142
5.4 Autonominių sistemų plokštumoje pusiausvyros taškai	145

6 SKYRIUS

DALINIŲ IŠVESTINIŲ LYGTYS	153
6.1 Tiesinių antros eilės lygčių su dviem nepriklausomais kintamaisiais suvedimas į kanoninį pavidalą	153
6.2 Pagrindiniai uždaviniai	158
6.3 Charakteristikų metodas	160
6.4 Furjė arba kintamųjų atskyrimo metodas	164
6.5 Integralinių Furjė transformacijų metodas	171

7 SKYRIUS

SKAITINIAI DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMO METODAI	177
7.1 Runge – Kuto metodas pirmos eilės paprastajai diferencialinei lygčiai	177
7.2 Runge – Kuto metodas pirmos eilės diferencialinių lygčių sistemai	181
7.3 Runge – Kuto metodas aukštesnės eilės paprastajai diferencialinei lygčiai	183
7.4 Baigtinių skirtimų metodas elipsinės lygties atveju	185
7.5 Baigtinių skirtimų metodas parabolinės lygties atveju	192
7.6 Baigtinių skirtimų metodas hiperbolinės lygties atveju	197
Literatūra	200

1 SKYRIUS

PAPRASČIAUSI MATEMATINIAI MODELIAI

1.1 PAGRINDINĖS SAVOKOS

Sprendžiant gamtos ir technikos mokslų uždavinius naudojami įvairūs matematiniai modeliai. Dažniausiai jie aprašomi viena arba keliomis lygtimis, siejančiomis nepriklausomus kintamuosius, ieškomają funkciją ir jos išvestines. Tokios lygtys yra vadinamos *diferencialinėmis lygtimis*. Jeigu diferencialinėje lygyje yra tik vieną nepriklausomas kintamasis, tai tokią lygtį vadiname *paprastaja diferencialine lygtimi*. Priešingu atveju diferencialinė lygtis vadina *dalinių išvestinių lygtimi*. Lygtis vadina *k-osios eilės lygtimi*, jeigu į ją įeina ieškomos funkcijos *k*-osios eilės išvestinė ir neįeina aukštesnių eilių išvestinės.

Pavyzdžiui lygtis

$$y' = y^2$$

yra pirmos eilės paprastoji diferencialinė lygtis. Lygtis

$$y'' + 3y' + y = 0$$

yra antrosios eilės paprastoji diferencialinė lygtis, o lygtis

$$\sqrt{x}u_x + \sqrt{y}u_y + \sqrt{z}u_z = 0$$

yra pirmos eilės dalinių išvestinių lygtis.

Bendruoju atveju *k*-osios eilės paprastąjį diferencialinę lygtį galima užrašyti taip:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(k)}) = 0; \quad (1.1)$$

čia F – žinoma funkcija, apibrėžta kokioje nors srityje $D \subset \mathbb{R}^{k+2}$. Tokia lygtis dar gali priklausyti nuo papildomų kintamųjų λ, μ, \dots Šiuo atveju sakoma, kad ieškojomi funkcija y priklauso nuo kintamųjų λ, μ, \dots kaip nuo parametrų. Kartais (1.1) lygtį galima išspręsti aukščiausios išvestinės atžvilgiu ir užrašyti pavidalu

$$y^{(k)} = f(x, y, y', \dots, y^{(k-1)}). \quad (1.2)$$

Tada tokią lygtis vadina *normaliąja lygtimi*.

Tarkime, f yra tolydi funkcija, apibrėžta kokioje nors srityje $G \subset \mathbb{R}^{k+1}$.

A p i b r é ž i m a s. Sakysime, funkcija $\varphi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^1$, apibrėžta kokiam e nors intervale (a, b) , yra (1.2) lyties sprendinys, jeigu:

1. φ yra *k* kartų diferencijuojama intervale (a, b) .
2. Taškas $(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(k-1)}(x)) \in G$, $\forall x \in (a, b)$.

$$3. \varphi^{(k)}(x) = f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(k-1)}(x)), \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Sprendinio apibrėžimas bendresnei (1.1) lygčiai yra analogiškas.

P a s t a b a . Iš funkcijos f tolydumo bei sprendinio φ apibrėžimo išplaukia, kad išvestinė $\varphi^{(k)}$ yra tolydi intervale $\langle a, b \rangle$ funkcija. Be to, sprendinio apibrėžimo sritis yra jungioji aibė, t.y. intervalas $\langle a, b \rangle$.

Tegu (1.1) lygtje funkcija F yra tiesinė ieškomos funkcijos ir visų jos išvestinių atžvilgiu. Tada tokia lygtis vadinama *tiesinė k-osios eilės lygtimi*. Ją galima užrašyti taip:

$$y^{(k)} + a_1(x)y^{(k-1)} + a_2(x)y^{(k-2)} + \dots + a_{k-1}(x)y' + a_k(x)y = f(x). \quad (1.3)$$

Nagrinėjant tiesinę k -osios eilės lygtį patogu lygiagrečiai nagrinėti *tiesinę homogeninę k-osios eilės lygtį*

$$y^{(k)} + a_1(x)y^{(k-1)} + a_2(x)y^{(k-2)} + \dots + a_{k-1}(x)y' + a_k(x)y = 0. \quad (1.4)$$

Kai (1.3) arba (1.4) lygtje koeficientai $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ yra pastovūs, tai tokios lygtys yra vadinamos tiesinėmis k -osios eilės lygtimis su pastoviais koeficientais

Tarkime, (1.1), (1.2), (1.3) ir (1.4) lygtyste $k = 1$. Tada pastarosios lygtys yra pirmosios eilės paprastosios diferencialinės lygtys ir jas galima užrašyti taip:

$$\begin{aligned} F(x, y, y') &= 0, & y' &= f(x, y), \\ y' + p(x)y &= f(x), & y' + p(x)y &= 0. \end{aligned}$$

Paprastųjų diferencialinių lygčių teorijoje nagrinėjama ne tik viena lygtis, bet ir lygčių sistemos. Pavyzdžiu, pirmosios eilės n lygčių sistemą, išreikštą išvestinių atžvilgiu, galima užrašyti taip:

$$\begin{cases} y'_1 &= f_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ \vdots &\vdots \\ y'_n &= f_n(x, y_1, \dots, y_n). \end{cases} \quad (1.5)$$

Tokia sistema vadinama *normaline*. Atkreipsime dėmesį į tai, kad tokioje sistemoje ieškomų funkcijų y_1, \dots, y_n skaičius lygus lygčių skaičiui n . Pažymėjė

$$y = \text{colon}(y_1, \dots, y_n), \quad f = \text{colon}(f_1, \dots, f_n)$$

pastarają sistemą galima užrašyti vektorinėje formoje

$$y' = f(x, y). \quad (1.6)$$

P a s t a b a . Daugeliu atveju įvairias aukštesnės eilės sistemas ir lygtis galima suvesti į pirmos eilės normaliąją lygčių sistemą. Pavyzdžiu, antros eilės n lygčių sistemą

$$y'' = f(x, y, y'), \quad y = \text{colon}(y_1, \dots, y_n)$$

keitiniu $y' = w$, $w = \text{colon}(w_1, \dots, w_n)$ galima suvesti į pirmos eilės normaliajā $2n$ lygčių sistemą

$$\begin{cases} w' = f(x, y, w), \\ y' = w. \end{cases}$$

Trečios eilės lygti

$$y''' = f(x, y, y', y'')$$

keitiniu $y' = u, u' = v$ galima suvesti į pirmos eilės normaliajā 3 lygčių sistemą

$$\begin{cases} v' = f(x, y, u, v), \\ y' = u, \\ u' = v. \end{cases}$$

Tarkime, f yra tolydi funkcija, apibrėžta kokioje nors srityje $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

A p i b r ė ž i m a s . Sakysime, funkcija $\varphi : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n$ yra (1.6) sistemos sprendinys, jeigu:

1. Ji yra diferencijuojama intervale $\langle a, b \rangle$.
2. Taškas $(x, \varphi(x)) \in G, \forall x \in \langle a, b \rangle$.
3. Teisinga tapatybė $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)), \forall x \in \langle a, b \rangle$.

Konstruojant kokio nors uždavinio matematinį modelį visu pirma stebimi ji aprašantys dydžiai. Tokie dydžiai gali būti temperatūra, greitis, slėgis ir t.t. Po to atliekami įvairūs bandymai. Remiantis atliktais bandymais yra atmetami neesminiai faktoriai, kurie mažai įtakoja nagrinėjamos sistemas būseną. Apibendrinant esminius faktorius, veikiančius sistemą, formuluojama viena arba kelios hipotezės (fundamentalūs gamtos dėsniai). Jų pagalba parodoma, kad aprašantys tam tikrą procesą dydžiai turi tenkinti vieną ar kelias lygtis. Šios lygtys dažniausiai yra diferencialinės. Suradę šių lygčių sprendinius, išskiriame iš jų tuos, kurie tenkina tam tikras papildomas sąlygas. Paprastai šitos sąlygos yra apibrėžiamos srities, kurioje ieškomas sprendinys, kraštiniuose taškuose. Todėl jos yra vadintinos *kraštiniemis sąlygomis*, o nagrinėjami uždaviniai – *kraštiniais uždaviniais*. Pavyzdžiu, uždavinys, kai reikia rasti funkciją u , kuri srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ tenkintų lygtį

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

o kontūro $l = \partial\Omega$ taškuose kraštine sąlygą

$$u|_l = \varphi(x, y),$$

yra kraštinius uždavinys. Tuo atveju, kai kuris nors vienas iš kintamųjų, pavyzdžiu, laikas, yra išskiriamas iš kitų, jų atitinkančios sąlygos yra vadintinos *pradinėmis* arba *Koši sąlygomis*. Uždavinys tik su pradinėmis sąlygomis yra vadintinas *pradiniu* arba *Koši uždaviniu*. Pavyzdžiu, uždavinys, kai ieškoma fuunkcija u , kuri pusplokštumėje $\{(t, x) : t > 0\}$ tenkintų lygtį

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad a = \text{const}$$

o tiesėje $t = 0$ pradines sąlygas

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}^1$$

yra pradinis (Koši) uždavinys. Jeigu uždavinyje, be pradinių sąlygų, yra ir kitos kraštinių sąlygos, tai tokis uždavinys vadinamas *mišriuoju uždaviniu*. Pavyzdžiu, uždavinys, kai ieškoma funkcija u , kuri juosteje $\{(t, x) : t > 0, x \in (0, l)\}$ tenkintų lygtį

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad a = \text{const},$$

intervalo $(0, l)$ kraštiniuose taškuose sąlygas

$$u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0,$$

o segmente $x \in [0, l]$ pradinę sąlygą

$$u|_{t=0} = \varphi(x)$$


yra mišrusis uždavinys.

Norint įsitikinti ar sukonstruotas matematinis modelis yra geras reikia rastus sprendinius palyginti su eksperimentų rezultatais. Jeigu skirtumas yra didelis, tai matematinis modelis yra blogas ir jį reikia arba atmesti, arba modifikuoti.

1.2 FUNDAMENTALIŲ GAMTOS DĒSNIŲ TAIKYMAS

Vienas iš dažniausiai naudojamų matematinių modelių konstravimo metodų yra fundamentalių gamtos dėsnį taikymas konkrečiu atveju. Pateiksime kelis pavyzdžius.

1. Energijos tvermés dėsnis. Rasime kulkos, iššautos iš revolverio, greitį. Tuo atveju, kai eksperimentatorius neturi šiuolaikinės laboratorijos, galima pasinaudoti sąlyginai paprastu prietaisu – švytuokle. Tegu kūnas, masės M , yra pakabintas ant standaus lengvo strypo, kuris gali laisvai suktis (žr. 1.1 pav.) ir pradiniu laiko momentu nejuda.



1.1 pav.

Kulka masės m , ištrigusi kūne, perduoda jam savo kinetinę energiją. Pagal energijos tvermés dėsnį

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{(M+m)}{2}V^2(\alpha) + (M+m)gl(1 - \cos \alpha);$$

čia v – kulkos greitis, $V(\alpha)$ – sistemos "kūnas+kulka" greitis, g – laisvojo kritimo pagreitis, l – strypo ilgis, α – strypo nuokryprio kampas. Tegu α^* yra maksimalus strypo nuokryprio kampus nuo pradinės padėties. Tada greitis $V(\alpha^*) = 0$ ir šiuo momentu sistemos "kūno + kulkos" kinetinė energija pereina į potencinę. Taigi

$$\frac{mv^2}{2} = (M+m)gl(1 - \cos \alpha^*). \quad (1.7)$$

Iš čia randame kulkos greitį

$$v = \sqrt{\frac{2(M+m)gl(1 - \cos \alpha^*)}{m}}.$$

Ši formulė yra pakankamai tikslia, jeigu energijos nuostolis dėl šilumos išsiskyrimo bei energijos nuostolis dėl oro pasipriešinimo yra mažas. Priešingu atveju (1.7) formulės taikyti negalima. Energijos tvermés dėsnis teigia, kad nekinta pilna sistemos energija, o ne mechaninė energija.

2. Massės tvermés dėsnis. Nagrinėsime radioaktyvios medžiagos skilimo procesą. Tarkime "mažas" radioaktyvios medžiagos (pavyzdžiu, urano) kiekis yra patalpintas "dideliam" kiekyje kitos medžiagos (pavyzdžiu, švino). Sakydami žodį "mažas", turime omenyje tai, kad visi skilimo produktai, nesusidurdami su kitais atomais, laisvai palieka užimamą srity, o sakydami žodį

"didelis" turime omenyje tai, kad visi skilimo produktai absorbuojasi radioaktyvių medžiagą supančioje srityje. Tegu $m(t)$ ir $M(t)$ yra atitinkamai radioaktyvios, ir ją supančios medžiagos masė laiko momentu t . Tada pagal masės tvermės dėsnį

$$m(0) + M(0) = m(t) + M(t).$$

Radioaktyvios medžiagos skilimo greitį charakterizuoja suskilusių atomų skaičius per laiko vienetą. Eksperimentai rodo, kad šis skaičius yra tiesiog proporcingsas bendram radioaktyvios medžiagos atomų skaičiui tuo laiko momentu. Kadangi radioaktyvios medžiagos masė yra tiesiog proporcingsa jos atomų skaičiui, tai radioaktyvios medžiagos masės kitimo greitis yra tiesiog proporcingsas jos masei tuo laiko momentu, t.y.

$$m'(t) = -km(t), \quad k > 0.$$

Proporciumo koeficientas k kiekvienai konkrečiai radioaktyviai medžiagai nustatomas eksperimento pagalba. Iš pastarosios formulės matome, kad radioaktyvios medžiagos masė tenkina pirmos eilės tiesinę homogeninę lygtį. Tiesiogiai galima patikrinti, kad funkcija

$$m(t) = m(0)e^{-kt}.$$

yra šios lyties sprendinys. Be to, kai $t \rightarrow +\infty$, radioaktyvios medžiagos masė nyksta eksponentiškai ir artėja prie nulio. Kadangi bendra medžiagos masė nekinta, tai

$$M(t) = M(0) + m(0)(1 - e^{-kt}).$$

Be to, kai $t \rightarrow +\infty$, $M(t) \rightarrow M(0) + m(0)$ ir visa radioaktyvioji medžiaga pereina į ją supančią medžiagą.

3. Impulso tvėrimės dėsnis. Šis dėsnis teigia, kad pilnas sistemos impulsas nekinta, jeigu sistemos neveikia išorinės jėgos. Gyvenime su šiuo principu susidurama gana dažnai. Pavyzdžiu, jeigu stovinčioje valtyje žmogus žengia žingsnį į kurią nors pusę, tai valtis pasilenka į priešingą pusę. Šio princiopo pagrindu veikia įvairūs technikos prietaisai. Išnagrinėsime tiesiaeigio raketos judėjimo matematinį modelį, kai jos neveikia oro pasipriešinimo bei gravitacijos jėgos. Tegu u yra išmetamo sudegusio raketos kuro greitis (šiuolakiniam kurui šis greitis kinta nuo 3 iki 5 km/s) raketos korpuso atžvilgiu, o $v(t)$ – raketos greitis laiko momentu t Žemės atžvilgiu. Laikotarpiu Δt dalis kuro sudega ir raketos masė $m(t)$ sumažėja dydžiu $\Delta m = m(t + \Delta t) - m(t)$. Kadangi pilnas sistemos impulsas nekinta, tai

$$m(t)v(t) = m(t + \Delta t)v(t + \Delta t) - v_1(t + \Delta t)\Delta m;$$

čia $v_1(t + \Delta t)$ degimo produkto išmetimo greitis Žemės atžvilgiu, o $\Delta m < 0$. Pastarają lygybę patogu perrašyti taip:

$$\frac{m(t + \Delta t)v(t + \Delta t) - m(t)v(t)}{\Delta t} = \frac{m(t + \Delta t) - m(t)}{\Delta t}v_1(t + \Delta t).$$

Artindami čia $\Delta t \rightarrow 0$, gausime diferencialinę lygtį

$$(m(t)v(t))' = m'(t)v_1(t) \iff m(t)v'(t) = m'(t)(v_1(t) - v(t)).$$

Tačiau $v_1(t) - v(t) = -u$, t.y. degimo produktų greitis atžvilgiu raketos korpuso. Todėl pastarają lygtį galime perrašyti taip:

$$m(t)\frac{dv(t)}{dt} = -u\frac{dm(t)}{dt} \iff \frac{dv(t)}{dt} = -u\frac{d\ln m(t)}{dt}.$$

Integruodami abi pastarosios lyties puses randame

$$v(t) = v(0) + u \ln\left(\frac{m(0)}{m(t)}\right). \quad (1.8)$$

Jeigu $v(0) = 0$, tai maksimalus raketos greitis pasiekiamas, kai kuras pilnai sudega ir lygus

$$v_{max} = u \ln\left(\frac{m(0)}{m_* + m_s}\right);$$

čia m_* – masė objekto, kurį reikia iškelti į orbitą (pavyzdžiu, palydovo masė), o m_s – struktūrinė raketos konstrukcijos masė. Imdami $m_* = 0$, $m(0)/m_s = 10$, $u = 3km/s$ gauname, kad maksimalus raketos greitis

$$v_{max} = u \ln 10 \approx 6.9km/s < 7.$$

Iš šios formulės matome, kad netgi idealiu atveju, kai gravitacijos jėgos lygios nuliui, nėra oro pasipriešinimo bei raketos naudinga masė (pavyzdžiu, palydovo) lygi nuliui, maksimalus raketos greitis yra mažesnis už pirmąjį kosminį greitį $v \approx 7.91km/s$. Dėl šios priežasties kosmonautikoje buvo pradėtos naudoti daugiapakopės raketos.

Konkretumo dėlei nagrinėkime raketą su trimis pakopomis. Jos pradinė masė

$$m_0 = m_* + m_1 + m_2 + m_3;$$

čia $m_k, k = 1, 2, 3$ yra k -osios pakopos bendra masė. Be to, tegu $m_k^*, k = 1, 2, 3$ yra k -osios pakopos kuro masė ir skaičius $\lambda = (m_k - m_k^*)/m_k$ bei išmetamo sudėgusio kuro greitis u yra vienodas visoms trimis pakopoms. Tarkime, momentu t_1 yra sudegintas visas pirmosios pakopos kuras. Tada raketos masė lygi

$$m(t_1) = m_* + (m_1 - m_1^*) + m_2 + m_3.$$

Remiantis (1.8) formule laiko momentu t_1 raketa pasiekia greitį

$$v_1 = u \ln\left(\frac{m_0}{m(t_1)}\right).$$

Šiuo momentu struktūrinė pirmosios pakopos masė $m_1 - m_1^*$ atmetama ir įsijungia antroji pakopa. Raketos masė šiuo momentu lygi $m_* + m_2 + m_3$. Tarkime,

laiko momentu t_2 yra sudeginamas visas antrosios pakopos kuras. Remiantis (1.8) formule raketos greitis momentu t_2 lygus

$$v_2 = v_1 + u \ln \left(\frac{m_* + m_2 + m_3}{m_* + (m_2 - m_2^*) + m_3} \right).$$

Analogiškai samprotaudami gauname, kad sudegus trečiosios pakopos kurui raketa pasiekia greitį

$$v_3 = v_2 + u \ln \left(\frac{m_* + m_3}{m_* + (m_3 - m_3^*)} \right).$$

Pažymėkime

$$\alpha_1 = \frac{m_0}{m_* + m_2 + m_3}, \quad \alpha_2 = \frac{m_* + m_2 + m_3}{m_* + m_3}, \quad \alpha_3 = \frac{m_* + m_3}{m_*}.$$

Tada

$$v_3 = u \ln \left(\frac{\alpha_1}{1 + \lambda(\alpha_1 - 1)} \right) \left(\frac{\alpha_2}{1 + \lambda(\alpha_2 - 1)} \right) \left(\frac{\alpha_3}{1 + \lambda(\alpha_3 - 1)} \right).$$

Reiškinys dešinėje gautos lygybės pusėje yra simetrinis dydžių $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ atžvilgiu. Galima įrodyti, kad didžiausią reikšmę jis įgyja, kai $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha$. Siuo atveju

$$v_3 = 3u \ln \left(\frac{\alpha}{1 + \lambda(\alpha - 1)} \right) \iff \alpha = \frac{1 - \lambda}{e^{-v_3/3u} - \lambda}.$$

Be to, sandauga

$$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \frac{m_0}{m_*} = \alpha^3.$$

P a s t a b a . Pastarąsias formules galima apibendrinti bet kokiam baigtiniam raketos pakopų skaičiui. Tiksliau galima įrodyti, kad k pakopų raketa gali pasiekti greitį

$$v_k = ku \ln \left(\frac{\alpha}{1 + \lambda(\alpha - 1)} \right) \iff \alpha = \frac{1 - \lambda}{e^{-v_k/ku} - \lambda},$$

o santykis

$$\frac{m(0)}{m_*} = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k = \alpha^k.$$

Tegu $\lambda = 0.1$ Pareikalavę, kad dviejų pakopų raketa pasiektų greitį $v_2 = 10.5km/s$ gausime, kad $m(0)/m_* = 149$. Taigi norint dviejų pakopų raketai pakelti į orbitą vienos tonos krovinių reikia apytiksliai 149 tonų kuro¹. Trijų pakopų raketa pasieks greitį $v_3 = 10.5km/s$, kai $m(0)/m_* = 77$. Taigi trijų pakopų raketai iškelti į orbitą vieną toną krovino reikia beveik du kartus mažiau kuro negu dviejų pakopų raketai. Galima parodyti, kad keturių pakopų raketos atveju, lyginant su trijų pakopų raketos atveju, kuro sanaudos sumažėja nežymiai.

¹Laikome, kad didžiajų dalij raketos masės sudaro kūro masę.

4. Archimedės dėsnis. Tarkime, povandeninis laivas plaukia pastoviu greičiu v gylyje h . Laiko momentu $t = 0$ gautas įsakymas iškilti į paviršių. Reikia rasti povandeninio laivo iškilimo į vandenino paviršių trajektoriją.

Tarkime, laikas, per kurį iš laivo talpų yra išstumiamas vanduo ir į jas įpučiamas, oras yra mažas. Tada pagal Archimedės dėsnį laiko momentu $t = 0$ laivas netenka vandens svorio


$$P_1 = \rho_1 V g,$$

bet įgyja oro svorį

$$P_2 = \rho_2 V g;$$

čia ρ_1 – vandens tankis, ρ_2 – oro tankis išstumus vandenį, V – vandens talpos tūris, g – laisvojo kritimo pagreitis. Suminė jėga $P_1 - P_2$ yra keliamoji jėga ir suteikia laivui pagreitį a .

Iveskime ortogonalią koordinacių sistemą Oxy taip, kaip pavaizduota 1.2 paveikslėlyje ir tarkime, kad povandeninio laivo iškilimo į vandenyno paviršių trajektorija galima apibrėžti lygtimi $y = y(x)$, $x \in [0, l]$.



1.2 pav.

Pagal antrajį Niutono dėsnį (nepaisome vandens pasipriešinimo jėgos)

$$ma = F - P \iff \rho_2 V \frac{d^2 y}{dt^2} = gV(\rho_1 - \rho_2).$$

Be to, x ašies kryptimi laivas plaukia pastoviu greičiu

$$v = \frac{dx}{dt}.$$

Suintegravę šias lygtis randame

$$y(t) = g \frac{\rho_1 - \rho_2}{2\rho_2} t^2, \quad x(t) = vt.$$

Eliminavę iš šių lygčių parametrą t gauname, kad laivo į vandenyno paviršių iškilimo trajektorija yra parabolė

$$y = g \frac{\rho_1 - \rho_2}{2\rho_2 v^2} x^2.$$


Laikas T , per kurį laivas pasiekia vandenyno paviršių, randamas iš lygties

$$g \frac{\rho_1 - \rho_2}{2\rho_2} T^2 = h,$$

o atstumas, kuri jį nuplaukia x ašies kryptimi, lygus

$$l = vT = v \left(\frac{2\rho_2 h}{g(\rho_1 - \rho_2)} \right)^{1/2}.$$

A n t r a s i s N i u t o n o d ē s n i s. Nagrinėsime rutuliuką masės m , kuris yra prityvintas prie spyruoklės (žr. 1.3 pav.).



1.3 pav.

Išvedę rutuliuką iš pusiausvyros padėties taške, kuri yra taške $x = 0$, suteikiame jam pradinį nuokrypij x_0 ir pradinį greitij v_0 . Tegu $x = x(t)$ yra rutuliuko nuokrypis nuo pusiausvyros padėties laiko momentu t . Tada laiko momentu $t = 0$ yra žinomas rutuliuko pradinis nuokrypis $x(0) = x_0$ ir pradinis greitis $x'(0) = v_0$. Be to, tegu $a = a(t)$ yra rutuliuko pagreitis laiko momentu t . Nagrinėdami šį procesą laikysime, kad tiesė, kuria svyruoja rutuliukas, yra ideali (t.y. rutuliuko svyravimas vyksta be trinties), oro pasipriešinimo jėga lygi nuliui ir sunkio jėga yra statmena judėjimo krypčiai. Tada vienintelė jėga, veikianti rutuliuką, yra spyruoklės stangrumo jėga F . Pagal antrajį Niutono dėsnį

$$F = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Tačiau spyruoklę veikianti jėga (Huko dėsnis) yra proporcionali spyruoklės ilgio pokyčiui, t.y.

$$F = -kx.$$

Taigi funkcija x , apibrėžianti spyruoklės svyravimą, turi tenkinti antros eilės diferencialinę lygtį

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx, \quad t > 0. \quad (1.9)$$

Lengvai galima įsitikinti, kad funkcija

$$x = c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

yra šios lygties sprendinys. Laisvas konstantas c_1 ir c_2 randame iš sąlygų

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

P a s t a b a . Matematinis modelis išvestas remiantis vienais gamtos dėsniais neturi prieštarauti kitiems gamtos dėsniams. Be to, vieną ir tą patį modelį galima sudaryti remiantis skirtingais gamtos dėsniais. Pavyzdžiui, ka tik išvestą rutuliuko svyravimo matematinį modelį galima apibrėžti naudojant ne antrajį Niutono dėsnį, o energijos tvermės dėsnį. Iš tikrujų, kadangi spyruoklė yra pritvirtinta prie rutuliuko ir sienelės, be to rutuliuko svyravimas vyksta be trinities, oro pasipriešinimo jėga lygi nuliui ir sunkio jėga yra statmena judėjimo krypčiai, tai sistemos "spyruoklė-rutuliukas" mechaninė energija yra pastovi, t.y.

$$E = T + P = \text{const};$$

čia kinetinė energija

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$$

o potencinė energija

$$P = - \int_0^x F ds = \int_0^x ks ds = \frac{1}{2}kx^2.$$

Taigi suminė energija

$$E = T + P = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

Jos išvestinė

$$\frac{d}{dt}E = m\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} + kx\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt}\left(m\frac{d^2x}{dt^2} + kx\right) = 0.$$

Iš šios formulės matome, kad funkcija x turi tenkinti tą pačią lygtį

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0, \quad t > 0.$$

Jeigu spyruoklę veikia išorinė jėga $F(x', x, t)$, priklausanti nuo laiko, jo padėties ir nuo greičio, tai vietoje (1.9) lygties gauname lygtį

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx + F(x', x, t), \quad t > 0. \quad (1.10)$$

Tuo atveju, kai jėga F yra pastovi, t.y. $F(x', x, t) = F_0 = \text{const}$, tai padarei keitinį $\tilde{x} = x - F_0/k$ gausime lygtį

$$m\frac{d^2\tilde{x}}{dt^2} + k\tilde{x} = 0, \quad t > 0.$$

Šiuo atveju matome, kad pastovi jėga rutuliuko svyravimo iš esmės nekeičia. Tik jos koordinatė pasislenka dydžiu F_0/k . Sudėtingesnis atvejis gaunamas, kai

spyruoklę veikianti jėga F priklauso nuo laiko t . Pavyzdžiui, tegu $F(x', x, t) = F_0 \sin \tilde{\omega}t$. Tada pastarosios lygties sprendinys

$$x = c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t + \frac{F_0}{m(\omega^2 - \tilde{\omega}^2)} \sin \tilde{\omega}t, \quad \text{kai } \omega \neq \tilde{\omega}.$$

Iš šios formulės matome, kad sprendinyje ne tik atsiranda papildomas narys su amplitude $\tilde{\omega}$, bet ir rezonansas, t.y. sprendinio svyravimo amplitudė neapréžtai auga, kai $\tilde{\omega} \rightarrow \omega$. Dar sudétingesnį modelį gausime, jeigu rutuliuką veikia trinties jėga, atsrandanti dėl aplinkos, kurioje juda rutuliukas, pasipriėšinimo. Šiuo atveju jėga F priklauso nuo rutuliuko judėjimo greičio. Ši priklausomybė apibrėžiama formule $F(x', x, t) = -\mu x'$. Čia koeficientas $\mu > 0$ priklauso nuo rutuliuko skerspiūvio statmeno greičiui ploto, aplinkos tankio bei jos klampumo. Rutuliuko svyravimas tokioje aplinkoje apibrėžiamas lygtimi

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \mu \frac{dx}{dt}, \quad t > 0.$$

Padarę keitinių

$$x(t) = \tilde{x}(t)e^{\alpha t}, \quad \alpha = -\mu/2m$$

gausime lygtį

$$m \frac{d^2 \tilde{x}}{dt^2} = -k_1 \tilde{x}, \quad k_1 = k - \frac{\mu^2}{4m}.$$

Ši lygtis iš esmės skiriasi nuo (1.9) lygties tuo, kad koeficiente k_1 prie ieškomos funkcijos ženklas priklauso nuo parametrų k, μ ir m reikšmių. Jeigu aplinkos klampumas néra didelis, t.y. kai $k_1 = k - \mu^2/(4m) > 0$, rutuliuko svyravimą galima (žr. 3.2 skyrelį) apibrėžti formule

$$x(t) = \tilde{x}(t)e^{\alpha t} = (c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t)e^{-t\mu/2m}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k_1}{m}}.$$

Šiuo atveju svyravimo dažnis yra ω ir didėjant laikui svyravimai gėsta. Jeigu $k_1 = 0$, tai rutuliuko judėjimą galima apibrėžti formule

$$x(t) = (c_1 t + c_2)e^{-t\mu/2m}.$$


Šiuo atveju dėl didelės trinties svyravimų néra. Tegu $k_1 < 0$. Šiuo atveju trinties jėgos yra tiek didelės, kad rutuliukas tiesiog įstringa į supančioje aplinkoje. Galima irodyti, kad rutuliukas nepereina per tašką $x = 0$ ir tik artėja prie jo, kai $t \rightarrow +\infty$.

1.3 VARIACINIO SKAIČIAVIMO ELEMENTAI

Vienas iš pirmųjų variacinio skaičiavimo uždavinių yra 1696 m. J. Bernulio suformuluotas uždavinys apie brachistochrone:

1 uždavinys. Vertikalioje plokštumoje Oxy yra du taškai, nesantys vienoje vertikalioje tiesėje. Tegu x_1, y_1 ir x_2, y_2 yra šių taškų koordinatės. Iš taško (x_1, y_1) į tašką (x_2, y_2) kreive l be trinties juda materialus taškas. Pradiniu laiko momentu jo greitis v lygus nuliui. Aibėje tokį kreivį reikia rasti tą, kuria judėdamas materialus taškas pasiekę tašką (x_2, y_2) per trumpiausią laiką. Ieškomojį kreivę l yra vadinama brachistochrone.

Tarkime, koordinačių ašys x, y parinktos taip, kaip nurodyta 1.4 paveikslėlyje,



1.4 pav.

o kreivę l apibrėžta lygtimi

$$y = y(x), \quad x \in [x_1, x_2]. \quad (1.11)$$

Tada

$$y(x_1) = y_1, \quad y(x_2) = y_2. \quad (1.12)$$

Pagal energijos tvermės dėsnį

$$\frac{m\mathbf{v}^2}{2} = mg(y - y_1);$$

čia: m – judančio taško masė, g – laisvojo kritimo pagreitis. Kadangi

$$|\mathbf{v}| = \frac{dl}{dt} = \sqrt{1 + y'^2} \frac{dx}{dt},$$

tai

$$dt = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y - y_1)}} dx.$$

Suintegravę šią lygybę nuo x_1 iki x_2 , gausime

$$T \equiv I(y) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y - y_1)}} dx; \quad (1.13)$$

čia T – laikas, kurį sugaišta materialus taškas, judėdamas kreive l iš taško (x_1, y_1) į tašką (x_2, y_2) . Taigi nagrinėjamasis uždavinys susiveda į tokį variacinių

uždavinj. Tegu $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^1$ yra diferencijuojama argumento x funkcija, tenkinanti (1.12) sąlygą. Aibėje tokį funkcijų reikia rasti tą, kuriai (1.13) integralas išgyja mažiausią reikšmę.

2 užduaviniuose. Tegu $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z)$ yra šviesos sklidimo nehomogeninėje medžiagoje greitis. Rasti šviesos sklidimo trajektoriją l , jungiančią taškus (x_1, y_1, z_1) ir (x_2, y_2, z_2) .

Tarkime, šviesos sklidimo trajektorija yra apibrėžiama lygtimi:

$$y = y(x), \quad z = z(x), \quad x \in [x_1, x_2]. \quad (1.14)$$

Tada

$$y(x_1) = y_1, \quad y(x_2) = y_2, \quad z(x_1) = z_1, \quad z(x_2) = z_2. \quad (1.15)$$

Kadangi

$$|\mathbf{v}| = \frac{dl}{dt} = \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} \frac{dx}{dt},$$


tai šviesos spindulys, išeinantis iš taško (x_1, y_1, z_1) , pasieks tašką (x_2, y_2, z_2) per laiką

$$T \equiv I(y, z) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}}{|\mathbf{v}(x, y, z)|} dx. \quad (1.16)$$

Pagal Ferma dėsnį šviesa sklinda ta trajektorija, kuria judant laikas T yra minimalus. Todėl nagrinėjamas uždavinys susiveda į tokį variacinį uždavinį. Tegu $y, z : (x_1, x_2) \rightarrow \mathbb{R}^1$ yra diferencijuojamos argumento x funkcijos, tenkinančios (1.15) sąlygas. Tokių funkcijų aibėje reikia rasti tas, kurioms (1.16) integralas išgyja mažiausią reikšmę.

3 užduaviniuose. Tegu l yra uždaras kontūras erdvėje \mathbb{R}^3 , o S – paviršius, užtemptas ant kontūro l . Tokių paviršių aibėje reikia rasti tą, kurio plotas yra mažiausias.

Tarkime, ortogonalioje koordinacijų sistemoje $Oxyz$ paviršius S apibrėžiamas lygtimi $z = u(x, y)$, $x, y \in \Omega$, $\partial\Omega$ – kontūro l projekcija į plokštumą Oxy (žr. 1.5 pav.).



1.5 pav.

Tada paviršiaus S plotas

$$|S| \equiv I(z) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} dx dy. \quad (1.17)$$

Jeigu taškas $(x, y) \in \partial\Omega$, tai taškas $(x, y, u(x, y)) \in l$. Tai reiškia, kad funkcija $u(x, y)$ taškuose $(x, y) \in \partial\Omega$ įgyja žinomą reikšmę. Šią sąlygą galima užrašyti taip:

$$u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y); \quad (1.18)$$

čia φ – žinoma funkcija. Taigi gavome tokį variacinį uždavinį.

Tegu $z = u(x, y)$ yra diferencijuojama srityje Ω funkcija, tenkinanti (1.18) sąlygą. Tokių funkcijų aibėje reikia rasti tą, kuriai (1.17) integralas įgyja mažiausią reikšmę.

4 uždavinys. Plokštumoje Oxy yra du taškai, sujungti atkarpa ir kreivė l , kurios ilgis a . Tokių kreivių aibėje reikia rasti tą, kuri kartu su atkarpa apriboja didžiausio ploto figūrą.

Tarkime, kad tie taškai yra x ašyje ir turi koordinates $(x_1, 0), (x_2, 0)$, o kreivę l galima apibrėžti lygtimi $y = y(x), x \in [x_1, x_2]$. Tada

$$y(x_1) = 0, \quad y(x_2) = 0. \quad (1.19)$$

Figūros, apribotos kreivė l ir atkarpa $[x_1, x_2]$, plotas lygus

$$|S| = I(y) = \int_{x_1}^{x_2} y dx. \quad (1.20)$$

Kreivės l ilgis

$$|l| = G(y) = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2} dx. \quad (1.21)$$

Taigi gavome tokį variacinį uždavinį.

Tegu $y : (x_1, x_2) \rightarrow \mathbb{R}^1$, yra diferencijuojama argumento x funkcija, tenkinanti (1.19) sąlygą. Tokių funkcijų aibėje reikia rasti tą, kuriai (1.20) integralas įgyja mažiausią reikšmę, o (1.21) integralas įgyja reikšmę a .

Visuose šiuose uždaviniuose ieškome funkcijos (arba kelių funkcijų), kuri tenkina tam tikras papildomas sąlygas ir suteikia nagrinėjamam integralui ekstremalią, t.y. minimalią arba maksimalią, reikšmę. Tiesa, 4 uždavinyje ieškomoji funkcija kartu su (1.19) turi tenkinti dar ir (1.21) sąlygą, kuri yra visai kitokio pobūdžio. Apibendrindami šiuos uždavinius sakysime, kad *pagrindinis variaciniu skaičiavimo uždavinys* yra rasti tokią funkciją, kuriai nagrinėjamas funkcioningas įgyja ekstremalią reikšmę. Šis uždavinys yra analogiškas elementariems analizės uždaviniams, kai yra ieškomi vienos arba kelių kintamujų funkcijos ekstremumo taškai. Vieno kintamojo diferencijuojamos funkcijos f atveju

salyga $f'(x) = 0$ yra būtina lokalaus ekstremumo egzistavimo sąlyga. Na grinėjamu atveju taip pat yra išvedama būtina ekstremumo egzistavimo sąlyga. Dažniausiai tai yra paprastoji arba dalinių išvestinių lygtis. Ją turi tenkinti ieškomoji funkcija, jeigu tik ji egzistuoja. Išvedant būtiną ekstremumo egzistavimo sąlygą, naudojami keli teiginiai. Jie yra vadinami pagrindinėmis variacinio skaičiavimo lemomis.

1.1 lema. Tegu f yra tolydi segmente $[a, b]$ funkcija ir¹

$$\int_a^b f(x)\eta(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^\infty(a, b).$$

Tada $f(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$.

▫ Tarkime priešingai, kad lemos sąlygos yra patenkintos, tačiau funkcija $f(x) \not\equiv 0$. Tada egzistuoja taškas $x_0 \in [a, b] : f(x_0) \neq 0$. Tegu $f(x_0) > 0$. Kadangi funkcija f yra tolydi, tai egzistuoja taško x_0 aplinka $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ tokia, kad $f(x) > 0, \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. Jeigu taškas x_0 yra segmento $[a, b]$ kraštinis taškas, pavyzdžiu, $x_0 = b$, tai reikia imti vienpusę šio taško aplinką. Aibėje $C_0^\infty(a, b)$ imkime kokią nors funkciją η , kuri yra teigiamā $\forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ir lygi nuliui, kai $x \in [a, b] \setminus [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$. Tada

$$0 = \int_a^b f(x)\eta(x) dx = \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f(x)\eta(x) dx > 0.$$

Gauta prieštara įrodo, kad padaryta prielaida yra neteisinga. Taigi $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$. Atvejis, kai $f(x_0) < 0$, nagrinėjamas analogiškai. ▷

Toks pats teiginys yra teisingas dvilypių, trilypių ir apskritai n -lypių integralų atveju.

1.2 lema. Tegu Ω yra aprėžta erdvėje \mathbb{R}^n sritis, $f \in C(\bar{\Omega})$ ir

$$\int_{\Omega} f(x)\eta(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^\infty(\Omega).$$

Tada $f(x) \equiv 0, \forall x \in \bar{\Omega}$.

P a s t a b a . Šios lemos įrodymas yra analogiškas **1.1** lemos įrodymui. Be to, **1.2** lema išlieka teisinga ir tuo atveju, jeigu joje sritį Ω pakeisime glodžiu n -mačiu paviršiumi S .

¹Tolydžių funkcijų intervale (a, b) aibę žymésime $C(a, b)$. Aibę funkcijų, kurios intervale (a, b) turi tolydžias išvestines iki k -tos eilės imtinai, žymésime $C^k(a, b)$. Jeigu, be to jos intervale (a, b) yra finičios, tai tokią aibę žymésime $C_0^k(a, b)$. Kai $k = \infty$ aibę $C_0^\infty(a, b)$ yra be galio diferencijuojamų finičių intervale (a, b) funkcijų aibė.

1.3 lemė. Tegu f yra tolydi segmente $[a, b]$ funkcija ir

$$\int_a^b f(x)\eta'(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C^1(a, b), \eta(a) = \eta(b) = 0.$$

Tada funkcija f yra konstanta.

« Pažymėkime

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = C.$$

Tada

$$\int_a^b (f(x) - C) dx = 0. \quad (1.22)$$

Tegu

$$\eta(x) = \int_a^x (f(t) - C) dt.$$

Akivaizdu, kad taip apibrėžta funkcija η tenkina lemos sąlygas, o jos išvestinė $\eta'(x) = f(x) - C$. Todėl

$$\int_a^b (f(x) - C)f(x) dx = 0. \quad (1.23)$$

Padaugine (1.22) lygybę iš $-C$ ir pridėjė prie (1.23), rezultatą užrašysime taip:

$$\int_a^b (f(x) - C)^2 dx = 0.$$

Tačiau ši lygybė yra galima tik tuo atveju, kai $f(x) = C, \forall x \in [a, b]$. ▷

1.4 lemė. Tegu f ir g yra tolydžios segmente $[a, b]$ funkcijos ir

$$\int_a^b (g(x)\eta(x) + f(x)\eta'(x)) dx = 0, \quad \forall \eta \in C^1(a, b), \eta(a) = \eta(b) = 0. \quad (1.24)$$

Tada $f \in C^1(a, b)$ ir $f'(x) = g(x), \forall x \in [a, b]$.

« Tegu

$$w(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

Tada

$$\int_a^b w(x)\eta'(x) dx = - \int_a^b g(x)\eta(x) dx$$

ir (1.24) tapatybę galime perrašyti taip:

$$\int_a^b (f(x) - w(x))\eta'(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C^1(a, b), \eta(a) = \eta(b) = 0.$$

Funkcija $f - w$ tenkina 1.3 lemos salygas. Todėl ji yra konstanta, t.y.

$$f(x) = \int_a^x g(t) dt + C.$$

Akivaizdu, kad taip apibrėžta funkcija yra tolydi ir turi tolydžią išvestinę $f' = g$.

▷

Tegu $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $F \in C(\Omega \times \mathbb{R})$; l – glodi kreivė, gulinti srityje Ω ir jungianti du taškus. Tarkime, kreivę l galima apibrėžti lygtimi $y = y(x)$, $x \in [a, b]$ ir $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. Tada $\forall x \in [a, b]$ taškas $(x, y(x)) \in \Omega$. Aibę diferencijuojamų funkcijų, tenkinančių šias salygas, pažymėkime raide \mathfrak{M} .

Apibrėžkime integralą

$$I(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad y \in \mathfrak{M}. \quad (1.25)$$

Tada pagrindinis variacinio skaičiavimo uždavinys formuluojamas taip: rasti funkciją $y \in \mathfrak{M}$ tokia, kad integralas I įgytų ekstremalią, t.y. minimalią arba maksimalią, reikšmę. Čia yra kalbama apie *absoliutyjį* ekstremumą, t.y. ieškoma funkcija turi būti tokia, kad

$$I(y) \leq I(\tilde{y}), \quad \forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}$$

arba

$$I(y) \geq I(\tilde{y}), \quad \forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}.$$

Norint apibrėžti lokalaus ekstremumo sąvoką, reikia apibrėžti funkcijos (kreivės) aplinkos sąvoką.

Tegu $\varepsilon > 0$ yra fiksotas skaičius ir $y \in \mathfrak{M}$. Funkcijos y nulinės eilės (arba stipriajai) ε aplinka vadinsime aibę

$$\mathfrak{M}_0 = \{\tilde{y} \in \mathfrak{M} : \max_{x \in [a, b]} |\tilde{y}(x) - y(x)| \leq \varepsilon\}.$$

Funkcijos y pirmosios eilės (arba silpnaja) ε aplinka vadinsime aibę

$$\mathfrak{M}_1 = \{\tilde{y} \in \mathfrak{M} : \max_{x \in [a, b]} |\tilde{y}(x) - y(x)| + \max_{x \in [a, b]} |\tilde{y}'(x) - y'(x)| \leq \varepsilon\}.$$

A p i b r ė ž i m a s. Sakysime, funkcija $y \in \mathfrak{M}$ suteikia funkcionalui I stiprųjį (silpnąjį) lokalų ekstremumą, jeigu kokioje nors stipriojoje ε aplinkoje \mathfrak{M}_0 (silpnojoje ε aplinkoje \mathfrak{M}_1)

$$I(y) \leq I(\tilde{y}), \quad \forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}_0 \quad (\forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}_1)$$

arba

$$I(y) \geq I(\tilde{y}), \quad \forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}_0 \quad (\forall \tilde{y} \in \mathfrak{M}_1).$$

Jeigu kokia nors funkcija y suteikia funkcionalui I absoliatuji ekstremumą, tai ji suteikia ir stiprujį lokalų ekstremumą, tuo labiau ir silpnąjį lokalų ekstremumą. Todėl, jeigu kokia nors sąlyga yra būtina tam, kad funkcija y suteiktų funkcionalui I silpnąjį lokalų ekstremumą, tai ši sąlyga yra būtina ir tam, kad funkcija y suteiktų funkcionalui I stiprujį lokalų ekstremumą, tuo labiau ir absoliatuji ekstremumą. Taigi išvedant būtiną ekstremumo sąlygą reikia išnagrinėti silpnojo lokalaus ekstremumo atvejį.

Toliau vietoje natūralios tolydumo sąlygos reikalausime, kad funkcija F turėtų tolydžias dalines išvestines iki antrosios eilės imtinai pagal visus savo argumentus. Atkreipsime dėmesį į tai, kad, įrodant kai kuriuos teiginius, pakanka reikalauti tik pirmųjų išvestinių tolydumo.

Tarkime, funkcija $y \in \mathfrak{M}$ suteikia (1.25) funkcionalui silpnąjį lokalų ekstremumą, o funkcija $\eta \in C_0^1(a, b)$. Funkcija $y + \varepsilon\eta$ priklauso kokiai nors silpnai funkcijos y aplinkai, jeigu skaičiaus ε modulis yra pakankamai mažas. Todėl tokiomis ε reikšmėmis yra teisinga viena iš nelygybių

$$I(y) \leq I(y + \varepsilon\eta) \quad \text{arba} \quad I(y) \geq I(y + \varepsilon\eta).$$

Tegu $\Phi(\varepsilon) = I(y + \varepsilon\eta)$. Pagal apibrėžimą

$$\Phi'(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{I(y + \varepsilon\eta) - I(y)}{\varepsilon} = \int_a^b [F_y(x, y, y')\eta(x) + F_{y'}(x, y, y')\eta'(x)] dx.$$

Taškas $\varepsilon = 0$ yra funkcijos Φ lokalaus ekstremumo taškas. Todėl $\Phi'(0) = 0$. Šią sąlygą galima perrašyti taip:

$$\int_a^b [F_y(x, y, y')\eta(x) + F_{y'}(x, y, y')\eta'(x)] dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1(a, b). \quad (1.26)$$

Taigi funkcija y turi tenkinti (1.26) integralinę tapatybę.

Atvirkštinis teiginyς yra neteisingas. Jeigu funkcija $y \in \mathfrak{M}$ tenkina (1.26) integralinę tapatybę, tai nebūtinai ji suteikia integralui I silpnąjį lokalų ekstremumą. Šiuo atveju sakysime, kad integralas I įgyja stacionariąją reikšmę, o funkcija y yra stacionarusis integralo I taškas.

Panaudoję integravimo dalimis formulę, perrašysime (1.26) integralinę tapatybę taip:

$$\int_a^b [F_{y'}(x, y, y') - \int_a^x F_y(t, y(t), y'(t)) dt] \eta'(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1(a, b).$$

Pagal 1.3 lemą funkcija y turi tenkinti lygtį

$$F_{y'}(x, y, y') - \int_a^x F_y(t, y(t), y'(t)) dt = C. \quad (1.27)$$

Ši lygtis yra vadinama Oilerio lygtimi užrašyta integraline forma.

Įrodytą teiginį galima suformuluoti taip: jeigu funkcija $y \in \mathfrak{M}$ suteikia integralui I silpnąjį lokalų ekstremumą, tai egzistuoja konstanta C tokia, kad funkcija y yra (1.27) integrodiferencialinės lygties sprendinys.

P a s t a b a . Išvesdami (1.27) lygtį, nesinaudojome tuo, kad funkcija F turi tolydžią išvestinę F_x . Galima įrodyti (žr. [2]), kad funkcija y tenkina taip pat integralinę lygtį

$$F(x, y, y') - y' F_{y'}(x, y, y') - \int_a^x F_x(t, y(t), y'(t)) dt = C, \quad x \in [a, b]. \quad (1.28)$$

Grįžkime dabar prie (1.26) integralinės tapatybės. Pagal 1.4 lemą koeficientas prie η' turi tolydžią kintamojo x atžvilgiu išvestinę. Todėl (1.26) integralinę tapatybę galima perrašyti taip:

$$F_{y'}(x, y, y') \eta \Big|_{x=a}^{x=b} + \int_a^b \left[F_y(x, y, y') - \frac{d}{dx}(F_{y'}(x, y, y')) \right] \eta(x) dx = 0,$$

$\forall \eta \in C_0^1(a, b)$. Kadangi $\eta(a) = \eta(b) = 0$, tai

$$\int_a^b \left[F_y(x, y, y') - \frac{d}{dx}(F_{y'}(x, y, y')) \right] \eta(x) dx = 0, \quad \forall \eta \in C_0^1(a, b).$$

Šioje integralinėje tapatybėje reiškinys, esantis laužtiniuose skliaustuose, tenkina 1.1 lemos sąlygas. Todėl funkcija y yra diferencialinės lygties

$$F_y(x, y, y') - \frac{d}{dx}(F_{y'}(x, y, y')) = 0 \quad (1.29)$$

sprendinys. Ši lygtis yra vadinama Oilerio lygtimi užrašyta diferencialine forma. Padauginę Oilerio lygtį iš y' , ją perrašome taip:

$$\frac{d}{dx}(F(x, y, y') - y' F_{y'}(x, y, y')) - F_x(x, y, y') = 0 \quad (1.30)$$

Suformuluosime įrodytą teiginį. Jeigu funkcija $y \in \mathfrak{M}$ suteikia integralui I silpnąjį lokalų ekstremumą, tai ji turi tenkinti (1.29) ir (1.30) lygtis.


P a s t a b a . Jeigu (1.25) integrale skaliarinę funkciją y pakeisime į vektorinę funkciją $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, tai vietoje vienos Oilerio lygties gausime n Oilerio lygčių sistemą. Pavyzdžiu, vietoje (1.29) lygties gausime n lygčių sistemą

$$F_{y_i}(x, y, y') - \frac{d}{dx}(F_{y'_i}(x, y, y')) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.31)$$

1.4 VARIACINIŲ PRINCIPŲ TAIKYMAS

Kitas dažnai naudojamas matematinių modelių konstravimo metodas yra "variacionių principų" taikymo metodas. Vieno iš tokų principų esmė yra ta, kad tam tikras dydis, aprašantis nagrinėjamos sistemos perėjimą iš vienos padėties į kitą, perėjimo metu įgyjant ekstremalią reikšmę. Pavyzdžiu, pagal Ferma dėsnį šviesos spindulys, paleistas iš taško A į tašką B , juda ta trajektorija, kuriai šviesos sklidimo laikas yra minimalus. Remiantis šiuo principu galima išvesti visus pagrindinius geometrinės optikos dėsnius. Išnagrinėsime paprasčiausią pavyzdį.

1. Šie soss lūžimai. Tarkime, dvi skitingų savybių homogenines terpes skiria tiesė. Pažymėkime ją raide x . Be to, tegu pirmoje terpéje šviesos sklidimo greitis lygus v_1 , o antroje v_2 . Tegu šviesos spindulys, išeinantis iš taško A , kerta tiesę x kampu α ir $\beta(\alpha)$ yra kampus tarp x ašies ir spindulio kitoje terpéje (žr. 1.6 pav.). Rasime $\beta(\alpha)$.



1.6 pav.

Tada šviesos spindulys, išeinantis iš taško A , pasieks tašką B per laiką

$$t(\alpha) = \frac{l_a}{v_a} + \frac{l_b}{v_b} = \frac{a}{v_a \sin \alpha} + \frac{b}{v_b \sin \beta(\alpha)}.$$

Šis laikas bus trumpiausias, kai $t'(\alpha) = 0$, t.y. kai

$$-\frac{a}{v_a} \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{b}{v_b} \frac{\cos \beta}{\sin^2 \beta(\alpha)} \cdot \beta'(\alpha) = 0.$$

Kadangi

$$\frac{a}{\tan \alpha} + \frac{b}{\tan \beta(\alpha)} = c,$$

tai


$$-\frac{a}{\sin^2 \alpha} - \frac{b}{\sin^2 \beta(\alpha)} \cdot \beta'(\alpha) = 0.$$

Eliminavę iš pastarųjų dviejų lygių $\beta'(\alpha)$, gausime žinomą šviesos lūžimo formulę

$$\frac{\cos \alpha}{\cos \beta(\alpha)} = \frac{v_a}{v_b}.$$

Sudarant fizikos ir mechanikos reiškinių matematinius modelius dažnai nau-
duojamas *Hamiltono principas*. Jo esmė yra tokia.

Tarkime, laiko momentu t_1 nagrinėjamas kūnas yra **I** padėtyje, o laiko mo-
mentu t_2 – **II** padėtyje. Aišku, kad perėjimas iš **I** padėties į **II** galimas skirtingais
keliais (žr. 1.7 pav.).



1.7 pav.

Pažymėsime raidėmis T ir P kūno kinetinę ir potencinę energijas. Tada
Hamiltono principas tvirtina, kad realiam procese, veikiant potencinėms jė-
gomis kūnas juda ta trajektorija, kurioje integralas

$$I = \int_{t_1}^{t_2} (T - P) dt$$

įgyja stacionarią reikšmę. Kartais stacionari reikšmė yra mažiausia integralo
reikšmė. Todėl Hamiltono principas dar yra vadinamas *mažiausio veiksmo* prin-
cipu. Išnagrinėsime kelis pavyzdžius.

1. M a t e r i a l a u s t a š k o t r a j e k t o r i j a. Iš pradžių išnagrinėsi-
me paprasčiausią atvejį, kai materialus taškas mestas vertikaliai aukštyn juda
vakume veikiamas pastovios sunkio jėgos. Tegul yra žinoma taško koordinatė
ir greitis pradiniu laiko momentu. Tarkime, taško trajektoriją galima apibrėžti
lygtimi $y = y(t)$. Be to, tegu pradiniu laiko momentu $t = 0$ aukštis $y(0) = 0$, o
greitis $v = c$. Taško kinetinė energija

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\dot{y}^2}{2}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}.$$

Taško potencinė energija

$$P = mgy.$$

Remdamiesi Hamiltono principu, sudarome integralą

$$I(y) = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m\dot{y}^2}{2} - mgy \right) dt.$$

Ši integralą atitinka Oilerio lygtis

$$\frac{d}{dt}(m\dot{y}) + mg = 0.$$


Jos sprendinys

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2.$$

Pagal prielaidą $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = c$. Todėl $C_2 = 0$, o $C_1 = c$. Vadinasi, vertikaliai aukštyn mesto materialaus taško judėjimas yra aprašoma lygtimi

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + ct.$$

Tarkime dabar, kad materialus taškas metamas iš koordinačių pradžios kampu α (žr. 1.8 pav.) pradiniu greičiu \mathbf{c} . Rasime šio taško trajektoriją.



1.8 pav.

Bendru atveju ją galima apibrėžti lygtimis

$$y = y(t), \quad x = x(t).$$

Tada taško kinetinė energija

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2), \quad \dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt},$$

o potencinė energija

$$P = mgy.$$

Remdamiesi Hamiltono principu, sudarome integralą

$$I(x, y) = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy \right) dt.$$

Šį integralą atitinka Oilerio lygtys:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0, \quad \frac{d}{dt}(m\dot{y}) + mg = 0.$$

Perrašysime jas taip:

$$\ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = -g.$$

Šių lygčių sprendiniai:

$$x = C_1 t + C_2, \quad y = -\frac{g}{2}t^2 + C_3 t + C_4.$$

Pagal prielaidą $x(0) = 0$, $y(0) = 0$. Todėl $C_2 = C_4 = 0$. Be to,

$$\dot{x}(0) = c \cos \alpha, \quad \dot{y}(0) = c \sin \alpha, \quad c = |\mathbf{c}|.$$

Todėl

$$C_1 = c \cos \alpha, \quad C_2 = c \sin \alpha.$$


Taigi nagrinėjamojo taško trajektoriją galima aprašyti parametrinėmis lygtimis:

$$x = ct \cos \alpha, \quad y = -\frac{g}{2}t^2 + ct \sin \alpha,$$

iš kurių gauname

$$y = -\frac{gx^2}{2c^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha.$$

3. Planetyje judėjimo dėsniai. Tarkime M yra Saulės masė, o m – planetos masė. Pagal visuotinį traukos dėsnį (žr. 1.9 pav.)



1.9 pav.

abi masės veikia viena kitą jėga

$$\bar{F} = -\gamma \frac{Mm}{r^2} \bar{r}_0, \quad |\bar{r}_0| = 1.$$

Veikiant šiai jėgai, potencinė energija

$$P = \int_r^\infty \bar{F} \cdot d\bar{r} = -\gamma Mm \int_r^\infty \frac{1}{r^2} dr = -\gamma \frac{Mm}{r}.$$

Pažymėkime $\gamma M = k$. Tada $P = -\frac{km}{r}$. Tarkime planetos judėjimą galima apibrėžti parametrinėmis lygtimis ¹ $x = x(t)$, $y = y(t)$. Tada Planetos kinetinė energija

$$T = \frac{m}{2} \mathbf{v}^2 = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2).$$

Nagrinėjant šį uždavinį, patogu įvesti polines koordinates:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi.$$

Polinėse koordinatėse

$$T = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2).$$

¹ Pagal antrajį Niutono dėsnį $m\bar{r}'' = \bar{F}$. Todėl $\bar{r} \times m\bar{r}'' = \bar{r} \times \bar{F} = 0$. Pastarają lygybę galima perrašyti taip $(\bar{r} \times m\bar{r}')' = 0$. Integruodami ją randame $\bar{r} \times m\bar{r}' = \bar{c}$, \bar{c} – vektorinė konstanta. Padauginę skaliariškai abi šios lygybės pusės iš \bar{r} turime $\bar{c} \cdot \bar{r} = 0$. Tai yra vektorinė plokštumos lygtis. Todėl galime tvirtinti, kad planetos skriejimo apie saulę trajektorija yra plokšticia

Remdamiesi Hamiltono principu, sudarome integralą

$$I(r, \varphi) = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{km}{r} \right] dt.$$

Ši integralą atitinka Oilerio lygtys:

$$\frac{d}{dt}(mr) + \frac{km}{r^2} - mr\dot{\varphi}^2 = 0, \quad \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) = 0.$$

Antrosios Oilerio lyties sprendinys

$$r^2\dot{\varphi} = C, \quad C = \text{const} > 0. \quad (1.32)$$

Padauginę pirmąjį lygtį iš \dot{r} , o antrąjį iš $\dot{\varphi}$, perrašysime jas taip:

$$r\ddot{r} - r\dot{r}\dot{\varphi}^2 + \frac{k}{r^2}\dot{r} = 0.$$

$$2r\dot{r}\dot{\varphi}^2 + r^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} = 0.$$

Sudėję šias lygtis gausime

$$\dot{r}\ddot{r} + r\dot{r}\dot{\varphi}^2 + r^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + \frac{k}{r^2}\dot{r} = 0.$$

Pastebėsime, kad kairioji pastarosios lyties pusė yra pilnasis diferencialas. Todėl ją galima perrašyti taip:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{k}{r} \right] = 0 \iff \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{k}{r} = C_1. \quad (1.33)$$

Suintegravę (1.32)lygtį nuo t_1 iki t_2 , gausime

$$\frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} r^2\dot{\varphi} dt = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} r^2 d\varphi = \frac{1}{2}C(t_2 - t_1).$$

Tai yra *antrasis Keplerio dėsnis*¹. Jis teigia, kad planetos skrieja aplink Saulę taip, kad planetos spindulys vektorius per vienodą laiko tarpą apibrėžią vienodą plotą.

Išreiškė iš (1.32) išvestinę $\dot{\varphi}$ ir įstatę į (1.33), gausime

$$\frac{1}{2} \left(\dot{r}^2 + \frac{C^2}{r^2} \right) - \frac{k}{r} = C_1 \iff \pm \frac{dr}{\sqrt{2C_1 + \frac{2k}{r} - \frac{C^2}{r^2}}} = dt = \frac{r^2}{C} d\varphi.$$

¹Šiuolaikinėje literatūroje Keplerio dėsnį numeracija skiriasi nuo originalios, suformuluotos Keplerio. Keplerio formuluočių tai yra pirmasis Keplerio dėsnis.

Integruodami šią lygtį randame

$$\mp \arccos \left\{ \frac{C^2 - kr}{r\sqrt{k^2 + 2C_1 C^2}} \right\} = \varphi - C_2$$

arba

$$r = \frac{C^2}{k + \sqrt{k^2 + 2C_1 C^2} \cos(\varphi - C_2)}.$$

Tai yra elipsės lygtis polinėse koordinatėse. Kai $C_2 = 0$, gausime, kad elipsės ašis yra tiesėje $\varphi = 0$. Pažymėkime

$$p = \frac{C^2}{k}, \quad \varepsilon = \sqrt{1 + 2\frac{C_1 C^2}{k^2}}.$$

Tada elipsės lygtį galima užrašyti taip:

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}.$$

Tai yra *pirmasis Keplerio dėsnis*¹. Jis teigia, kad planeta skrieja aplink Saulę elipse, kurios viename iš židinių yra Saulė.

Elipsės pusašės

$$a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2} = -\frac{k}{2C_1}, \quad C_1 < 0, \quad b = \sqrt{pa} = \frac{C}{\sqrt{-2C_1}}.$$

Tegu T yra laikas, per kurį planeta apskrieja aplink Saulę. Tada elipsės ribojamos figūros plotas

$$\pi ab = \frac{1}{2}CT.$$

Iš šių formulų lengvai galima išvesti, kad

$$T^2 = 4\pi^2 a^3 \frac{1}{k}.$$

Tai yra *trečiasis Keplerio dėsnis*. Jis teigia, kad laiko kvadratas, per kurį planeta apskrieja aplink Saulę, yra proporcingas didžiosios pusašės kubui.

4. R u t u l i u k o s v y r a v i m ū l y g t i s. Rutuliuko, pritvirtinto prie spyruoklės, svyravimų matematinių modelių dviem skirtingais metodais sudarėme 1.2 skyrelyje. Parodysime, kad taikant Hamiltono principą yra gaunama ta pati rutuliuko svyravimą aprašanti lygtis.

Priminsime, kad masės m rutuliuko kinetinė ir potencinė energija lygi

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2, \quad P = \frac{1}{2}kx^2.$$

Remiantis Hamiltono principu sudarome integralą

$$I(x) = \int_{t_1}^{t_2} (T - P) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) dt. \quad (1.34)$$

¹Keplerio formuluojetėje tai yra antrasis Keplerio dėsnis

Ji atitinka Oilerio lygtis

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0.$$

5. Lėktuvos greitis l turi skristi lėktuvas, kad per laiką T apskrietų didžiausio ploto figūrą, jeigu lėktuvos greitis, kai nėra vėjo, lygus v_0 , o vėjo greitis a yra pastovus ir turi pastovią kryptį.

Tarkime, vėjo kryptis yra nukreipta x ašies kryptimi ir lėktuvos masės centro padėtį laiko momentu t galima apibrėžti lygtimis:

$$x = x(t), \quad y = y(t).$$

Be to, tegu

$$\alpha = \alpha(t)$$

yra kampus tarp x ašies ir lėktuvos krypties. Lėktuvos greičio vektorius

$$v(t) = (x'(t), y'(t)).$$

Antra vertus, šis greičio vektorius

$$v(t) = (v_0 \cos \alpha + a, v_0 \sin \alpha).$$

Sulyginę šias reikšmes gausime

$$x' = v_0 \cos \alpha + a, \quad y' = v_0 \sin \alpha. \quad (1.35)$$

Plotas figūros, kurios kontūru skrenda lėktuvas, išreiškiamas integralu

$$I(l) = \frac{1}{2} \int_0^T (xy' - yx') dt.$$

Taigi reikia rasti kampą α ir kreivę $l : x = x(t), y = y(t)$, kurie tenkintų (1.35) sąlygas ir suteiktų funkcionalui $I(l)$ didžiausią reikšmę. Tai yra sąlyginio ekstremumo uždavinys. Funkcijų trejetas α, x ir y yra šio uždavinio sprendinys, jeigu prie tam tikrų Lagranžo daugiklių $\lambda_1 = \lambda_1(t), \lambda_2 = \lambda_2(t)$ jos yra funkcionalo

$$I^*(l) = \int_0^T [xy' - yx' - \lambda_1(x' - v_0 \cos \alpha - a) - \lambda_2(y' - v_0 \sin \alpha)] dt$$

ekstremalės. Ši funkcionalą atitinka trys Oilerio lygtys:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(F_{x'}) - F_x &= 0 \iff \frac{d}{dt}(-y - \lambda_1) - y' = 0, \\ \frac{d}{dt}(F_{y'}) - F_y &= 0 \iff \frac{d}{dt}(x - \lambda_2) + x' = 0, \\ \frac{d}{dt}(F_{\alpha'}) - F_{\alpha} &= 0 \iff -\lambda_1 \sin \alpha + \lambda_2 \cos \alpha = 0. \end{aligned}$$

Iš pirmųjų dviejų lygčių randame

$$2x + c_2 = \lambda_2, \quad 2y + c_1 = -\lambda_1.$$

Apibrėžkime polines koordinates

$$x + c_2/2 = \tilde{r} \cos \varphi, \quad y + c_1/2 = \tilde{r} \sin \varphi.$$

Tada

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2y + c_1}{2x + c_2} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$

Iš trečiosios Oilerio lygties gauname, kad

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \operatorname{ctg} \alpha.$$

Todėl yra teisiga formulė

$$\operatorname{tg} \varphi = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

Iš jos randame

$$\alpha = \varphi + \pi/2.$$

Kartu galime tvirtinti, kad kiekvienu laiko momentu t kampas tarp lėktuvo krypties ir padėties vektorių yra status.

Įstatę rastą α reikšmę į (1.35) formules, gausime sistemą

$$x' = -v_0 \sin \varphi + a, \quad y' = v_0 \cos \varphi.$$

Padauginę pirmąją lygtį iš x , antrąją iš y , ir abi gautas lygtis sudėje, gausime

$$xx' + yy' = ax = ar \cos \varphi = ar \sin \alpha.$$

Pastarąją lygtį galima perrašyti taip:

$$r \frac{dr}{dt} = ar \sin \alpha, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Kadangi $\sin \alpha = y'/v_0$, tai


$$\frac{dr}{dt} = \frac{a}{v_0} \frac{dy}{dt}.$$

Suintegravę pastarąją lygtį, gausime

$$r = \frac{a}{v_0} y + C.$$

Pagal uždavinio prasmę skaičius $e := a/v_0 < 1$. Todėl pastaroji lygtis apibrėžia elipsę, kurios ekscentricitetas yra e ir vienas iš židinių yra koordinačių pradžios

taške, o elipsės didžioji ašis nukreipta y ašies kryptimi.




1.10 pav.

Taigi didžiausio ploto figūra, kurią apibrėžia skrisdamas lėktuvas greičiu didesniu už vėjo greitį, yra elipsė. Šios elipsės didžioji ašis yra nukreipta statmenai vėjo krypčiai. Be to, lėktuvo ašies kryptis kiekvienu laiko momentu yra ortogonaliai lėktuvo masių centro radiuso vektoriui (žr. 1.10 pav.).

1.5 KELI PAPRASČIAUSI NETIESINIŲ PROCESŲ MODELIAI

Tiesiniai procesai pasižymi viena svarbia savybe. Bet kokių juos aprašančių sprendinių tiesinis darinys taip pat yra sprendinys. Netiesiniai procesai šia savybe nepasižymi. Žinant kelis netiesinį procesą aprašančius sprendinius jų tiesinis darinys nebūtinai bus sprendinys. Be to, jeigu kokį nors netiesinį procesą aprašantį parametrą pakeisime nežymiai, tai tą procesą aprašantys dydžiai gali pasikeisti iš esmės. Daugumas netiesinių procesų ir juos aprašančių matematinių modelių yra netiesiniai. Tiesiniai modeliai dažniausiai yra netiesinių modelių pirmieji artiniai. Pateiksime kelis paprasčiausius netiesinių modelių atvejus.

1. Švytuoklės svaravimas. Tarkime, vienas strypo galas yra pritvirtintas prie sijos, o prie kito strypo galo pritvirtintas kūnas masės m . Be to, tegu strypo masė yra pakankamai maža lyginant su kūno mase, o strypas įtvirtinimo vietoje gali laisvai, be trinties, suktis (žr. 1.11 pav.).



1.11 pav.

Nagrinėsime plokščią švytuoklės svyravimą ir laikysime, kad oro pasipriešinimo galime nepaisyti. Kokiu nors būdu švytuoklė išveskime iš pusiausvyros padėties. Pažymėkime raide α švytuoklės nuokryprio kampą nuo pusiausvyros padėties. Tada nagrinėjamos sistemos kinetinė energija

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(l\frac{d\alpha}{dt}\right)^2,$$

o potencinė energija

$$P = mgh = mg(l - l \cos \alpha);$$

čia l – strypo ilgis, g – laisvo kritimo pagreitis, $h \geq 0$ – švytuoklės nuokrypis nuo žemiausios padėties. Remiantis Hamiltono principu sudarome integralą

$$I(\alpha) = \int_{t_1}^{t_2} (T - P) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{1}{2}m\left(l\frac{d\alpha}{dt}\right)^2 - mg(l - l \cos \alpha) \right] dt.$$

Tegu funkcija $\alpha = \alpha(t)$ aprašo realų švytuoklės svyravimą. Tada ji turi tenkinti Oilerio lygtį

$$l\frac{d^2\alpha}{dt^2} + g \sin \alpha = 0.$$

Pastaroji lygtis yra netiesinė antros eilės lygtis. Tačiau jeigu svyravimai maži, tai $\sin \alpha \approx \alpha$ švytuoklės mažų svyravimų matematinis modelis yra tiesinis

$$l\frac{d^2\alpha}{dt^2} + g\alpha = 0.$$

Netiesinės lygties atveju rasti sprendinio analizinę išraišką dažniausiai neįmanoma. Todėl tokį lygčių sprendimui pasitelkiami skaitiniai metodai.

2. Š u o l i s s u p a r a š i u t u. Tarkime, parašiutininkas masės m išskleidžia parašiutą laiko momentu $t = 0$ ir jo greitis šiuo momentu $v(0) = v_0$. Tegu šis greitis nukreiptas sunkio jėgos kryptimi. Tada parašiutininko trajektorija yra tiesė. Rasime parašiutininko greitį bet kuriuo laiko momentu t , jeigu oro pasipriešinimo jėga U yra tiesiog proporcinga greičio kvadratui, t.y. $U = bv^2$ (proporcingumo koeficientas b priklauso nuo parašiuto). Parašiutininką veikia sunkio jėga $P = mg$ ir oro pasipriešinimo jėga U nukreipta priešinga judėjimui kryptimi. Todėl pagal antrajį Niutono dėsnį

$$ma = P - U \iff m \frac{dv(t)}{dt} = mg - bv^2.$$

Taigi funkcija v turi tenkinti lygtį

$$\frac{dv(t)}{dt} = -(v^2 - k^2) \frac{b}{m}, \quad k^2 = \frac{mg}{b}.$$

Atskyre kintamuosius ir integruodami gausime

$$\int \frac{dv}{v^2 - k^2} = - \int \frac{b}{m} dt. \quad (1.36)$$

Kadangi

$$\frac{1}{v^2 - k^2} = \frac{1}{2k} \left(\frac{1}{v - k} - \frac{1}{v + k} \right),$$

tai

$$\int \frac{dv}{v^2 - k^2} = \frac{1}{2k} \left(\int \frac{dv}{v - k} - \int \frac{dv}{v + k} \right) = \frac{1}{2k} (\ln |v - k| - \ln |v + k|)$$

ir (1.36) lygybę galime perrašyti taip:

$$\ln \left| \frac{v - k}{v + k} \right| = -\frac{2bk}{m} t + \ln |c| \iff \frac{v - k}{v + k} = ce^{-\frac{2bk}{m} t}.$$

Išsprendę šią lygtį v atžvilgiu, gausime

$$v(t) = k \frac{1 + ce^{-\frac{2bk}{m} t}}{1 - ce^{-\frac{2bk}{m} t}}. \quad (1.37)$$

Iš šios formulės matome, kad parašiutininko greitis $v(t) \rightarrow k$, kai $t \rightarrow +\infty$. Iš salygos $v(0) = v_0$ randame laisvąją konstantą

$$c = \frac{v_0 - k}{v_0 + k} < 1.$$

Istatę taip apibrėžtą konstantą c į (1.37) formulę, rasime parašiutininko greitį laiko momentu t .

Tegu $x(t)$ yra atstumas, kurį nuskrieja parašiutininkas, iššokęs iš lėktuvo, žemės kryptimi laiko momentu t . Tada parašiutininko greitis

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = k \frac{e^{\frac{bk}{m}t} + ce^{-\frac{bk}{m}t}}{e^{\frac{bk}{m}t} - ce^{-\frac{bk}{m}t}},$$


o atstumas žemės kryptimi

$$\begin{aligned} x(t) &= k \int_0^t \frac{e^{\frac{bk}{m}s} + ce^{-\frac{bk}{m}s}}{e^{\frac{bk}{m}s} - ce^{-\frac{bk}{m}s}} ds = \frac{m}{b} \int_0^t \frac{d(e^{\frac{bk}{m}s} - ce^{-\frac{bk}{m}s})}{e^{\frac{bk}{m}s} - ce^{-\frac{bk}{m}s}} = \\ &= \frac{m}{b} \ln\left(\frac{e^{\frac{bk}{m}t} - ce^{-\frac{bk}{m}t}}{1 - c}\right). \end{aligned}$$

3. Navigacijos užduavinys. Valtis iš vieno upės kranto plaukia į kitą. Tarkime, upės krantai yra tiesėse $x = 0$ ir $x = l$ (žr. 1.12 pav.). Be to, tegu pradiniu laiko momentu valtis yra koordinatių pradžios taške $x = 0, y = 0$, upės greitis \bar{v} yra lygiagretus krantui ir upės greičio modulis $v = v(x)$, valties greičio \bar{v}_0 atžvilgiu vandens modulis $v_0 = v_0(x) > 0$ ir

$$v_0^2(x) > v^2(x), \quad \forall x \in [0, l].$$

Reikia rasti valties trajektoriją, kuria plaukdama ji pasieks kitą krantą per trumpiausią laiką.



1.12 pav.

Pažymėkime raide α nežinomą kampą tarp x ašies ir valties judėjimo krypties. Tada valties masių centro absolutaus greičio koordinatės apibrėžiamas formulėmis

$$\frac{dx}{dt} = v_0 \cos \alpha, \quad \frac{dy}{dt} = v + v_0 \sin \alpha.$$

Eliminavę iš šių lygčių laiką t randame

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v + v_0 \sin \alpha}{v_0 \cos \alpha}.$$

Pastarają lygtį perrašykime taip:

$$y' - \frac{v}{v_0 \cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Pakėlę abi šios lygties pusės kvadratų gausime reiškinio $1/\cos \alpha$ atžvilgiu kvadratinę lygtį

$$(v_0^2 - v^2) \frac{1}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + 2vy' \frac{1}{v_0 \cos \alpha} - (1 + y'^2) = 0.$$

Jos sprendinys

$$\frac{1}{v_0 \cos \alpha} = \frac{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2} - vy'}{v_0^2 - v^2}.$$

Laikas, kurį sugaista valtis plaukdama iš vieno upės kranto į kitą, priklauso nuo valties trajektorijos, t.y.

$$T(y) = \int_0^l \frac{dt}{dx} dx = \int_0^l \frac{dx}{v_0 \cos \alpha} = \int_0^l \frac{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2} - vy'}{v_0^2 - v^2} dx.$$

Tegu funkcija $y = y(x)$, $x \in [0, l]$, tenkinanti sąlygą $y(0) = 0$, aprašo realią valties trajektoriją. Leistiną valties trajektoriją galima apibrėžti lygtimi $y = y(x) + \varepsilon\eta(x)$, $\eta(0) = 0$. Taškas, kuriame valtis pasiekia kitą krantą yra nežinomas. Todėl funkcijai $y = y(x)$ taške $x = l$ nekeliamai jokie reikalavimai. Kartu taške $x = l$ nekeliamai jokie reikalavimai ir funkcijai η .

Būtiną integralo T lokalaus ekstremumo egzistavimo sąlygą

$$\delta T(y, \eta) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{T(y + \varepsilon\eta) - T(y)}{\varepsilon} = 0$$

perrašykime taip:

$$\delta T(y, \eta) = \int_0^l \left[\frac{1}{v_0^2 - v^2} \left(\frac{v_0^2 y'}{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2}} - v \right) \right] \cdot \eta'(x) dx = 0. \quad (1.38)$$

Imkime šioje integralinėje tapatybėje $\eta(l) = 0$. Tada, remiantis 1.3 lema, galime tvirtinti, kad funkcija y turi tenkinti lygtį

$$\frac{1}{v_0^2 - v^2} \left(\frac{v_0^2 y'}{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2}} - v \right) = c, \quad c = \text{const.} \quad (1.39)$$

Grįžkime prie (1.38) integralinės tapatybės. Integruodami ją dalimis ir pasinaudoję tuo, kad funkcija y turi tenkinti (1.39) lygtį, gauname

$$\frac{1}{v_0^2 - v^2} \left(\frac{v_0^2 y'}{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2}} - v \right) \cdot \eta \Big|_0^l = 0.$$

Kadangi $\eta(0) = 0$, o $\eta(l)$ gali igyti bet kokias reikšmes, tai funkcija y taške $x = l$ turi tenkinti sąlygą

$$\frac{v_0^2 y'}{\sqrt{v_0^2(1 + y'^2) - v^2}} - v = 0, \quad \iff \quad y' = \frac{v}{v_0} \quad (1.40)$$

Pastaroji sąlyga yra vadinama *naturaliaja kraštine sąlyga*. Taigi ieškoma funkcija y intervale $(0, l)$ turi tenkinti (1.39) lygtį, taške $x = 0$ kraštinę sąlygą $y(0) = 0$ ir taške $x = l$ naturaliąją (1.40) kraštinę sąlygą. Pasinaudojė (1.40) sąlyga gauname, kad (1.39) lygtiję konstanta $c = 0$. Todėl pastarąjį lygtį galime perrašyti taip: $y' = v/v_0$. Integravodami ją randame, kad ieškoma valties trajektorija yra apibréžiamā lygtimi

$$y(x) = \int_0^x \frac{v(s)}{v_0(s)} ds,$$

o laikas per kurį valtis pasiekia kitą krantą


$$T = \int_0^l \frac{1}{v_0(s)} ds.$$

4. S t r y p o i š l i n k i m o u ž d a v i n y s. Tegu ilgio l strypo AB galas A yra įtvirtintas. Kitas jo galas B yra laisvas ir prie jo pritvirtintas kūnas masės m . Nustatyti strypo pusiausvyros formą, nekreipiant dėmesio į jo paties mase.

Tarkime, x ašis yra horizontali tiesė, einanti per tašką A . Laisvai pasirenkame tašką $S \in AB$. Pažymėkime raide s lanko AS ilgi. Tada sunkio jėgų potencinė energija

$$P_{sj} = mgh = mg \int_0^l mg \sin \alpha ds, \quad \sin \alpha ds = dy;$$

čia h yra atstumas nuo taško B iki x ašies, o α – kampus tarp x ašies ir strypo liestinės taške S (žr. 1.13 pav.).



1.13 pav.

Tarkime, kampus α yra parametruo s funkcija, t.y. $\alpha = \alpha(s)$. Tada strypo tamprumo jėgų potencinė energija [žr. ???]

$$P_{tj} = \int_0^l J\alpha'^2(s) ds;$$

čia $\alpha' = d\alpha/ds$ – strypo kreivis, J – standumo modulis. Todėl bendra strypo potencinė energija

$$P = \int_0^l (J\alpha'^2 + mg \sin \alpha) ds$$

Tarkime, funkcija $\alpha = \alpha(s)$, $s \in [0, l]$, aprašo realų strypo išlinkimą. Tada ji turi tenkinti Oilerio lygtį

$$2J\alpha'' - mg \cos \alpha = 0.$$

Be to, įtvirtintame strypo gale A turi būti patenkinta kraštinė sąlyga $\alpha(0) = \alpha_0$, o laisvame gale natūraliąjį kraštinę sąlyga $\alpha'(l) = 0$ (jos išvedimas yra tokis pat kaip praėitame pavyzdyje).

Tarkime, strypas yra mažai išlinkęs (t.y. artimas x ašiai) ir funkcija $y = y(x)$, $x \in [0, b]$, aprašo jo išlinkimą. Tada

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{dy}{dx} \approx \alpha.$$

Dėl tos pačios priežasties

$$\begin{aligned} \frac{d\alpha}{ds} &\approx \frac{d^2y}{dx^2}, \quad \frac{d^2\alpha}{ds^2} \approx \frac{d}{ds} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) \approx \frac{d^3y}{dx^3}, \\ \cos \alpha &\approx 1, \quad l = \int_0^b \sqrt{1 + y'^2(x)} dx \approx b. \end{aligned}$$

Be to, tegu $\alpha_0 = 0$. Tada Oilerio lygtį ir kraštines sąlygas galima užrašyti taip:

$$2J \frac{d^3y}{dx^3} - mg = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(b) = 0, \quad l \approx b.$$

Šios Oilerio lygties sprendinys

$$y = \frac{mg}{12J} x^3 + C_1 x^2 + C_2 x + C_3.$$

Iš kraštinių sąlygų randame


$$C_1 = -\frac{mgl}{2J}, \quad C_2 = C_3 = 0.$$

Taigi mažai išlenkto strypo pusiausvyros padėtį aprašo funkcija

$$y = \frac{mg}{12J} (x^3 - 6lx^2).$$

1.6 STYGOS SVYRAVIMŲ LYGTIS

Kietą kūną, kurio ilgis daug didesnis už kitus jo matmenis, vadinsime styga. Tarkime, įtempta baigtinė styga yra įtvirtinta galuose ir pusiausvyros būsenoje stygos taškai yra tiesėje. Pažymėsime šitą tiesę x ašimi, o taškus, kuriuose styga įtvirtinta – taškais a ir b . Kokiu nors būdu išveskime stygą iš pusiausvyros. Nagrinėsime tik tokius svyravimus, kai stygos taškai juda vienoje plokštumoje statmenai x ašiai. Taško x nuokrypi nuo pusiausvyros padėties pažymėsime $u(x, t)$. Tada stygos svyravimus aprašo viena skaliarinė funkcija $u = u(x, t)$. Be to, nagrinėsime tik mažus stygos svyravimus. Jėgas, kurios priešinasi stygos išlenkimui, laikysime mažomis, lyginant su jos įtempimo jėgomis.



1.14 pav.

Tegu $K(x)$ – stygos specifinė deformacijos energija taške x , dl – deformuotos stygos elemento ilgis (žr. 1.14). Tada darbas, reikalingas elemento dx deformacijai, yra proporcingas stygos ilgio pokyčiui

$$K(x)(dl - dx) = K(x)(\sqrt{1 + u_x^2} - 1) dx.$$

Kai svyravimai maži, šaknies $\sqrt{1 + u_x^2}$ skleidinyje u_x laipsniais galima atmesti aukštesniuosius laipsnius. Todėl elemento dx potencinė energija

$$K(x)(dl - dx) \approx K(x)(1 + \frac{1}{2}u_x^2 - 1) dx = \frac{1}{2}K(x)u_x^2 dx.$$

Visos stygos potencinė energija galima išreikšti integralu

$$\int_a^b \frac{1}{2}K(x)u_x^2 dx.$$

Jeigu stygą veikia išorinės jėgos, kurių linijinis tankis $f(x, t)$, tai šitų jėgų atliekamas darbas išreiškiamas integralu

$$-\int_a^b f(x, t)u dx.$$

Taigi stygos suminė potencinė energija

$$P = \int_a^b \left[\frac{1}{2}K(x)u_x^2 - f(x, t)u \right] dx.$$

Tegu $\rho(x)$ – linijinis stygos tankis taške x . Tada elemento dx kinetinė energija

$$dT = \frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 dx.$$

Visos stygos kinetinė energija

$$T = \int_a^b \frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 dx.$$

Remdamiesi Hamiltono principu, sudarome funkcionalą

$$I(u) = \int_{t_1}^{t_2} (T - P) dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_a^b \left[\frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 - \frac{1}{2} K(x) u_x^2 + f(x, t) u \right] dx dt.$$

Tarkime, funkcija u aprašo tikrąjį stygos svyravimą, η – bet kokia diferencijuojama finiti stačiakampyje $\Omega = (t_1, t_2) \times (a, b)$ funkcija, o ε – pakankamai mažas teigiamas skaičius. Tada funkcija $u + \varepsilon\eta$ aprašo leistiną stygos svyravimą.

Funkcija u yra funkcionalo I stacionarioji reikšmė. Todėl

$$\begin{aligned} \delta I(u, \eta) := & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{I(u + \varepsilon\eta) - I(u)}{\varepsilon} = \\ & \int_{t_1}^{t_2} \int_a^b [\rho(x) u_t \eta_t - K(x) u_x \eta_x + f(x, t) \eta] dx dt = 0. \end{aligned} \quad (1.41)$$

Pritaikę integravimo dalimis formulę ir pasinauduojė tuo, kad funkcija η stačiakampyje Q yra finiti, perrašysime (1.41) sąlygą taip:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_a^b [-(\rho(x) u_t)_t + (K(x) u_x)_x + f(x, t)] \eta dx dt = 0.$$

Šioje integralinėje tapatybėje η yra laisvai pasirinkta diferencijuojama finiti funkcija. Todėl reiškinys kvadratiniuose skliaustuose lygus nuliui, t.y. funkcija u tenkina Oilerio lygtį:

$$\rho(x) u_{tt} - (K(x) u_x)_x = f(x, t). \quad (1.42)$$

Iš visų (1.42) lyties sprendinių reikia išrinkti tą, kuris tenkina visas nagrinėjamo uždavinio sąlygas. Išvesdami stygą iš pusiausvyros padėties, suteikéme jai pradinį nuokrypi ir pradinį greitį. Vadinas, pradiniu laiko momentu (tarkime, momentu $t = 0$) funkcija u turi tenkinti pradines sąlygas:

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad \forall x \in [a, b]. \quad (1.43)$$

Be to, taškuose a ir b styga yra įtvirtinta. Todėl bet kuriuo laiko momentu $t \geq 0$ turi būti patenkintos kraštinės sąlygos:

$$u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0. \quad (1.44)$$

Tokiu būdu įtvirtintos taškuose a ir b stygos svyravimo uždavinys yra mišrusis (1.42)–(1.44) uždavinys.

Jeigu styga yra homogeninė ir tolygiai itempta, t.y. funkcijos ρ ir K yra pastovios, tai (1.42) lygtį galima perrašyti taip:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = F(x, t); \quad (1.45)$$

čia: $a^2 = K/\rho$, $F = f/\rho$. Ši lygtis yra vadinama *vienmate bangavimo* lygtimi.

P a s t a b a . Esant kitokioms kraštinėms sąlygomis, stygos svyravimas aprašomas ta pačia Oilerio lygtimi (tai išplaukia iš jos išvedimo). Tos pačios išlieka ir pradinės sąlygos. Keičiasi tik kraštinės sąlygos. Pavyzdžiuui, jeigu taškas $x = a$ juda pagal tam tikrą dėsnį arba ji veikia tam tikra jėga, arba jis yra elastingai įtvirtintas, tai kraštinę sąlygą šiame taške reikia pakeisti atitinkamai viena iš sąlygų:

$$u|_{x=a} = \mu(t), \quad K(x)u_x|_{x=a} = \mu(t), \quad K(x)u_x + \sigma(x, t)u|_{x=a} = 0.$$

1.7 MEMBRANOS SVYRAVIMAS IR PUSIAUSVYRA

Kietą kūną, kurio storis kur kas mažesnis už visus kitus jo matmenis, vadinsime membrana. Tarkime, pusiausvyros būsenoje membrana užima sritį $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, apribotą kontūru l , ir kontūro l taškuose yra įtvirtinta. Išveskime ją (kokiu nors būdu) iš pusiausvyros padėties. Nagrinėsime tik tokius svyravimus, kai kiekvienas membranos taškas juda tiese, statmena Ω . Pažymėsime $u(x, t)$ taško $x = (x_1, x_2) \in \Omega$ nuokrypi nuo pusiausvyros padėties laiko momentu t . Tada membranos svyravimą galima aprašyti viena skaliarine funkcija $u = u(x, t)$. Be to, nagrinėsime tik mažus membranos svyravimus ir laikysime membranos išlenkimo jėgas mažomis, lyginant su jos įtempimo jėgomis.

Membranos ir stygos svyravimo lygties išvedimas yra analogiškas. Todėl, išvesdami membranos svyravimo lygtį, praleisime kai kurias pasikartojančias detales.

Potencinę ir kinetinę membranos energijas galima išreikšti integralais:

$$P = \int_{\Omega} \frac{1}{2} K(x)(u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2) dx - \int_{\Omega} f(x, t)u dx,$$

$$T = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 dx;$$

čia: $K(x)$ – membranos specifinė deformacijos energija taške x , $f(x, t)$ – paviršinis išorinių jėgų tankis, ρ – paviršinis membranos tankis.

Remdamiesi Hamiltono principu, sudarome funkcionalą

$$I(u) = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} \rho(x) u_t^2 - \frac{1}{2} K(x)(u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2) + f(x, t)u \right] dx dt.$$

Tegu funkcija u aprašo tikrajį membranos svyravimą, η – bet kokia diferencijuoja finiti ritinyje $Q = \Omega \times (t_1, t_2)$ funkcija, o ε – pakankamai mažas teigiamas skaičius. Tada funkcija $u + \varepsilon\eta$ aprašo leistiną membranos svyravimą.

Funkcija u yra funkcionalo I stacionarioji reikšmė. Todėl

$$\begin{aligned} \delta I(u, \eta) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{I(u + \varepsilon\eta) - I(u)}{\varepsilon} = \\ &\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} [\rho(x)u_t\eta_t - K(x)(u_{x_1}\eta_{x_1} + u_{x_2}\eta_{x_2}) + f(x, t)\eta] dx dt = 0. \end{aligned}$$

Iš šios integralinės tapatybės lengvai gauname, kad funkcija u turi tenkinti Oilerio lygtį

$$\rho(x)u_{tt} - \sum_{i=1}^2 (K(x)u_{x_i})_{x_i} = f(x, t). \quad (1.46)$$

Be to, funkcija u turi tenkinti pradines

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \phi(x), \quad x \in \bar{\omega} \quad (1.47)$$

ir kraštine

$$u|_l = 0, \quad t \geq 0 \quad (1.48)$$

salygas.

Taigi įtvirtintos kontūre l membranos svyrovimo uždavinys yra mišrusis (1.46)–(1.48) uždavinys.

Tuo atveju, kai membrana yra homogeninė ir jos įtempimas visomis kryptimis yra vienodas, t.y. kai funkcijos K ir ρ yra pastovios, (1.46) lygtį galima perrašyti taip:

$$u_{tt} - a^2 \sum_{i=1}^2 u_{x_i x_i} = F(x, t); \quad (1.49)$$

čia: $a^2 = K/\rho$, $F = f/\rho$. Ši lygtis yra vadinama *dvimate bangavimo* lygtimi.

P a s t a b a . Jei membrana nėra įtvirtinta, tai Oilerio lygtis ir pradinės salygos išlieka tos pačios. Keičiasi tik kraštinė salyga. Pavyzdžiu, jeigu membranos kontūras svyruoja pagal tam tikrą dėsnį arba ji veikia tam tikra jėga, arba jis yra elastingai įtvirtintas, tai vietoje (1.48) kraštinės salygos reikia imti atitinkamai vieną iš salygų:

$$u|_l = \mu(x, t), \quad K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_l = \mu(x, t), \quad K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_l + \sigma(x, t)u|_l = 0;$$

čia: μ ir σ žinomas funkcijos, $\partial u / \partial \mathbf{n}$ – funkcijos u išvestinė normalės kryptimi. Savaime aišku, kad galimos ir kitos kraštinės salygos, taip pat ir netiesinės.

Tarkime, kontūro l taškuose nėra jokių išankstinių salygų. Be to, tegu membraną veikianti jėga f nepriklauso nuo laiko t . Veikiant šiai jėgai, membrana išsilens ir liks pusiausvyroje. Tegu funkcija $u = u(x)$, $x = (x_1, x_2) \in \Omega$ aprašo deformuotas membranos paviršių. Šiuo atveju membranos potencinė energija

$$P(u) = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} K(x) (u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2) - f(x)u \right] dx$$

igyja mažiausią reikšmę.

Tegu $\eta \in C^1(\bar{\Omega})$, ε – pakankamai mažas moduliu skaičius. Tada funkcija $u + \varepsilon\eta$ apibrėžia leistiną membranos deformaciją. Pagal Hamiltono principą deformuotas membranos potencinė energija

$$P(u) \leq P(u + \varepsilon\eta),$$

jeigu tik ε modulis yra pakankamai mažas. Todėl

$$\delta P(u, \eta) := \frac{d}{d\varepsilon} (I(u + \varepsilon\eta))|_{\varepsilon=0} = \int_{\Omega} [K(x)(u_{x_1}\eta_{x_1} + u_{x_2}\eta_{x_2}) - f(x)\eta] dx = 0.$$

Panaudojė integravimo dalimis formulę, šią integralinę tapatybę perrašysime taip:

$$\int_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^2 (K(x)u_{x_i})_{x_i} + f(x) \right] \eta \, dx - \int_l K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \eta \, dl = 0. \quad (1.50)$$

Tarkime, funkcija η lygi nuliui kontūro l taškuose. Tada

$$\int_{\Omega} \left[\sum_{i=1}^2 (K(x)u_{x_i})_{x_i} + f(x) \right] \eta \, dx = 0$$

ir funkcija u turi tenkinti Oilerio lygtį

$$\sum_{i=1}^2 (K(x)u_{x_i})_{x_i} + f(x) = 0, \quad x \in \Omega. \quad (1.51)$$

Grįžkime prie (1.50) tapatybės. Tegu η yra bet kokia diferencijuojama funkcija. Kadangi funkcija u tenkina (1.51) Oilerio lygtį, tai (1.50) tapatybę galime perrašyti taip:

$$\int_l K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \eta \, dl = 0.$$

Kontūro l taškuose funkcija η gali įgyti bet kokias reikšmes. Todėl reiškinys $K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ yra lygus nuliui, t.y. funkcija u tenkina kraštinę sąlygą

$$K(x) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0, \quad x \in l. \quad (1.52)$$

Taigi membranos pusiausvyros uždavinys yra kraštinis (1.51), (1.52) uždavinys.
Kai funkcija K yra pastovi, (1.51) lygtis yra Puasono lygtis

$$\Delta u = -F, \quad F = f/K,$$

kuri, kai $f = 0$, virsta Laplaso lygtimi

$$\Delta u = 0;$$

$$\text{čia } \Delta u = \sum_{i=1}^2 u_{x_i x_i}.$$

P a s t a b a . Nagrinėjant membranos pusiausvyros uždavinį, galimos ir kitos kraštinės sąlygos.

1.8 ŠILUMOS LAIDUMAS IR DUJŲ DIFUZIJA

Tarkime: erdvėje \mathbb{R}^3 kietas kūnas užima sritį Ω ; žinoma jo temperatūra pradiniu laiko momentu $t = 0$ ir paviršiaus $S = \partial\Omega$ temperatūra bet kuriuo laiko momentu $t \geq 0$. Ištirsime temperatūrą kūno viduje. Kūno temperatūrą taške $x = (x_1, x_2, x_3) \in \Omega$ laiko momentu t pažymėsime $u(x, t)$. Tegu $\Omega' \subset \Omega$ – bet kokia vidinė sritis su glodžiu paviršiumi S' . Pagal Furjė dėsnį šilumos kiekis, pratekantis per paviršių S' laikotarpiu $t_2 - t_1$, išreiškiamas integralu

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{S'} k(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' dt;$$

čia: k – šilumos laidumo koeficientas, $\partial u / \partial \mathbf{n}$ – funkcijos u išvestinė normalės kryptimi.

Kai yra šilumos šaltiniai su tankiu $f(x, t)$, tai šilumos kiekis, patenkantis iš jų į sritį Ω' laikotarpiu $t_2 - t_1$, lygus

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} f(x, t) dx dt.$$

Antra vertus, tas pats šilumos kieko pokytis srityje Ω' laikotarpiu $t_2 - t_1$ lygus

$$\int_{\Omega'} c(x) \rho(x) u(x, t_2) dx - \int_{\Omega'} c(x) \rho(x) u(x, t_1) dx = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} c(x) \rho(x) u_t(x, t) dx dt;$$

čia $\rho(x)$ ir $c(x)$ – atitinkamai kūno tankis ir šilumos talpumas (specifinė šiluma) taške x . Išskirtoje srityje Ω' sudarome *šilumos balanso* lygtį:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{S'} k(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} f(x, t) dx dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} c(x) \rho(x) u_t(x, t) dx dt.$$

Pagal Gauso–Ostrogradskio formulę

$$\int_{S'} k(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' = \int_{\Omega'} \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (k(x, t, u) u_{x_i}) dx.$$

Todėl šilumos balanso lygtį galima perrašyti taip:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} \left[\sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (k(x, t, u) u_{x_i}) - c(x) \rho(x) u_t + f(x, t) \right] dx dt = 0. \quad (1.53)$$

Kadangi integravimo rėžiai t_1, t_2 ir sritis Ω' pasirinkti laisvai, tai reiškinys kvadratiniuose skliaustuose yra lygus nuliui, t.y. funkcija u tenkina lygtį

$$\sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (k(x, t, u) u_{x_i}) - c(x) \rho(x) u_t + f(x, t) = 0, \quad \forall x \in \Omega, t > 0. \quad (1.54)$$

Iš visų šios lygties sprendinių reikia išrinkti tą, kuris tenkintų pradines ir kraštines sąlygas. Nagrinėjamu atveju yra žinoma kūno temperatūra pradiniu laiko momentu ir kūno paviršiaus temperatūra bet kuriuo laiko momentu. Todėl funkcija u turi tenkinti pradine

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in \bar{\Omega} \quad (1.55)$$

ir kraštine

$$u|_S = \mu_1(x, t), \quad t \geq 0 \quad (1.56)$$

sąlygas. Taigi šilumos pasiskirstymo kietame kūne $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ uždavinys yra mišrus (1.54)–(1.56) uždavinys.

P a s t a b o s:

1. Paviršiuje S galimi ir kiti šilumos režimai. Pavyzdžiui, jeigu kiekvienu laiko momentu t žinome šilumos kiekį $\mu_2(x, t)$, kuris patenka į sritį Ω per paviršių S , arba žinome supančios sritį Ω erdvės temperatūrą $\mu_3(x, t)$, tai vietoje (1.56) kraštinės sąlygos reikia imti atitinkamai vieną iš sąlygų:

$$k(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S = \mu_2, \quad k(x, t, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S + \sigma(x, t, u)(u - \mu_3)|_S = 0;$$

čia σ – šilumos mainų koeficientas.

2. Jeigu $\Omega = \mathbb{R}^n$, tai (1.56) sąlyga neturi prasmės ir nagrinėjamas uždavinys susiveda į (1.54)–(1.55) Koši uždavinį.
3. Tuo atveju, kai nagrinėjamas kūnas yra homogeninis, t.y. funkcijos k, ρ ir c yra pastovios, (1.54) lygtis yra *šilumos laidumo* lygtis

$$u_t - a^2 \Delta u = F(x, t); \quad (1.57)$$

$$\text{čia: } a^2 = \frac{k}{c\rho}, \quad F = \frac{f}{c\rho}, \quad \Delta u = \sum_{i=1}^3 u_{x_i x_i}.$$

Jeigu procesas stacionarus, t.y. temperatūros pasiskirstymas yra nusistovėjęs ir laikui bėgant nekinta, tai funkcijos u, f ir k nepriklauso nuo kintamojo t . Todėl $u_t = 0$ ir (1.54) lygtį galima perrašyti taip:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (k(x, u) u_{x_i}) + f(x) = 0, \quad x \in \Omega.$$

Kai funkcija k yra pastovi, ši lygtis yra Puasono lygtis

$$-\Delta u = F, \quad F = f/k,$$

o kai ir $f = 0$, – Laplaso lygtis

$$\Delta u = 0.$$

Aišku, kad nagrinėjant stacionarų procesą, pradinė sąlyga nereikalinga, o kraštinių sąlyga išlieka. Praktiniuose uždaviniuose dažniausiai naudojamos tokios kraštinių sąlygos:

$$u|_S = \mu(x), \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S = \mu(x), \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S + \sigma(x)u|_S = \mu(x).$$

Dvimačiu ir vienmačiu atvejais gaunamos analogiškos lygtys. Pavyzdžiu, jeigu nagrinėjamasis kūnas yra plona plokštė arba plonas strypas ir atitinkamai šiluma sklinda dviem arba viena kryptimi, tai gausime dvimatę arba vienmatę šilumos laidumo lygtį

$$u_t - a^2(u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2}) = F, \quad u_t - a^2 u_{x_1 x_1} = F.$$

Išnagrinėsime dujų difuzijos uždavinį. Tarkime, dujos arba ištirpintos tirpale medžiagos dalelės netolygiai pasiskirsčiusios kokioje nors srityje Ω . Dalelių arba dujų koncentraciją¹ taške $x \in \Omega$ laiko momentu t pažymėsime $u(x, t)$.

Tegu $\Omega' \subset \Omega$ – kokia nors vidinė sritis; $S' = \partial\Omega'$ – glodus paviršius. Dalelių arba dujų kiekis, patenkantis per paviršių S' laikotarpiu $t_2 - t_1$, kai nėra išorinių šaltinių, išreiškiamas integralu

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{S'} D(x, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' dt;$$

čia $D(x, u) > 0$ – difuzijos koeficientas. Jeigu yra šilumos šaltiniai ir $f(x, t)$ jų intensyvumas, tai visas dujų arba dalelių kiekis, patenkantis į sritį Ω' laikotarpiu $t_2 - t_1$, lygus

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{S'} D(x, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} f(x, t) dx dt.$$

Kita vertus, dujų arba dalelių kiekio pokytis srityje Ω' laikotarpiu $t_2 - t_1$ išreiškiamas integralu

$$\int_{\Omega'} c(x) (u(x, t_2) - u(x, t_1)) dx = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} c(x) u_t dx dt;$$

čia $c(x)$ – medžiagos akytumo koeficientas. Sulyginę gautas išraiškas, gausime lygybę

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{S'} (x, u) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS' dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} f(x, t) dx dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega'} c(x) u_t dx dt.$$

¹Koncentraciją suprantame kaip medžiagos kiekį tūrio vienete. Kalbėdami apie mažą skystojo arba dujų tūrio elementą, laikome jį mažu, lyginant su visu tūriu, bet pakankamai dideliu, lyginant su atstumais tarp molekulių, t.y. manome, kad tokiai elementai yra dar pakankamai daug molekulių. Pavyzdžiu, jeigu nagrinėjame kokio nors taško poslinkį skystyje arba dujose, tai turime omenyje ne kokios nors vienos molekulės poslinkį, o viso elementariojo tūrio, kuriame yra daug molekulių, poslinkį.

Iš jos, lygiai taip pat kaip ir šilumos pasiskirstymo kietame kūne atveju, išplaukia, kad funkcija u turi tenkinti lygtį

$$cu_t - \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dx_i} (D(x, u)u_{x_i}) = f(x, t), \quad \forall x \in \Omega, t > 0.$$

Jeigu funkcijos c ir D yra pastovios, tai ši lygtis yra šilumos laidumo lygtis.

Tam, kad difuzijos procesas būtų vienareikšmiškai apibrežtas, būtina žinoti dujų arba medžiagos dalelių skystyje koncentraciją pradiniu laiko momentu $t = 0$, t.y. funkcija u turi tenkinti (1.55) pradinę sąlygą. Be to, bet kokiui laiko momentu $t \geq 0$ turi būti žinomas difuzijos režimas nagrinėjamos srities paviršiuje S . Pavyzdžiui, jeigu yra žinoma dujų arba medžiagos dalelių skystyje koncentracija paviršiuje S , tai funkcija u turi tenkinti (1.56) kraštinę sąlygą.

1.9 EKOLOGINIAI MODELIAI

Ką tik gimę gyvi organizmai (gyvūnai, daugiausčiai augalai ar mikroorganizmai) iš karto patenka į gana sudėtingą sąveiką su juos supančia aplinka ir kitų rūsių gyvais organizmais. Be to, jie patys veikia juos supančią aplinką bei kitus gyvus organizmus, keisdami ir vieną ir kitą tam tikra linkme. Ekologija nagrinėja visus šiuos veiksnius visumoje.

Visumą gyvų organizmų, kartu su juos supančia aplinka bei sąveika tarp jų, vadinsime *ekosistema*, o pačius organizmus – *individais*. Grupę vienos rūšies individų, užimančią konkrečią teritoriją ir dauginimosi procese perduodančią genetinę informaciją savo palikuonims, vadinsime *populiacija*. Modeliuojant kokią nors ekosistemą individai populiacijoje paprastai skirstomi į grupes pagal tam tikras savybes, apibrėžiančias jų išlikimą, dauginimą ir t.t. Kiekvienoje tokioje grupėje individai privalo turėti panašias savybes, lemiančias jų vystymąsi populiacijoje ir ekosistemoje. Jeigu grupių skaičius yra baigtinis, tai populiaciją (populiacijas) kiekvienu laiko momentu t galima apibrėžti n -mačiu vektoriumi

$$x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t));$$

čia n – grupių skaičius, o $x_i(t)$ yra i -tos grupės dydis (individų skaičius užimamos teritorijos vienete) laiko momentu t , arba kokia nors kita kiekybinė charakteristika. Visos populiacijos dydis

$$p(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t).$$

Požymiai pagal kuriuos individai populiacijoje gali būti skirstomi į grupes gali turėti tolydžią struktūrą. Pavyzdžiu amžius, svoris ir t.t. Šiuo atveju populiacija yra apibrėžiama tam tikra tankio funkcija. Tarkime, populiacijos individų amžių a laiko momentu t apibrėžia tankio funkcija $\rho(a, t)$. Tai reiškia, kad bet kokioms parametrų $a_1 \leq a_2$ reikšmėms individų amžiaus $a \in [a_1, a_2]$ skaičius populiacijoje laiko momentu t lygus

$$p(a_1, a_2, t) = \int_{a_1}^{a_2} \rho(a, t) da.$$

Visų individų skaičius populiacijoje laiko momentu t lygus

$$p(t) = \int_0^\infty \rho(a, t) da.$$

Gimstamumą populiacijoje nusako naujų palikuonių atsiradimas per laiko vienetą. Dažnai naudojama santykinio gimstamumo sąvoka. Ją nusako naujai gimusių per laiko vienetą ir visų populiacijos individų santykis. Mirtingumą populiacijoje nusako žuvusių individų skaičius per laiko vienetą. Dažnai naudojama santykinio mirtingumo sąvoka. Ją nusako mirusių individų per laiko vienetą ir visų populiacijos individų santykis.

Populiacijos individų augimo dinamikos modeliai sudaromi iš *balanso* lygties

$$p(t + \Delta t) = p(t) + g(t, \Delta t) - q(t, \Delta t) + h(t, \Delta t); \quad (1.58)$$

čia $p(t)$ – populiacijos individų skaičius laiko momentu t , $g(t, \Delta t)$ – gimusių individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ skaičius, $q(t, \Delta t)$ – mirusiuų individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ skaičius, $h(t, \Delta t)$ – atvykusių ar išvykusių (dėl migracijos) individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ skaičius. Bendru atveju reiškiniai g , q ir h priklauso nuo sistemos resursų r , fizinių gyvenimo sąlygų, vidinių populiacijos charakteristikų (amžiaus ir genetinės sudėties) ir nuo sąveikos su kitomis įeinančiomis į ekosistemą populiacijomis. Atkreipsime dėmesį į tai, kad gyvenimo sąlygų, resursų ir vidiniai populiacijos charakteristikų pasikeitimai veikia gimstamumą, mirtingumą bei migraciją tik po tam tikro laiko. Todėl būtina atsižvelgti į ekosistemos prieistoriją.

Sudarant ekologinius modelius neįmanoma iš karto atsižvelgti į visus faktorius, veikiančius populiaciją. Todėl esminiais paprastai laikomi vienas arba keli faktoriai. Pavyzdžiuui, tegu neesminiai yra laikomi vidiniai populiacijos charakteristikų pasikeitimai bei prieistorija. Be to, tegu individų gyvenimo sąlygos yra stacionarios (gimimo, mirimo ir individų migracijos greičiai neprisklaušo nuo laiko t). Tada

$$g(t, \Delta t, p, r) = g(p, r) \cdot \Delta t,$$

$$q(t, \Delta t, p, r) = q(p, r) \cdot \Delta t,$$

$$h(t, \Delta t, p, r) = h(p, r) \cdot \Delta t.$$

Šiuo atveju ekosisitemos su n populiacijomis ir m resursais dinamikos lygtis galima užrašyti taip:

$$\begin{cases} p_i(t + \Delta t) = p_i(t) + [g_i(p, r) - q_i(p, r) + h_i(p, r)] \Delta t, \\ r_j(t + \Delta t) = r_j(t) + d_j(p, r) \Delta t; \end{cases} \quad (1.59)$$

čia $p_i(t)$ yra i -os populiacijos individų skaičius laiko momentu t , $r_j(t)$ yra j -ojo resurso kiekis laiko momentu t , d_j yra j -ojo resurso kitimo greitis, $p = (p_1, \dots, p_n)$, $r = (r_1, \dots, r_m)$. Jeigu populiacijų kitimas yra tolydus, tiksliau funkcijos p_i yra diferencijuojamos, tai (1.59) sistemą galima perrašyti taip:

$$\begin{cases} \dot{p}_i(t) = g_i(p, r) - q_i(p, r) + h_i(p, r), \\ \dot{r}_j(t) = d_j(p, r). \end{cases} \quad (1.60)$$

Nagrinėjant (1.60) sistemą kartais patogu pereiti prie santykinių koeficientų:

$$g_i \rightarrow g_i/p_i, \quad q_i \rightarrow q_i/p_i, \quad h_i \rightarrow h_i/p_i.$$

Tada turime sistemą

$$\begin{cases} \dot{p}_i(t) = p_i [g_i(p, r) - q_i(p, r) + h_i(p, r)], \\ \dot{r}_j(t) = d_j(p, r). \end{cases} \quad (1.61)$$

Jeigu ekosistemoje resursų yra neribotas skaičius, tai (1.59) – (1.61) sistemose antrają grupę lygčių galima atmetti. Šiuo atveju kiekvienai individui populiacijai yra įvedami tam tikri parametrai, nusakantys didžiausią individui skaičių duotoje aplinkoje ir jais, pirmoje lygčių grupėje yra pakeičiamas vektorius r .

P a s t a b a. Sudarant ekosistemų dinamikos modelius kartais norima ištirti ne pačių populiacijų dinamiką, o jų tankių dinamiką. Šiuo atveju lygčių išvedimas yra analogiškas. Reikia tik vietoje populiacijos balanso lygties sudaryti populiacijos tankio balanso lygtį

$$\rho(t + \Delta t) = \rho(t) + g(t, \Delta t) - q(t, \Delta t) + h(t, \Delta t); \quad (1.62)$$

čia $\rho(t)$ – populiacijos tankis laiko momentu t , $g(t, \Delta t)$ – gimusių individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ tankis, $q(t, \Delta t)$ – mirusių individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ tankis, $h(t, \Delta t)$ – atvykusių ar išvykusių (dėl migracijos) individų laiko intervale $[t, t + \Delta t]$ tankis.

P a v y z d ž i a i:

1. Tegu $p(t)$ yra kokios nors populiacijos dydis laiko momentu t (pvz., žemės gyventojų, lydeku ežere, atomų radioaktyvioje medžiagoje ir t.t.). Tada $\dot{p}(t) = dp(t)/dt$ yra šios populiacijos kitimo greitis laiko momentu t , o $\dot{p}(t)/p(t)$ – santykinis kitimo greitis. Pastarasis yra laiko t ir populiacijos p funkcija, t.y.

$$\frac{\dot{p}(t)}{p(t)} = f(t, p). \quad (1.63)$$

Uždarote sistemoje

$$f(t, p) = g(t, p) - q(t, p);$$

čia $g(t, p)$ – santykinis gimimo, o $q(t, p)$ – santykinis mirimo greičiai. Jeigu funkcijos g ir q yra žinomos, tai nagrinėjamos populiacijos dinamiką aprašo (1.63) lygties sprendinys $p = p(t)$. Tarkime, laiko momentu $t = t_0$ populiacija yra žinoma, t.y.

$$p(t_0) = p_0. \quad (1.64)$$

Tada nagrinėjamas populiacijos uždavinys susiveda į tokį Koši uždavinį: rasti diferencijuojamą intervale $[t_0, \infty)$ funkciją $p = p(t)$, kuri tenkintų (1.63) lygtį ir (1.64) pradinę sąlygą.

Paprasčiausiu atveju, kai populiacijos santykinis kitimo greitis yra pastovus, t.y.

$$f(t, p) = k = \text{const}, \quad \forall (t, p) \in \mathbb{R}^2,$$

(1.63) lygtį (Malthus modelis) galima perrašyti taip:

$$\frac{\dot{p}(t)}{p(t)} = k \iff \frac{d}{dt} \ln |p(t)| = k.$$

Suintegravę šią lygtį, gausime

$$\ln |p(t)| = kt + \ln |C| \iff p(t) = Ce^{kt}.$$

Konstanta C randama iš (1.64) sąlygos, t.y.

$$p(t_0) = p_0 = Ce^{kt_0}.$$


Todėl nagrinėjamos populiacijos evoliucija aprašoma lygtimi

$$p(t) = p_0 e^{k(t-t_0)}. \quad (1.65)$$

P a s t a b a . Iš (1.65) formulės išvedimo išplaukia, kad $\forall p_0 \in \mathbb{R}$ Koši uždavinys

$$\dot{p}(t) = kp(t), \quad p(t_0) = p_0$$

turi vienintelį sprendinį. Be to, sprendinys $p(t) \rightarrow \infty$ (neaprëžtai auga), kai $t \rightarrow \infty$, jeigu $k > 0$, $p(t) \rightarrow 0$ (nyksta), kai $t \rightarrow \infty$, jeigu $k < 0$ ir $p(t) = p_0$, kai $k = 0$. Sprendinių kitimas p ašyje geometriškai pavaizduotas 1.15 paveikslėlyje.



1.15 pav.

Atvejis, kai funkcija f yra pastovi aprašo dvi skirtinges situacijas: populiacija p neaprëžtai didėja arba nyksta. Dažniausiai abu šie modeliai yra nerealūs. Pavyzdžiu, neaprëžtai didėjanti populiacija yra galima tik tokioje aplinkoje, kurios resursai yra neaprëžti. Norint sustabdyti neaprëžtą augimą, galima įvesti atraktorių $p^* > 0$, t.y. tarti, kad egzistuoja tokia ribinė populiacija p^* , kad

$$f(t, p) \leq 0, \quad \text{kai } p \geq p^*.$$

Funkcijų, tenkinančių šią sąlygą, yra be galo daug. Paprasčiausia iš jų yra tiesinė funkcija

$$f(t, p) = \alpha - kp = k(p^* - p), \quad p \in \mathbb{R};$$

čia k – teigiamą konstantą, $\alpha = kp^*$. Istatę taip apibrëžtą funkciją f į (1.63) lygtį, perrašysime ją taip

$$\frac{\dot{p}}{p} = k(p^* - p). \quad (1.66)$$

Pastaroji lygtis yra vadinama *aprëžto augimo* lygtimi. Atskyrejoje kintamuosius, gausime

$$\frac{dp}{k(p^* - p)p} = dt, \quad p \neq 0, p \neq p^*.$$

Reiškinys

$$\frac{1}{(p^* - p)p} = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^* - p}\right) \frac{1}{p^*}.$$

Todėl

$$\frac{1}{k} \int \frac{dp}{(p^* - p)p} = \frac{1}{kp^*} \left(\ln |p| - \ln |p - p^*| \right) = \ln \left| \frac{p}{p - p^*} \right|^{1/p^* k}$$

ir yra teisinga formulė

$$\left| \frac{p}{p - p^*} \right|^{1/p^* k} = C e^t. \quad (1.67)$$

Kai $t = t_0$, populiacija $p(t_0) = p_0$. Tarkime, $p_0 \neq 0$ ir $p_0 \neq p^*$. Tada

$$\left| \frac{p_0}{p_0 - p^*} \right|^{1/p^* k} = C e^{t_0}$$

ir pastarają formulę galima perrašyti taip

$$\left| \frac{p(t)}{p_0} \right| = \left| \frac{p(t) - p^*}{p_0 - p^*} \right| e^{(t-t_0)kp^*}.$$

Iš (1.67) formulės išplaukia, kad $p(t) \neq 0$ ir $p(t) \neq p^*$, $\forall t \geq t_0$. Todėl reiškiniai $p(t)/p_0$ ir $(p(t) - p^*)/(p_0 - p^*)$ yra teigiami ir modulio ženklų galime nerašyti

$$\frac{p(t)}{p_0} = \frac{p(t) - p^*}{p_0 - p^*} e^{(t-t_0)kp^*}.$$

Išsprendę šią lygtį p atžvilgiu, gausime

$$p(t) = \frac{p^* p_0}{p_0 + (p^* - p_0) e^{-kp^*(t-t_0)}}, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (1.68)$$

Iš pastarosios formulės matome, kad:

1. $p \rightarrow p^*$ didėdama, jei $p_0 < p^*$,
2. $p \rightarrow p^*$ mažėdama, jei $p_0 > p^*$,
3. $p = p^*$, jei $p_0 = p^*$.

Taigi, jeigu $p_0 \neq 0$ ir $p_0 \neq p^*$, tai funkcija p , apibrėžta (1.68) formule, yra vienintelis Koši uždavinio

$$\dot{p} = kp(p^* - p), \quad p(t_0) = p_0$$

sprendinys. Kai $p_0 \in (0, p^*)$, taip apibrėžta funkcija p yra didėjanti, o kai $p_0 > p^*$ – mažėjanti. Be to, kai $t \rightarrow \infty$, $p(t) \rightarrow p^*$. Funkcijos p antroji išvestinė

$$\ddot{p}(t) = \frac{d}{dt} (kp(p^* - p)) = kp(p^* - 2p) = k^2 p(p^* - p)(p^* - 2p).$$


Iš čia gauname, kad

$$\ddot{p} > 0, \quad \text{kai } p \in (0, p^*/2) \cup (p^*, +\infty)$$


ir

$$\ddot{p} < 0, \quad \text{kai } p \in (p^*/2, p^*).$$

Be to, $p = p^*/2$ yra trajektorijos vingio taškas. Aprėžto augimo lygties sprendinių kitimas kintamujų (p, t) plokštumoje ir tiesėje p pavaizduotas 1.16, 1.17 paveikslėliuose.



1.16 pav.



1.17 pav.

2. Analogiškai nagrinėjamas dviejų populiacijų sąveikos modelis. Tegu $p_1(t)$ yra kokios nors rūšies aukų, o $p_2(t)$ – grobuonių populiacijos (pvz. kiškiai – lapės). Tada kiekviena populiacija turi tenkinti "augimo lygtį," kurios dešinioji pusė turi priklausyti ir nuo kitos rūšies populiacijos, t.y.

$$\dot{p}_1/p_1 = f_1(t, p_1, p_2), \quad \dot{p}_2/p_2 = f_2(t, p_1, p_2), \quad (1.69)$$

Taigi gavome dviejų susijusių pirmosios eilės diferencialinių lygčių sistemą. Tarkime, kad grobuonis maitinasi tik aukomis, o aukų maistas yra neribotas. Toks dviejų populiacijų modelis vadinasi *Räuber–Beute* modeliu. Išskirsime du galimus šio modelio atvejus.

Tarkime, kai grobuonių néra, aukų populiacijos santykinis augimo greitis pastovus, o kai grobuonys yra, šis greitis mažėja proporcingai grobuonių skaičiui, t.y.

$$f_1(t, p_1, p_2) = \alpha_1 - \nu_2 p_2 = \nu_2(p_2^* - p_2), \quad \nu_2, p_2^* > 0;$$

čia ν_2, p_2^* – teigiamos konstantos, $\alpha_1 = \nu_2 p_2^*$. Be to, tegu grobuonių populiacijos santykinis nykimo greitis kai néra aukų yra pastovus, o, kai aukos yra, grobuonių populiacijos santykinis augimo greitis yra proporcingas aukų skaičiui, t.y.

$$f_2(t, p_1, p_2) = \nu_1 p_1 - \alpha_2 = \nu_1(p_1 - p_1^*);$$

čia ν_1, p_1^* – teigiamos konstantos, $\alpha_2 = \nu_1 p_1^*$. Tada (1.69) lygčių sistemą galima perrašyti taip

$$\dot{p}_1 = \nu_2(p_2^* - p_2)p_1, \quad \dot{p}_2 = \nu_1(p_1 - p_1^*)p_2. \quad (1.70)$$

Pastaroji sistema vadinama *Voltera–Lotka* lygčių sistema. Ji turi du pusiausvyros taškus: $(0, 0)$ ir (p_1^*, p_2^*) , t.y. taškus kuriuose sistemos dešiniosios pusės lygios nuliui. Biologinę prasmę turi tik antrasis pusiausvyros taškas. Išsiaiškinime kaip elgiasi sistemos trajektorijos jo aplinkoje. Tuo tikslu padauginkime pirmają (1.70) sistemos lygtį iš ν_1 , o antrają iš ν_2 ir gautus reiškinius sudékime. Tada gausime lygtį

$$\nu_1 \dot{p}_1 + \nu_2 \dot{p}_2 = \nu_2 \nu_1 p_2^* p_1 - \nu_2 \nu_1 p_1^* p_2.$$

Kai $p_1 \neq 0$ ir $p_2 \neq 0$ (1.70) sistemos lygtis galima perrašyti taip:

$$\nu_2 p_2 = \nu_2 p_2^* - \frac{\dot{p}_1}{p_1}, \quad \nu_1 p_1 = \nu_1 p_1^* + \frac{\dot{p}_2}{p_2}.$$

Todėl reiškinys

$$\nu_1 \dot{p}_1 + \nu_2 \dot{p}_2 = \nu_2 p_2^* \left(\nu_1 p_1^* + \frac{\dot{p}_2}{p_2} \right) - \nu_1 p_1^* \left(\nu_2 p_2^* - \frac{\dot{p}_1}{p_1} \right).$$

Suprastinę vienodus narius, gausime lygtį

$$\nu_1 \dot{p}_1 + \nu_2 \dot{p}_2 = \nu_1 p_1^* \frac{\dot{p}_1}{p_1} + \nu_2 p_2^* \frac{\dot{p}_2}{p_2}.$$


Jos bendrajį integralą

$$\nu_1 p_1 + \nu_2 p_2 = \nu_1 p_1^* \ln p_1 + \nu_2 p_2^* \ln p_2 - \ln c$$

galima perrašyti taip:

$$h_1(p_1) \cdot h_2(p_2) = c;$$

čia $h_1(p_1) = p_1^{\nu_1 p_1^*} e^{-\nu_1 p_1}$, $h_2(p_2) = p_2^{\nu_2 p_2^*} e^{-\nu_2 p_2}$, c – laisva konstanta. Funkcijos h_1 , h_2 yra to paties pavidalo. Intervale $(0, \infty)$ jos yra teigiamos ir turi vienintelį maksimumą taškuose p_1^* , p_2^* (žr. 1.18 pav.).




Todėl šių funkcijų sandauga


$$H(p) = h_1(p_1) \cdot h_2(p_2), \quad p_1 > 0, p_2 > 0$$

taip pat yra teigama ir turi vienintelį maksimumą taške $p^* = (p_1^*, p_2^*)$. Be to, jeigu bent vienas iš kintamųjų p_1, p_2 artėja į 0 arba į ∞ , tai $H(p) \rightarrow 0$. Iš čia išplaukia, kad funkcijos H lygio kreivės, apibrežtos lygtimi $H(p) = c$, yra uždaros kreivės, supančios tašką p^* . Tačiau šios kreivės yra (1.70) sistemos trajektorijos. Taigi taškas p^* yra šios sistemos centro taškas, t.y tokis taškas kai visos pakankamai artimos jam trajektorijos yra uždaros.

Voltera–Lotka lygčių sistemos krypčių laukas (žr. 2.1 skyrelį) pavaizduotas 1.19, o trajektorijų elgesys pusiausvyros taško p^* aplinkoje – 1.20 paveikslėliuose.



1.19 pav.



1.20 pav.

Iš bendros teorijos žinoma (žr. 4.1 skyrelį), kad uždaras trajektorijas atitinkančius sprendinius galima pratesti į visą realių skaičių ašį ir gauti sprendiniai yra periodinės funkcijos, t.y. egzistuoja tokis teigiamas skaičius ω , kad

$$p(t + \omega) = p(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Tai reiškia, kad kiekviena iš populiacijų p_1, p_2 periodiškai svyruoja. Tiksliau, jeigu plėšrūnų yra pakankamai mažai ($p_2 < p_2^*$), tai aukų skaičius didėja, nepriklausomai nuo to ar plėšrūnų daugėja ar mažėja. Tačiau kai plėšrūnų skaičius yra pakankamai didelis ($p_2 > p_2^*$), tai aukų skaičius mažėja. Analogiška situacija yra ir su aukomis. Jeigu aukų skaičius yra pakankamai mažas ($p_1 < p_1^*$), tai plėšrūnų skaičius mažėja, nepriklausomai nuo to ar aukų daugėja ar mažėja. Tačiau kai aukų skaičius yra pakankamai didelis ($p_1 > p_1^*$), tai plėšrūnų skaičius auga.

Voltera–Lotka sistemą galima modifikuoti taip, kad aukų populiacijos augimas nebūtų pastovus nesant grobuonims. Pagal analogiją su aprėžto augimo lygtimi sudarome sistemą

$$\dot{p}_1 = (\alpha_1 - \nu_1 p_2 - \gamma_1 p_1)p_1, \quad \dot{p}_2 = (\nu_2 p_1 - \alpha_2 - \gamma_2 p_2)p_2; \quad (1.71)$$

čia $\alpha_1, \alpha_2, \nu_1, \nu_2, \gamma_1, \gamma_2$ – teigiamos konstantos. Pastarosios sistemos pusiausvyros taškai $(0, 0)$, $(0, -\alpha_2/\gamma_2)$, $(\alpha_1/\gamma_1, 0)$, (p_1^*, p_2^*) yra algebrinių lygčių sistemas

$$\begin{cases} (\alpha_1 - \nu_1 p_2 - \gamma_1 p_1)p_1 = 0, \\ (\nu_2 p_1 - \alpha_2 - \gamma_2 p_2)p_2 = 0 \end{cases}$$

sprendiniai. Ketvirtasis taškas su koordinatėmis

$$p_1^* = \frac{\alpha_1 \gamma_2 + \alpha_2 \nu_1}{\gamma_1 \gamma_2 + \nu_1 \nu_2}, \quad p_2^* = \frac{\alpha_1 \nu_2 - \alpha_2 \gamma_1}{\gamma_1 \gamma_2 + \nu_1 \nu_2}$$

yra tiesių

$$l_1 : \alpha_1 - \nu_1 p_2 - \gamma_1 p_1 = 0, \quad l_2 : \nu_2 p_1 - \alpha_2 - \gamma_2 p_2 = 0$$

sankirtos taškas. Jis turi biologinę prasmę tik tuo atveju, kai

$$\alpha_1 \nu_2 - \alpha_2 \gamma_1 \geq 0 \iff p_2 \geq 0.$$

Atkreipsime dėmesį į tai, kad tiesės l_1 taškuose $\dot{p}_1 = 0$, t.y. krypties vektoriai yra lygiagretūs p_2 ašiai, o tiesės l_2 taškuose $\dot{p}_2 = 0$, t.y. krypties vektoriai yra lygiagretūs p_1 ašiai.

Parašę (1.71) sistemos pirmajį artinį taško $\tilde{p} = (\tilde{p}_1, \tilde{p}_2)$ aplinkoje (žr. 5.2 skyrelį), gausime matricą¹

$$A(\tilde{p}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 - \nu_1 \tilde{p}_2 - 2\gamma_1 \tilde{p}_1 & -\nu_1 \tilde{p}_1 \\ \nu_2 \tilde{p}_2 & \nu_2 \tilde{p}_1 - \alpha_2 - 2\gamma_2 \tilde{p}_2 \end{pmatrix}.$$

¹Dviejų autonominių diferencialinių lygčių sistemas $\dot{x} = f(x)$ pirmasis artinis pusiausvyros taško $x = \tilde{x}$ aplinkoje yra tiesinė sistema $\dot{x} = A(\tilde{x})(x - \tilde{x})$, kurioje matrica


$$A(\tilde{x}) = \begin{pmatrix} f_{1x_1}(\tilde{x}) & f_{1x_2}(\tilde{x}) \\ f_{2x_1}(\tilde{x}) & f_{2x_2}(\tilde{x}) \end{pmatrix}.$$

Pakeitę čia \tilde{p} pusiausvyros taškais, gausime matricas

$$A(0, 0) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & -\alpha_2 \end{pmatrix}, \quad A\left(0, -\frac{\alpha_2}{\gamma_2}\right) = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \frac{\nu_1 \alpha_2}{\gamma_2} & 0 \\ -\frac{\nu_2 \alpha_2}{\gamma_2} & \alpha_2 \end{pmatrix},$$


$$A\left(\frac{\alpha_1}{\gamma_1}, 0\right) = \begin{pmatrix} -\alpha_1 & -\frac{\nu_1 \alpha_1}{\gamma_1} \\ 0 & \frac{\nu_2 \alpha_1}{\gamma_1} - \alpha_2 \end{pmatrix}, \quad A(p_1^*, p_2^*) = \begin{pmatrix} -\gamma_1 p_1^* & -\nu_1 p_1^* \\ \nu_2 p_2^* & -\gamma_2 p_2^* \end{pmatrix}.$$

Jeigu tiesės l_1 ir l_2 pirmame ketvirtysteje nesikerta, tai galima irodyti, kad pusiausvyros taško $(\alpha_1/\gamma_1, 0)$ aplinkoje (1.71) sistemos trajektorijos elgiasi taip kaip pavaizduota 1.21 paveikslėlyje.



1.21 pav.

Jeigu tiesės l_1 , l_2 kertasi pirmame ketvirtysteje ir matricos $A(p_1^*, p_2^*)$ tikrinės reikšmės $\lambda_{1,2}$ yra kompleksiškai jungtinės, tai galima irodyti, kad (1.71) sistemos trajektorijos pusiausvyros taško (p_1^*, p_2^*) aplinkoje elgiasi taip kaip pavaizduota 1.22 paveikslėlyje



1.22 pav.

Iš atlikto tyrimo matome, kad net nežymus Voltera—Lotka lygčių sistemos modifikavimas gali išsauktis esminį šios sistemos trajektorijų pokytį. Iš tikrujų (1.71) sistema jau neturi centro taško ir jos trajektorijos néra uždaros. Tai yra charakteringa centrų savybė. Sakoma, kad centrai yra struktūriškai nestabilūs (žr. [6]). Kita galimybė atsirasti uždaroms trajektorijoms (periodiniams svyravimams), yra "ribinis ciklas." Ribiniai ciklai yra struktūriškai stabilūs. Jie neturi tendencijos išnykti, nežymiai deformatuojant sistemą. Pateiksime pavyzdį

sistemos kurioje, tinkamai parinkus parametrų reikšmes, egzistuoja ribinis ciklas, t.y. uždara trajektorija, kurios pakankamai mažoje aplinkoje visos kitos trajektorijos arba ją apsivinioja arba nuo jos nusivinioja.

3. *Cholingo—Tenerio modelis.* Tarkime, kai grobuonių néra aukų santykinis augimo greitis \dot{p}_1/p_1 lygus $\alpha_1 - \gamma_1 p_1$, o kai grobuonys yra, šis greitis mažėja proporcingai jų skaičiui, t.y. dydžiu $\nu_1 p_2$. Bendru atveju proporcingumo koeficientas néra pastovus ir priklauso nuo aukų skaičiaus. Iš tikrųjų, realiamė gyvenime sotūs grobuonys aukų nežudo. Todėl kuo daugiau yra aukų, tuo santykinai mažiau jų reikia nužudyti vienam grobuonui, kad pasisotintų. Taigi galime tarti, kad proporcingumo koeficientas ν_1 yra mažėjanti kintamojo p_1 funkcija. Be to, pagal biologinę prasmę, ji yra teigama. Apibréžkime ją taip:

$$\nu_1(p_1) = \frac{k}{d + p_1};$$

čia k ir d – teigiamos konstantos.

Vienam grobuonui išgyventi reikalingas tam tikras aukų skaičius. Tarkime, šis skaičius lygus a . Tada aukų populiacija p_1 gali išmaitinti p_1/a grobuonių. Taigi grobuonių populiacija p_2 neturi viršyti šio kritinio skaičiaus. Tarkime toliau, kad grobuonių populiacijos santykinis augimo greitis \dot{p}_2/p_2 didėja, kai $p_2 < p_1/a$ ir mažėja, kai $p_2 > p_1/a$. Tiksliau tegu šis greitis lygus $\alpha_2(1 - ap_2/p_1)$, α_2 – teigiamą konstantą. Tada populiacijų p_1, p_2 kitimo dinamiką apibréžia lygtys:

$$\dot{p}_1 = (\alpha_1 - \gamma_1 p_1 - \nu_1(p_1)p_2)p_1, \quad \dot{p}_2 = \alpha_2(1 - ap_2/p_1)p_2. \quad (1.72)$$

Tegu

$$l_1 : \alpha_1 - \gamma_1 p_1 - \nu_1(p_1)p_2 = 0, \quad l_2 : p_1 - ap_2 = 0.$$

Kreivė l_1 yra parabolė, kurios šakos nukreiptos žemyn, o viršūnės koordinatės

$$\bar{p}_1 = \frac{1}{2}(\alpha_1/\gamma_1 - d), \quad \bar{p}_2 = \frac{\gamma_1}{4k}(\alpha_1/\gamma_1 + d)^2 > 0.$$

Ji kerta ašį p_1 taškuose $(-d, 0)$, $(\alpha_1/\gamma_1, 0)$. Kreivė l_2 yra tiesė, einanti per koordinačių pradžią, su krypties koeficientu $1/a$. Pirmame ketvirtupyje


$$p_1 > 0, p_2 > 0$$

yra vienintelis šių kreivių sankirtos taškas (p_1^*, p_2^*) . Jo koordinatės


$$p_1^* = \frac{1}{2}(\alpha_1/\gamma_1 - d - k/a\gamma_1)p_1 + \frac{1}{2}\sqrt{(\alpha_1/\gamma_1 - d - k/a\gamma_1)^2 + 4d\alpha_1/\gamma_1},$$

$$p_2^* = \frac{1}{2a}(\alpha_1/\gamma_1 - d - k/a\gamma_1)p_1 + \frac{1}{2a}\sqrt{(\alpha_1/\gamma_1 - d - k/a\gamma_1)^2 + 4d\alpha_1/\gamma_1}.$$

Atvejai, kai $p_1^* > \bar{p}_1$ ir $p_1^* < \bar{p}_1$ pavaizduoti 1.23 ir 1.24 paveikslėliuose.



1.23 pav.



1.24 pav.

Atkreipsime dėmesį, kad parabolės l_1 taškuose $\dot{p}_1 = 0$, o tiesės l_2 taškuose $\dot{p}_2 = 0$.

Vietoje kintamųjų p_1, p_2 apibrėžkime naujus kintamuosius

$$x_1 = p_1/p_1^*, \quad x_2 = p_2/p_2^*.$$

Tada (1.72) sistemos galima perrašyti taip:

$$\dot{x}_1 = (\alpha_1 - \gamma_1^* x_1 - \frac{k/a}{d^* + x_1} x_2) x_1, \quad \dot{x}_2 = \alpha_2 (1 - x_2/x_1) x_2; \quad (1.73)$$

čia $\gamma_1^* = \gamma_1 p_1^*$, $d^* = d/p_1^*$. Po tokios transformacijos kreivės l_1, l_2 pereis į kreives

$$l_1^*: \alpha_1 - \gamma_1^* x_1 - \frac{k/a}{d^* + x_1} x_2 = 0, \quad l_2^*: x_2 = x_1.$$

Parabolė l_1^* kerta koordinacių aši x_1 taškuose $(-d^*, 0)$ ir $(\alpha_1/\gamma_1^*, 0)$. Jos viršunės koordinatės

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{2}(\alpha_1/\gamma_1^* - d^*), \quad \bar{x}_2 = \frac{a\gamma_1^*}{4k}(\alpha_1/\gamma_1^* + d^*)^2 > 0.$$

Parabolės l_1^* ir tiesės l_2^* sankirtos taškas $x^* = (1, 1)$ yra vienintelis (1.73) sistemos pusiausvyros taškas su teigiamomis koordinatėmis.

Parašę (1.73) sistemos pirmąjį artinį taško $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$ aplinkoje, gausime matricą

$$A(\tilde{x}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 - 2\gamma_1^*\tilde{x}_1 - \frac{k/a}{d^*+\tilde{x}_1}\tilde{x}_2 + \frac{k/a}{(d^*+\tilde{x}_1)^2}\tilde{x}_1\tilde{x}_2 & -\frac{k/a}{d^*+\tilde{x}_1}\tilde{x}_1 \\ \alpha_2\tilde{x}_2^2/\tilde{x}_1^2 & \alpha_2 - 2\alpha_2\tilde{x}_2/\tilde{x}_1 \end{pmatrix}.$$

Pusiausvyros taške x^* matrica

$$A(x^*) = \begin{pmatrix} -\gamma_1^* + \frac{k/a}{(d^*+1)^2} & -\frac{k/a}{d^*+1} \\ \alpha_2 & -\alpha_2 \end{pmatrix}.$$


Šios matricos determinantas

$$\det\{A(x^*)\} = \alpha_2 \left(\gamma_1^* - \frac{k/a}{(d^*+1)^2} + \frac{k/a}{d^*+1} \right) = \alpha_2 \left(\gamma_1^* + \frac{k/a}{(d^*+1)^2} \cdot d^* \right) > 0.$$

Matricos $A(x^*)$ pėdsakas

$$\text{Sp } A(x^*) = -\gamma_1^* + \frac{k/a}{(d^* + 1)^2} - \alpha_2$$

gali igyti kaip teigiamas, taip ir neigiamas reikšmes. Galima parodyti (žr. 4.5 skyreli), kad atitinkamai parinkus parametru reikšmes pusiausvyros taškas x^* gali būti arba mazgas, arba centras, arba židinys. Jeigu pusiausvyros taškas x^* yra židinys, tai yra galima tokia situacija, kai šio taško aplinkoje egzistuoja ribinis ciklas. (žr. 1.25 pav.).



1.25 pav.

4. *Konkuruojančios populiacijos.* Tarkime, dviejų konkuruojančių¹ populiacijų dinamikos lygtis galima užrašyti taip:

$$\dot{p}_i/p_i = f_i(p), \quad i = 1, 2; \quad (1.74)$$

čia p_i yra i -oji populiacija, o $f_i = g_i - m_i$ – jos santykinis augimo greitis. Konkuruojančių populiacijų sąveiką nusako tam tikros sąlygos, kurias turi tenkinti funkcijos f_i . Šių sąlygų pasirinkimą apsprendžia keliami uždaviniai. Norint atliliki teorinių tyrimų ir išanalizuoti visus galimus ekosistemų dinamikos variantus reikalaujama, kad funkcijos f_i tenkintų tam tikras bendras, turinčias biologinę prasmę, sąlygas (žr. pavyzdžiu [7]). Nagrinėjant realią ekosistemą funkcijos f_i yra konkretizuojamos. Tiksliau jos apibrėžiamos parametriniu pavidalu (i jas įeinantys parametrai dažniausiai turi tam tikrą biologinę prasmę). Yra žinoma gana daug tokų konkuruojančių populiacijų modelių (žr. [7]). Vieną iš tokų modelių išnagrinėsime čia.

Tegu dvi panašios gyvūnų populiacijas p_1, p_2 konkuruoja tarpusavyje ir užima tam tikrą teritoriją, kurios resursai baigtiniai. Tada yra galimos keturios skirtinges yų konkurencijos baigtys:

1. Pirmoji populiacija išgyvena, o antroji išnyksta.
2. Antroji populiacija išgyvena, o pirmoji išnyksta.
3. Abi populiacijos išgyvena.

¹ Terminas "konkurencija" gali turėti daug skirtinges aspektų. Jų čia nenagrinėsime. Sakydami, kad dvi populiacijos konkuruoja tarpusavyje, turėsime omenyje tai, kad kurios nors vienos populiacijos kitimas išsaukia priešingą kitos populiacijos kitimą.

4. Abi populiacijos išnyksta.

Kiekvieną tokią baigtį atitinka pusiausvyros taškas. Todėl populiacijas p_1, p_2 modeliuojančios dinamikos lygtys turi turėti keturis izoliuotus pusiausvyros taškus. Taigi jos turi būti netiesinės. Išnagrinėsime vieną iš paprasčiausių dviejų konkuruojančių tarpusavyje populiacijų modelių.

Tarkime, kai nėra vidinės bei tarprūšinės konkurencijos populiacijų p_1, p_2 savykiniai augimo greičiai $\dot{p}_1/p_1, \dot{p}_2/p_2$ yra pastovūs, o kai konkurencija yra, šie greičiai mažėja proporcingai populiacijų individų skaičiui. Tada populiacijų p_1, p_2 kitimą galima aprašyti netiesine sistema

$$\dot{p}_1 = (\alpha_1 - \gamma_1 p_1 - \nu_1 p_2)p_1, \quad \dot{p}_2 = (\alpha_2 - \nu_2 p_1 - \gamma_2 p_2)p_2; \quad (1.75)$$

čia $\alpha_1, \alpha_2, \nu_1, \nu_2, \gamma_1, \gamma_2$ – teigiami parametrai. Parametras α_i apibréžia populiacijos p_i savykinį augimo greitį, kai nėra konkurencijos. Parametrai γ_i ir ν_i apibréžia šio greičio mažėjimą, kai yra vidinė bei tarprūšinė konkurencija.

Pastarosios sistemos pusiausvyros taškai $(0, 0), (0, \alpha_2/\gamma_2), (\alpha_1/\gamma_1, 0), (p_1^*, p_2^*)$ yra algebrinių lygčių sistemos

$$\begin{cases} (\alpha_1 - \gamma_1 p_1 - \nu_1 p_2)p_1 = 0, \\ (\alpha_2 - \nu_2 p_1 - \gamma_2 p_2)p_2 = 0 \end{cases}$$

sprendiniai. Ketvirtasis taškas su koordinatėmis


$$p_1^* = \frac{\alpha_1 \gamma_2 - \alpha_2 \nu_1}{\gamma_1 \gamma_2 - \nu_1 \nu_2}, \quad p_2^* = \frac{\alpha_2 \gamma_1 - \alpha_1 \nu_2}{\gamma_1 \gamma_2 - \nu_1 \nu_2} \quad (1.76)$$

yra tiesių


$$l_1 : \alpha_1 - \gamma_1 p_1 - \nu_1 p_2 = 0, \quad l_2 : \alpha_2 - \nu_2 p_1 - \gamma_2 p_2 = 0$$

sankirtos taškas. Tarkime, kad toks taškas yra vienintelis. Atkreipsime dėmesį į tai, kad tiesės l_1 taškuose $\dot{p}_1 = 0$, t.y. krypties vektoriai yra lygiagretūs p_2 ašiai, o tiesės l_2 taškuose $\dot{p}_2 = 0$, t.y. krypties vektoriai yra lygiagretūs p_1 ašiai.

Konkurentinėje kovoje abi populiacijos gali išgyventi tik tuo atveju, jeigu (1.75) sistema turi pusiausvyros tašką su abiem teigiamom koordinatėm. Pirmojo pusiausvyros taško abi koordinatės lygios nuliui. Antrojo ir trečiojo pusiausvyros taškų viena koordinatė lygi nuliui. Todėl abi populiacijos gali išgyventi tik tuo atveju, kai ketvirtojo taško koordinatės yra teigiamos, t.y. kai tiesės l_1, l_2 kertasi pirmame ketvirtuje (žr. 1.26, 1.27 pav.).



1.26 pav.



1.27 pav.


Įš (1.76) formulų matome, kad $p_1^* > 0$ ir $p_2^* > 0$, jeigu

$$\alpha_1\gamma_2 < \alpha_2\nu_1, \quad \alpha_2\gamma_1 < \alpha_1\nu_2 \text{ ir } \gamma_1\gamma_2 < \nu_1\nu_2$$

arba

$$\alpha_1\gamma_2 > \alpha_2\nu_1, \quad \alpha_2\gamma_1 > \alpha_1\nu_2 \text{ ir } \gamma_1\gamma_2 > \nu_1\nu_2.$$

Šios sąlygos apibrėžia tiesių l_1, l_2 tarpusavio padėti plokštumoje. Todėl pakanka išnagrinėti atvejį, kai yra patenkinta kuri nors viena iš šių sąlygų. Tarkime, patenkinta pirmoji sąlyga (žr. 1.26 pav.). Tada galima įrodyti, kad abiejų populiacijų išnykimas yra negalimas, nes, kai $t \rightarrow \infty$, nėra nei vienos trajektorijos, kuri įeitių į koordinacijų pradžią. Abiejų populiacijų išgyvenimas yra labai retas reiškinys, nes, kai $t \rightarrow \infty$, į pusiausvyros tašką jeina tik dvi trajektorijos (separatrisės). Visos likusios trajektorijos jeina į pusiausvyros tašką $(0, \alpha_2/\gamma_2)$ arba į pusiausvyros tašką $(\alpha_1/\gamma_1, 0)$. Jeigu trajektorija jeina į pirmąjį iš šių taškų, tai išnyksta populiacija p_1 , o jeigu į antrąjį, tai populiacija p_2 . Todėl galima tvirtinti, kad jeigu yra patenkinta pirmoji iš minėtų dviejų sąlygų, tai konkuruojant dviom populiacijom viena iš jų dažniausiai išnyksta. Trajektorijų elgesys pusiausvyros taškų aplinkoje pavaizduotas 1.28 paveikslėlyje.



1.28 pav.

2 SKYRIUS


PIRMOS EILĖS DIFERENCIALINĖS LYGTYS

2.1 PIRMOSIOS EILĖS PAPRASTOSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS IŠREIKŠTOS IŠVESTINĖS ATŽVILGIU

Tegu G yra sritis plokštumoje \mathbb{R}^2 , $f \in C(G)$ ir funkcija $y = \varphi(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$ yra pirmos eilės paprastosios diferencialinės lygties

$$y' = f(x, y). \quad (2.1)$$

sprendinys. Funkcija $y = \varphi(x)$ srityje G apibrėžia kreivę l . Kreivė l vadinama *integraline kreive*. Kiekvienam taškui $(x, y) \subset G$ priskirkime atkarpat su krypties koeficientu $k = f(x, y)$, einančią per šį tašką. Tokių atkarpat visuma srityje G apibrėžia *krypciu lauką*, atitinkantį (2.1) lygtį (žr. 2.1 pav.).



2.1 pav.

Pagal apibrėžimą kreivė $l \subset G$ yra integralinė tada ir tik tada, kai ji yra glodi ir jos liestinės krypties koeficientas kiekviename taške (x, y) sutampa su $f(x, y)$. Taigi (2.1) lygtis apibrėžia sąryšį tarp kiekvieno integralinės kreivės taško ir jos liestinės krypties koeficiente tame pačiame taške. Kartais šis sąryšis leidžia gauti kokybinį integralinių kreivių vaizdą tiesiogiai iš pačios lygties, jos tiksliai nesprendžiant. Norint apytiksliai nubrėžti integralines kreives iš pradžiu tikslinga rasti geometrinę vietą taškų, kuriuose krypciu laukas yra pastovus. Ši geometrinė vieta taškų vadinama *izokline*. Izoklinės yra apibrėžiamos lygtimi $f(x, y) = k$.


Pavyzdžiai:

1. Nagrinėsime lygtį

$$y' = y/x. \quad (2.2)$$

Kiekviename taške $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, išskyrus koordinačių pradžios tašką, ieškomos integralinės kreivės krypties koeficientas $k = y/x$, t.y. sutampa su

tiesės, einančios per koordinačių pradžią ir tašką (x, y) , krypties koeficientu (žr. 2.2 pav.).



Todėl (2.2) lygties integralinės kreivės yra pustiesės

$$y = kx, \quad k \in \mathbb{R}, \quad x \neq 0.$$

2. Nagrinėsime lygtį

$$y' = -x/y. \quad (2.3)$$

Kiekviename ieškomos integralinės kreivės taške, išskyrus koordinačių pradžios tašką, liestinės krypties koeficientas $k = -x/y$. Kadangi $-x/y \cdot y/x = -1$, tai krypčių laukas sukonstruotas pirmame pavyzdje yra ortogonalus (2.3) lygties krypčių laukui (žr. 2.3 pav.). Kartu galime tvirtinti, kad (2.3) lygties integralinės kreivės yra pusapskritimai

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad a \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0$$

su centru koordinačių pradžioje.


3. Nagrinėsime lygtį

$$y' = -y/x, \quad x \neq 0. \quad (2.4)$$

Iš pradžių rasime geometrinę vietą taškų, kuriuose krypčių laukas turi tą patį krypties koeficientą k . Priminsime, kad taip apibrėžta aibė taškų vadinama izokline. Nagrinėjamu atveju izoklinės yra pustiesės

$$-y/x = k \Leftrightarrow y = -kx, \quad x \neq 0.$$

Jų taškuose laukas turi tą pačią kryptį (žr. 2.4 pav.).



2.4 pav.

Nubrėžę pakankamą skaičių izoklinių galime spėti, kad integralinės kreivės yra hiperbolių šakos. Iš tikrujų, atskyre (2.4) lygtje kintamuosius (žr. 2.2 skyrelį) ir gautą lygtį suintegruvę, gausime, kad integralinės kreivės yra hiperbolių, apibrėžtų lygtimi

$$y = c/x, \quad x \neq 0, \quad c \in \mathbb{R}$$

šakos.

Iš šių pavyzdžių matome, kad diferencialinė lygtis turi be galio daug sprendinių. Bendru atveju šiuos sprendinius galima apibrėžti lygtimi

$$\Phi(x, y, c) = 0$$

arba lygtimi išreikšta kintamojo y atžvilgiu

$$y = \varphi(x, c).$$

Norint iš jų išskirti kokį nors vieną reikia pareikalauti, kad sprendinys tenkintų kokią nors papildomą sąlygą. Dažniausiai tokia sąlyga apibrėžiama taip:

$$y(x_0) = y_0 \tag{2.5}$$

Ši sąlyga yra vadinama *pradine* arba *Koši* sąlyga. Jeigu (2.1) lygtį nagrinėsime kartu su (2.5) sąlyga, tai tokį uždavinį vadinsime *pradiniu* arba *Koši uždaviniu*.

A p i b r ė ž i m a s . Sakysime, tolydi funkcija $y = \varphi(x, c)$, apibrėžta kokioje nors srityje $D \subset \mathbb{R}^2$, yra (2.1) lygties *bendrasis sprendinys* srityje $G_0 \subset G$, jeigu

1. $\forall (x_0, y_0) \in G_0$ lygtis

$$y_0 = \varphi(x_0, c)$$

turi vieninitelį sprendinį $c_0 = c(x_0, y_0)$.

2. Taškas $(x_0, c_0) \in D$ ir $y = \varphi(x, c_0)$ yra (2.1), (2.5) Koši uždavinio sprendinys.

Sprendinj $y = \varphi(x, c_0)$, gautą iš bendrojo sprendinio paėmus konkrečią konstantos $c = c_0$ reikšmę, vadinsime *atskiruoju* (2.1) lygties sprendiniu.

P a s t a b a . Analogiškai apibrėžiami bendersis ir atskirasis (2.1) lygties sprendiniai neišreikšti išvestinės atžvilgiu. Kartais tokie sprendiniai vadinami bendruoju ir atskiruoju šios lygties *integralais*.

Nagrinėjant (2.1),(2.5) Koši uždavinį patogu lygiagrečiai nagrinėti integralinę lygtį

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds. \quad (2.6)$$

A p i b r ė ž i m a s . Funkcija $y = \varphi(x), x \in \langle a, b \rangle$ yra (2.6) integralinės lygties sprendinys, jeigu

1. $\varphi \in C\langle a, b \rangle$.
2. $(x, \varphi(x)) \in G, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle$.
3. $\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s)) ds, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle$.

Jeigu tolydi funkcija $y = \varphi(x)$ yra (2.6) integralinės lygties sprendinys, tai ji yra tolydžiai diferencijuojama, tenkina (2.1) lygtį ir (2.5) pradinę sąlygą. Atvirkštinis teiginis taip pat yra teisingas. Jeigu funkcija $y = \varphi(x)$ yra (2.1),(2.5) Koši uždavinio sprendinys, tai ji yra (2.6) integralinės lygties sprendinys.

2.2 SPRENDINIŲ EGZISTAVIMAS, VIENATIS, PRATEŠIMAS

Šiame skyrelyje be įrodymo¹ pateiksime kai kuriuos teiginius iš paprastųjų diferencialinių lygčių teorijos. Nagrinėsime vienos lygties su viena nežinomaja funkcija atveji. Tiksliau nagrinėsime pirmosios eilės paprastąjį diferencialinę lygtį, išreikštą išvestinės atžvilgiu

$$y' = f(x, y), \quad (x, y) \in G; \quad (2.7)$$

čia G – sritis plokštumoje \mathbb{R}^2 , $f \in C(G)$.

Priminsime, kad funkcija $\varphi : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ yra (2.7) lygties sprendinys, jeigu:

1. Funkcija φ yra diferencijuojama intervale $\langle a, b \rangle$.
2. Taškas $(x, \varphi(x)) \in G, \forall x \in \langle a, b \rangle$.
3. Teisinga tapatybė $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)), \forall x \in \langle a, b \rangle$.

Be to, sprendinio apibrėžimo sritis yra intervalas, t.y. jungioji aibė. Pavyzdžiu, funkcija $y = (c - x)^{-1}$ apibrėžta $\forall x \neq c$ (žr. 2.4 skyrelį) nėra lygties

$$y' = y^2 \quad (2.8)$$

sprendinys plokštumoje \mathbb{R}^2 , nors visos trys apibrėžimo sąlygos yra patenkintos. Antra vertus, funkcija $y = (c - x)^{-1}$, apibrėžta intervale $(-\infty, c)$ arba intervale (c, ∞) , yra šios lygties sprendinys.

2.1 teorema. Tegu f yra tolydi srityje G funkcija. Tada $\forall (x_0, y_0) \in G$ egzistuoja bent vienas (2.7) lygties sprendinys $y = \varphi(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$ toks, kad $\varphi(x_0) = y_0$.

Teoremoje tvirtinama, kad per kiekvieną tašką $(x_0, y_0) \in G$ eina bent viena (2.7) lygties integralinė kreivė, jeigu tik funkcija f yra tolydi srityje G . Karu yra galima ir tokia situacija, kai per vieną srities G tašką eina kelios (2.7) lygties integralinės kreivės. Pavyzdžiu, lygties

$$y' = 2\sqrt{|y|}$$

dešinioji pusė yra tolydi funkcija visoje plokštumoje \mathbb{R}^2 . Pagal 2.1 teoremą per kiekvieną tašką $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ eina bent viena šios lygties integralinė kreivė. Tiesiogiai galima įsitikinti, kad funkcija $\varphi(x) \equiv 0$, kai $x \in (-\infty, \infty)$, o taip pat funkcijos:

$$\varphi(x) = \begin{cases} (x - c)^2, & \text{kai } x \in (c, \infty); \\ 0, & \text{kai } x \in (-\infty, c) \end{cases}$$

ir

$$\varphi(x) = \begin{cases} -(x - c)^2, & \text{kai } x \in (-\infty, c); \\ 0, & \text{kai } x \in (c, +\infty), \end{cases}$$

¹Irodymus galima rasti [3] knygoje.

tenkina pastarąjį lygtį. Tarp šių funkcijų yra be galo daug tokių, kurios tenkina sąlygą $\varphi(x_0) = 0$ (pakanka paimti $c > x_0$ pirmu atveju ir $c < x_0$ antru atveju). Todėl per tašką $(x_0, 0)$ eina be galo daug nagrinėjamos lygties integralinių kreivių.

A p i b r é ž i m a s. Sakysime, sritis G yra *vienaties sritis* (2.7) lygčiai, jeigu bet kokie du jos sprendiniai, apibrėžti intervale $\langle a, b \rangle$ ir sutampantys taške $x_0 \in \langle a, b \rangle$, sutampa visame intervale $\langle a, b \rangle$.

2.2 teorema. *Tarkime, funkcijos f dalinė išvestinė f_y egzistuoja ir yra tolydi srityje G . Tada sritis G yra vienaties sritis (2.7) lygčiai.*

Jeigu funkcija f ir jos dalinė išvestinė f_y yra tolydžios srityje G , tai pagal 2.2 teoremą per kiekvieną srities G tašką eina lygiai viena (2.7) lygties integralinė kreivė. Tačiau kartais ši savybė išlieka ir tuo atveju, kai funkcija f yra tik tolydi. Pavyzdžiui lygtis

$$y' = f(x)g(y), \quad x \in (a, b), \quad y \in (c, d) \quad (2.9)$$

kiekvienam $x_0 \in (a, b)$, $y_0 \in (c, d)$ turi vienintelį sprendinį, tenkinantį pradinę sąlygą

$$y(x_0) = y_0, \quad (2.10)$$

jeigu

$$f \in C(a, b), \quad g \in C(c, d) \text{ ir } g(y) \neq 0, \quad \forall y \in (c, d).$$

Tuo lengvai galime įsitikinti (žr. 2.3 skyrelį), jeigu atskirsiame kintamuosius ir gautą lygtį suintegruosime. Taigi sritis

$$G = \{(x, y) : x \in (a, b), y \in (c, d)\}$$

yra vienaties sritis (2.9) lygčiai, nors dešinioji šios lygties pusė yra tik tolydi.

Išskirsiame kelius atvejus, kai galima garantuoti sprendinio egzistavimą ir vienatį visoje nagrinėjamoje srityje.

2.3 teorema. *Tegu funkcija f yra tolydi juostoje*

$$G = \{(x, y) : a < x < b, -\infty < y < \infty\}$$

ir kintamojo y atžvilgiu tenkina Lipšico sąlygą

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq L(x)|y - \bar{y}|, \quad \forall (x, y), (x, \bar{y}) \in G, \quad L \in C(a, b). \quad (2.11)$$

Tada $\forall (x_0, y_0) \in G$ egzistuoja vienintelis (2.7), (2.10) Koši uždavinio sprendinys $y = \varphi(x)$, apibrėžtas visame intervale (a, b) ; čia skaičiai a ir b gali igyti bet kokias reikšmes, net ir simbolius $\pm\infty$.

2.4 teorema. *Tegu funkcija f yra tolydi juostoje*

$$G = \{(x, y) : a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty\}$$

ir kintamojo y atžvilgiu tenkina Lipšico sąlygą

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq L|y - \bar{y}|, \quad \forall (x, y), (x, \bar{y}) \in G, \quad L = \text{const.} \quad (2.12)$$

Tada $\forall (x_0, y_0) \in G$ egzistuoja vienintelis apréžtas (2.7), (2.10) Koši uždavinio sprendinys $y = \varphi(x)$, apibrėžtas visame segmente $[a, b]$.

A p i b r ē ž i m a s . Tegu $y = \varphi(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$ ir $y = \psi(x)$, $x \in \langle \alpha, \beta \rangle$ yra (2.7) lygties sprendiniai. Be to, tegu $\langle \alpha, \beta \rangle \subset \langle a, b \rangle$ ir

$$\varphi(x) = \psi(x), \quad \forall x \in \langle \alpha, \beta \rangle.$$

Tada sakysime, kad sprendinys $y = \psi(x)$ yra sprendinio $y = \varphi(x)$ siaurinys, o sprendinys $y = \varphi(x)$ yra sprendinio $y = \psi(x)$ tēsinys.

Kiekvieną (2.7) lygties sprendinį, apibrėžta intervale $\langle a, b \rangle$, galima pratesti į dešinę, o sprendinį, apibrėžtą intervale $[a, b)$, galima pratesti į kairę. Jeigu $y = \varphi(x)$, $x \in (a, b)$ yra (2.7) lygties sprendinys ir jo negalima pratesti nei į kairę nei į dešinę, tai tokis sprendinys vadinamas nepratęsiamu, o intervalas (a, b) – maksimaliu sprendinio egzistavimo intervalu.

2.5 teorema. Tarkime, funkcija f ir jos dalinė išvestinė f_y yra tolydžios srityje G ir (x_0, y_0) – laisvai pasirinktas taškas srityje G . Tada egzistuoja vienintelis (2.7) lygties pilnasis sprendinys $y = \varphi(x)$, apibrėžtas maksimaliaiame intervale (a, b) , tenkinantis (2.10) sąlygą. Be to, taškas $x_0 \in (a, b)$ ir, kai $x \rightarrow a + 0$ arba kai $x \rightarrow b - 0$, taškas $(x, \varphi(x))$ artėja į srities G kontūrą ∂G .

Toliau kalbėdami apie diferencialinės lygties sprendinį, jeigu nenurodyta priešingai, visada turėsime omenyje pilnajių sprendinių.

Tegu $G = \{(x, y) : a < x < b, -\infty < y < \infty\}$ ir f yra tiesinė kintamojo y atžvilgiu funkcija, t.y.

$$f(x, y) = p(x)y + q(x), \quad p, q \in C(a, b).$$

Tada $\forall (x_0, y_0) \in G$ tiesinė lygtis

$$y' = p(x)y + q(x)$$

turi vienintelį sprendinį, apibrėžtą visame intervale (a, b) , tenkinantį (2.10) sąlygą. Iš tikrujų, funkcijos f dalinė išvestinė $f_y = p \in C(a, b)$. Todėl 2.3 teoremoje galime imti $L = p$.

Tegu $G = \{(x, y) : a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty\}$ ir yra teisinga nelygybė

$$|f_y(x, y)| \leq L, \quad \forall (x, y) \in G, \quad L = \text{const.}$$

Tada $\forall (x_0, y_0) \in G$ egzistuoja vienintelis aprėžtas (2.7), (2.10) Koši uždavinio sprendinys, apibrėžtas visame segmente $[a, b]$ (žr. 2.4 teoremą). Iš pastarosios nelygybės išplaukia, kad funkcija f kintamojo y atžvilgiu auga ne greičiau už tiesinę funkciją. Tuo atveju, kai funkcija f kintamojo y atžvilgiu auga greičiau už tiesinę funkciją, situacija gali iš esmės pasikeisti. Tiksliau, gali atsitikti taip, kad sprendinio negalima pratesti į visą intervalą (a, b) arba prateistas į visą intervalą (a, b) sprendinys nėra aprėžtas. Pavyzdžiu, funkcija $f(x, y) = y^2$ yra apibrėžta ir diferencijuojama visoje plokštumoje \mathbb{R}^2 . Todėl per kiekvieną šios plokštumos tašką eina lygiai viena lygties

$$y' = y^2$$

integralinė kreivė. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nėra jokių kliūčių sprendinių neribotai pratesti tiek į kaire, tiek į dešinę. Tačiau taip nėra. Šiuo atveju funkcija f kintamojo y atžvilgiu auga kaip kvadratinė. Todėl negalime tvirtinti, kad egzistuoja pastarosios lygties sprendinys, apibrėžtas visame intervale $(-\infty, \infty)$ ir tenkinantis laisvai pasirinktą pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$. Iš tikrujų, ši lygtis turi sprendinį $y(x) \equiv 0$, apibrėžtą visame intervale $(-\infty, \infty)$. Likusius sprendinius (žr. 2.3 skyrelį) galima apibrėžti formule

$$y = (c - x)^{-1};$$

čia $x > c$ arba $x < c$, c – laisva konstanta. Tegu $y_0 \neq 0$. Tada iš sąlygos $y(x_0) = y_0$ randame, kad $c = x_0 + y_0^{-1}$. Vadinasi, sprendinys

$$y = \frac{1}{x_0 + y_0^{-1} - x}$$

yra apibrežtas arba intervale $(-\infty, x_0 + y_0^{-1})$, arba intervale $(x_0 + y_0^{-1}, \infty)$. Taigi maksimalus sprendinio egzistavimo intervalas nesutampa su visa tiese. Be to, kai x artėja į intervalo $(-\infty, x_0 + y_0^{-1})$ arba intervalo $(x_0 + y_0^{-1}, \infty)$ kraštinius taškus, taškas $(x, y(x))$ artėja į begalybę.

P a s t a b a Visi šie teiginiai apie sprendinių egzistavimą, vienatį ir prateisimą, išlieka teisingi ir normaliajai paprastųjų diferencialinių lygčių sistemai.

2.3 LYGTYS SU ATSKIRIAMAIS KINTAMAISIAIS

Vienos iš paprasčiausių pirmos eilės diferencialinių lygčių yra lygtys su *atskiriamais kintamaisiais*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)}, \quad g(y) \neq 0. \quad (2.13)$$

Šią lygtį patogu perrašyti simetriniu pavidalu

$$g(y) dy = f(x) dx. \quad (2.14)$$

Tegu

$$f \in C[x_0 - a, x_0 + a], \quad g \in C[y_0 - b, y_0 + b].$$

Suintegravę (2.14) lygtį panariui, gausime jos bendrąjį integralą

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx + c.$$

Norit išskirti atskirą integralą, tenkinantį pradinę sąlygą

$$y(x_0) = y_0,$$

pakanka neapibrėžtinius integralus pakeisti apibrėžtiniais, t.y. perrašyti integralą taip:

$$\int_{y_0}^y g(s) ds = \int_{x_0}^x f(s) ds + c_1$$

ir pareikalauti, kad jis tenkintų pradinę sąlygą. Tada gausime, kad konstanta $c_1 = 0$, o atskirasis integralas bus apibrėžtas formule

$$\int_{y_0}^y g(s) ds = \int_{x_0}^x f(s) ds.$$

Remiantis šios formulės išvedimu galime tvirtinti, kad (2.13) lyties sprendinys, tenkinantis pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$, egzistuoja ir yra vienintelis, jeigu tik $g(y) \neq 0$.

Kai funkcija $g(y) = 1$, tai lygties

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

bendrasis sprendinys

$$y(x) = \int_{x_0}^x f(s) ds + c.$$

Atskirą sprendinį tenkinantį pradinę sąlygą

$$y(x_0) = y_0,$$

patogu užrašyti taip:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s) ds.$$

Pavyzdys. Rasime lygties

$$x dx - y dy = 0$$

bendrajį integralą. Nagrinėjama lygtis yra lygtis su atskiriamais kintamaisiais. Todėl integruodami ją panariui gauname:

$$\int x dx - \int y dy = c_1 \quad \text{arba} \quad \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = c_1.$$

Taigi bendrajį integralą galima užrašyti taip:

$$x^2 - y^2 = c, \quad c = 2c_1.$$

Pastaba. Lytyje užrašytoje simetrinėje formoje (2.14) kintamieji x ir y yra lygiatesiniai. Be to, nagrinėjant pastarąjį lygtį galima atsisakyti prielaidos, kad funkcija $g(y) \neq 0$. Šiuo atveju reikia atskirai išspręsti lygtį $g(y) = 0$ ir rasti tuos diferencialinės lygties sprendinius, kuriuos negalima gauti iš bendrojo lygties sprendinio. Tokie sprendiniai yra vadinami *ypatingais sprendiniai*

Pavyzdžiai:

- Nagrinėsime lygtį

$$y(1+x) dx + x(1-y) dy = 0.$$

Tarkime $xy \neq 0$. Tada pastaraja lygtį, padalinę iš xy gauname lygtį su atskiriamais kintamaisiais

$$\frac{1+x}{x} dx + \frac{1-y}{y} dy = 0.$$

Integruodami abi šios lygties puses randame bendrajį integralą

$$\ln|x| + x + \ln|y| - y = c \iff \ln|xy| + x - y = c.$$

Dalindami lygtį iš xy galėjome prarasti kai kuriuos sprendinius. Iš tikruju, funkcijos $x = 0$ ir $y = 0$ yra nagrinėjamos diferencialinės lygties sprendiniai. Tačiau juos negalima gauti iš bendruojo sprendinio. Todėl sprendiniai $x = 0$ ir $y = 0$ yra ypatingi sprendiniai.

- Rasime lygties

$$y' = y^2$$

sprendinį, tenkinantį pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$. Tegu $y \neq 0$. Tada atskire kintamuosius, gauname lygtį

$$\frac{dy}{y^2} = dx.$$

Suintegravę ją randame bendraji sprendinį

$$-\frac{1}{y} = x - c \iff y = \frac{1}{c-x}.$$

Pareikalavę, kad šis sprendinys tenkintų duotą pradinę sąlygą randame $c = 1/y_0 + x_0$. Taigi atskirasis nagrinėjamos lygties sprendinys

$$y = \frac{1}{y_0^{-1} + x_0 - x}.$$

Dalindami lygtį iš y^2 praradome sprendinį $y = 0$. Kadangi jo negalima gauti iš bendrojo sprendinio, tai jis yra ypatingas sprendinys.

Kai kurias pirmosios eilės paprastasias diferencialines lygtis galima suvesti į lygtis su atskiriamais kintamaisiais. Pavyzdžiui, lygtis

$$y' = f(ax + by + l), \quad a, b, l \in \mathbb{R}$$

keitiniu $v = ax + by + l$ susiveda į lygtį

$$\frac{dv}{dx} = a + bf(v)$$

su atskiriamais kintamaisiais. Integruodami ją randame bendraji integralą

$$\int \frac{dv}{a + bf(v)} = x + c.$$

Pakeitę čia v į $ax + by + l$ gausime nagrinėjamos lygties bendraji integralą
Sakysime, funkcija f yra n -tos eilės *homogeninė funkcija*, jeigu

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y).$$

Pavyzdžiui funkcija $f(x, y) = x^2 - xy$ yra antros eilės homogeninė funkcija, nes

$$f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 - (\lambda x)(\lambda y) = \lambda^2(x^2 - xy) = \lambda^2 f(x, y).$$

Funkcija $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ yra homogeninė pirmos eilės funkcija (netgi teigiamai homogeninė). Iš tikruju, yra

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = |\lambda| \sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda| f(x, y).$$

Sakysime, pirmos eilės lygtis

$$y' = f(x, y)$$

yra *homogeninė*, jeigu funkcija f yra nulinės eilės homogeninė funkcija. Parodysiame, kad pirmos eilės homogeninė lygtį galima suvesti į lygtį su atskiriamais kintamaisiais.

Tegu f yra homogeninė nulinės eilės funkcija. Tada pagal apibrėžimą

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^0 f(x, y) = f(x, y).$$

Imkime šioje formulėje $\lambda = 1/x$. Tada

$$f(x, y) = f(1, y/x) := \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

ir pirmos eilės homogeninė lygtis susiveda į lygtį

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Šioje lygtysteje vitoje ieškomos funkcijos y apibrėžkime naują ieškomą funkciją $u = y/x$. Tada $y = ux$, $y' = u'x + u$ ir naujos ieškomos funkcijos u atžvilgiu gauname lygtį

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u.$$

Ši lygtis yra lygtis su atskiriamais kintamaisiais. Radę jos bendrą sprendinį (arba bendrą integralą) ir pakeitę Jame u į y/x gausime nagrinėjamos homogeninės lyties bendrajį sprendinį (bendrajį integralą).

Pavyzdys. Rasime homogeninės lygties

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

bendrajį integralą. Kadangi funkcija esanti dešinėje šios lyties puseje yra nulinės eilės homogeninė funkcija, tai pastarają lygtį galima perrašyti taip:

$$y' = \frac{(y/x)^2 - 1}{2y/x}.$$

Vietoje ieškomos funkcijos y apibrėžkime naują ieškomą funkciją $u = y/x$. Tada funkcijos u atžvilgiu gauname lygtį su atskiriamais kintamaisiais

$$\frac{2u}{1+u^2} du = -\frac{dx}{x},$$

kurios bendrasis integralas

$$\ln(1+u^2) = -\ln|x| + \ln|c| \iff x(1+u^2) = c.$$

Pakeitę paskutinėje lygtysteje u į y/x gausime nagrinėjamos homogeninės lygties bendrajį integralą

$$x^2 + y^2 = cx.$$

Kai kurias pirmos eilės diferencialines lygtis galima suvesti į homogeninę lygtį. Pavyzdžiui, lygtis

$$y' = f\left(\frac{ax+by+c}{mx+ny+d}\right), \quad a, b, c, m, n, d \in \mathbb{R},$$

susiveda į homogeninę lygtį

$$v' = f\left(\frac{au + bv}{mu + nv}\right), \quad v' = \frac{dv}{du}.$$

Reikia tik koordinačių pradžią perkelti į tiesių

$$ax + by + c = 0, \quad mx + ny + d = 0$$

susikirtimo tašką (x_0, y_0) , t.y. atlikti keitinių

$$u = x - x_0, \quad v = y - y_0.$$

P a v y z d y s . Rasime lygties

$$y' = \frac{x + 2y + 1}{2x + y - 1}$$

bendrąjį sprendinį. Tiesių

$$x + 2y + 1 = 0, \quad 2x + y - 1 = 0$$

susikirtimo taškas $(x_0, y_0) = (1, -1)$. Tegu $u = x - 1, v = y + 1$. Tada nagrinėjama lygtis susiveda į homogeninę lygtį

$$v' = \frac{u + 2v}{2u + v}, \quad v' = \frac{dv}{du}.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$(v - u)^3 = c(v + u).$$

Grįžę prie senų kintamujų x ir y , gausime nagrinėjamos lygties bendrąjį sprendinį

$$(y - x + 2)^3 = c(x + y).$$

2.4 TIESINĖS PIRMOS EILĖS LYGTYS

Nagrinėsime tiesinę pirmos eilės lygtį

$$y' + p(x)y = f(x). \quad (2.15)$$

Šios lygties bendrajį sprendinį rasime dviem skirtingais būdais. Iš pradžių jo ieškosime konstantų variavimo metodui. Atmetę (2.15) lygtje nari $f(x)$, gausime tiesinę homogeninę lygtį

$$y' + p(x)y = 0. \quad (2.16)$$

Tai yra lygtis su atskiriamais kintamaisiais. Perrašysime ją taip:

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx.$$

Suintegravę šią lygtį gausime homogeninės lygties bendrajį sprendinį

$$\ln |y(x)| = - \int p(x) dx + \ln |c|,$$

kurį galima perrašyti taip:

$$y(x) = ce^{-\int p(x) dx}, \quad c \neq 0.$$

Akivaizdu, kad atskirasis sprendinys $y(x) = 0$, kuri mes praradome dalindami iš y , jeina į gautą formulę kai $c = 0$.

Homogeninės lygties sprendinį, tenkinantį pradinę sąlygą

$$y(x_0) = y_0,$$

patogu užrašyti taip:

$$y(x) = y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds}. \quad (2.17)$$

Remiantis šios formulės išvedimu galime tvirtinti, kad (2.16) lygties sprendinys yra vienintelis, jeigu tik jis egzistuoja. Norint įrodyti sprendinio egzistavimą pakanka pareikalauti tokio funkcijos p glodumo, kad funkcija y , apibrėžta (2.17) formulė, tenkintų visas diferencialinės lygties sprendinio apibrėžimo sąlygas. Akivaidu, kad funkcija y tenkins šias sąlygas, jeigu funkcija p bus tolydi.

Tegu y_1 ir y_2 yra kokie nors du (2.15) lygties sprendiniai. Tada jų skirtumas $y = y_1 - y_2$ yra (2.16) lygties sprendinys. Todėl bendrasis (2.15) lygties sprendinys yra lygus kokio nors atskiro šios lygties sprendinio ir bendrojo (2.16) homogeninės lygties sprendinio sumai. Rasime atskirajį (2.15) lygties sprendinį.

Konstantų variavimo metodo esmė yra ta, kad rastame tiesinės homogeninės lygties sprendinyje konstantą c pakeičiame nežinoma funkciją $c(x)$ ir atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį ieškome pavidalu

$$y = c(x)e^{-\int p(x) dx}.$$

Istatę taip apibrėžtą funkciją į (2.15), gausime lygtį

$$\begin{aligned} c'(x)e^{-\int p(x) dx} + c(x)e^{-\int p(x) dx} \cdot (-p(x)) + \\ p(x)c(x)e^{-\int p(x) dx} = f(x). \end{aligned}$$

Suprastinę šioje lygtje vienodus narius matome, kad funkcijos $c(x)$ atžvilgiu tai yra paprastoji pirmos eilės diferencialinė lygtis, kurią galima užrašyti taip:

$$c'(x) = f(x) \cdot e^{\int p(x) dx}.$$

Šios lygties sprendinys

$$c(x) = \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx.$$

Taigi atskirasis (2.15) lygties sprendinys

$$y(x) = e^{-\int p(x) dx} \cdot \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx.$$

Pridėję prie jo (2.16) homogeninės lygties bendrajį sprendinį, gausime (2.15) nehomogeninės lygties bendrajį sprendinį

$$y(x) = ce^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \cdot \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx. \quad (2.18)$$

Pareikalausime, kad taip apibrėžtas sprendinys tenkinantų pradinę sąlygą

$$y(x_0) = y_0.$$

Pakeitę (2.18) formulėje neapibrėžtinius integralus apibrėžtiniais gausime, kad $c = y_0$, o

$$y(x) = y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds} + e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds} \cdot \int_{x_0}^x f(s)e^{\int_s^{x_0} p(t) dt} ds. \quad (2.19)$$

Akivaizdu, kad ši formulė apibrėžia vienintelį sprendinį, jeigu tik jis egzistuoja. Tai tiesiogiai išplaukia iš jos išvedimo. Norint įrodyti sprendinio egzistavimą pakanka pareikalauti tokio funkcijų p ir f glodumo, kad funkcija y , apibrėžta (2.19) formule, tenkintų visas diferencialinės lygties sprendinio apibrėžimo sąlygas. Šios sąlygos bus patenkintos, jeigu pareikalausime, kad funkcijos p ir f yra tolydžios.

P a v y z d y s. Konstantų variavimo metodu rasime tiesinės nehomogeninės lygties

$$y' + 2xy = 2x$$

bendrajį sprendinį. Šią lygtį atitinkančios tiesinės homogeninės lygties

$$y' + 2xy = 0 \iff \frac{dy}{y} = -2x dx$$

bendrasis sprendinys

$$y = ce^{-x^2}.$$

Atskirojo nehomogeninės lygties sprendinio ieškome pavidalu

$$y = c(x)e^{-x^2}.$$

Istatę taip apibrėžtą funkciją į nagrinėjamą lygtį, ieškomai funkcijai c gausime lygtį

$$c'(x) = 2xe^{x^2}.$$

Šios lygties atskirasis sprendinys

$$c(x) = \int 2xe^{x^2} dx = \int e^{x^2} dx^2 = e^{x^2}.$$

Taigi atskirasis nagrinėjamos nehomogeninės lygties sprendinys

$$y = e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 1.$$

Bendrasis nehomogeninės lygties sprendinys

$$y = ce^{-x^2} + 1.$$

Dabar rasime (2.15) lygties bendrajį sprendinį *Bernulio metodu*. Sprendinio ieškosime pavidalu $y = uv$, čia u ir v ieškomos kintamojo x funkcijos ir viena iš jų, pavyzdžiu v , nelygi nuliui. Istatę taip apibrėžtos funkcijos y išraišką į (2.15) lygtį, gausime

$$u'v + uv' + p(x)uv = f(x).$$

Sugrupavę narius šią lygtį perrašome taip:

$$u'v + u(v' + p(x)v) = f(x). \quad (2.20)$$

Reikalaujame, kad reiškinys skliaustuose būtų lygus nuliui. Tada funkcijai v gauname tiesinę homogeninę pirmos eilės lygtį

$$v' + p(x)v = 0.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$v = ce^{-\int p(x) dx}.$$

Paėmę šioje formulėje $c = 1$, gausime atskirajį sprendinį

$$v = e^{-\int p(x) dx}.$$

Istatę taip apibrėžtą funkciją į (2.20) lygtį, funkcijai u gausime pirmos eilės diferencialinę lygtį su atskiriamais kintamaisiais, kurią galima užrašyti pavidalu

$$u' = f(x)e^{\int p(x) dx}.$$

Integruodami šią lygtį randame

$$u = \int f(x)e^{\int p(x) dx} dx + c.$$

Taigi bendrąji (2.15) lyties sprendinį galima užrašyti taip:

$$y = uv = \left(\int f(x)e^{\int p(x) dx} dx + c \right) e^{-\int p(x) dx}.$$

Akivaizdu, kad Bernulio metodu rastas sprendinys sutampa su konstantų variavimo metodu rastu sprendiniu (žr. (2.18) formule).

Pavyzdys. Bernulio metodu rasime tiesinės nehomogeninė lygties

$$y' - y = x$$

bendrąji sprendinį. Tegu $y = uv$. Istatę taip apibrėžtą funkciją į lygtį, gausime

$$u'v + uv' - uv = x \iff u'v + u(v' - v) = x.$$

Funkciją $v = e^x$ randame iš lyties: $v' - v = 0$. Tada funkcija u turi tenkinti lygtį

$$u' = xe^{-x} \iff u = \int xe^{-x} dx$$

Integruodami pastarąjį lygtį dalimis, gauname

$$u = -xe^{-x} - e^{-x} + c.$$

Taigi bendrasis nagrinėjamos lyties sprendinys

$$y = uv = (-xe^{-x} - e^{-x} + c)e^x = ce^x - x - 1.$$

Lygtis

$$y'(x) + p(x)y = f(x)y^\alpha, \quad \alpha \neq 0 \quad \text{ir} \quad \alpha \neq 1 \quad (2.21)$$

yra vadinama *Bernulio lygtimi*. Tegu $z = y^{1-\alpha}$ nauja nežinoma funkcija. Tada $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$ ir Bernulio lygtis virsta tiesine lygtimi

$$\frac{z'}{\alpha-1} + p(x)z(x) = f(x),$$

kurią spręsti jau mokame.

Pavyzdys. Išspręskime Bernulio lygtį

$$y' + \frac{y}{x} = y^2 \frac{\ln x}{x}.$$

Akivaizdu, kad $y = 0$ yra šios lyties atskirasis sprendinys. Tegu $y \neq 0$. Apibrėžkime naują nežinomą funkciją $z = y^{-1}$. Tada $y = z^{-1}$, $y' = -z'/z^2$ ir gauname tiesinę lygtį

$$-z' + \frac{z}{x} = \frac{\ln x}{x}.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$z = \ln x + 1 + cx.$$

Taigi nagrinėjamos Bernulio lygties bendrasis sprendinys

$$y = \frac{1}{\ln x + 1 + cx}.$$

Artindami čia c į ∞ , gausime atskirą sprendinį $y = 0$.

Lygtis

$$y'(x) + p(x)y + q(x)y^2 = f(x). \quad (2.22)$$

yra vadinama Rikati lygtimi. Bendruoju atveju ji nesuintegruejama kvadratūromis¹. Tačiau jeigu žinome koki nors atskirą jos sprendinį $y = y_1(x)$, tai apibrėžę naują nežinomą funkciją $z = y - y_1$ gausime Bernulio lygtį

$$z'(x) + [p(x) + 2q(x)y_1]z(x) + q(x)z^2(x) = 0,$$

kurią spresti mokame.

Pavyzdys. Išspręskime Rikačio lygtį

$$y' = -y^2 + 2y \sin x + \cos x - \sin^2 x.$$

Tiesiogiai galima išsitikinti, kad funkcija $y_1(x) = \sin x$ yra šios lygties sprendinys. Apibrėžkime naują nežinomą funkciją $z = y - \sin x$. Tada $y = z + \sin x$, $y' = z' + \cos x$ ir naganėjama lygtis susiveda į Bernulio lygtį

$$z' = -z^2.$$

Ši lygtis yra lygtis su atskiriamais kintamaisiais ir jos bendrasis sprendinys

$$z = \frac{1}{x + c}.$$

Taigi nagrinėjamos Rikačio lygties bendrasis sprendinys

$$y = \frac{1}{x + c} + \sin x.$$

¹Sakysime, kad diferencialinė lygtis yra integruejama kvadratūromis, jeigu jos sprendinį galima išreikšti (nebūtinai tiesiogiai) elementariomis funkcijomis ir jų neapibrėžtiniais integralais naudojant baigtinių skaičių algebrinių operacijų.

2.5 PIRMOS EILĖS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SIMETRINĖ FORMA

Nagrinėjant lygtį

$$y' = f(x, y); \quad y' = \frac{dy}{dx}$$

kartais ją patogu perrašyti taip:

$$x' = g(x, y); \quad x' = \frac{dx}{dy}, \quad g(x, y) = \frac{1}{f(x, y)}.$$

Pastarasis dvi lygtis galima apjungti į vieną, neišskiriant nei vieno iš kintamųjų. Tiksliau pirmos eilės diferencialinę lygtį, išreikštą išvestinės atžvilgiu, galima užrašyti *simetrinėje formoje*

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0; \quad (2.23)$$

čia M ir N – tolydžios srityje G funkcijos.

Jeigu bent vienas iš koeficientų M arba N taške $(x_0, y_0) \in G$ nelygus nuliui, tai (2.23) lygtį, pakankamai mažoje šio taško aplinkoje, galima suvesti į lygtį išreikštą išvestinės atžvilgiu. Jeigu kokiamame nors taške $(x_0, y_0) \in G$ abu koeficientai M ir N lygūs nuliui, t.y.

$$M(x_0, y_0) = N(x_0, y_0) = 0,$$

tai sakysime, kad taškas (x_0, y_0) yra *ypatingas taškas*. Taigi nagrinėjant diferencialines lygtis simetrinėje formoje nauja yra tai, kad abu koeficientai M ir N gali būti lygūs nuliui. Atkreipsime dėmesį į tai, kad ankstesnė teorija neatsako į klausimus ar egzistuoja integralinė kreivė einanti per ypatingą tašką, kiek tokiu integralinių kreivių yra, kaip elgiasi integralinės kreivės arti ypatingo taško. Be to, (2.23) lygties atveju integralinė kreivė gali turėti liestinę lygiagrečią bet kuriai iš koordinačių ašių, ji ne būtinai eina nuo vieno srities krašto iki kito (pavyzdžiu iji gali būti uždara) ir t.t..

Y p a t i n g u t a š k u p a v y z d ū i a i .

1. Lygties

$$y dy + x dx = 0$$

integralinės kreivės yra apskritimų šeima $x^2 + y^2 = c^2$ su centru koordinatų pradžioje (žr. 2.3 pav.). Taškas $(0, 0)$ yra šios lygties ypatingas taškas. Tokio tipo taškas yra vadinamas *centru*.

2. Lygties


$$y dx + x dy = 0$$

bendrasis sprendinys $y = c/x$ apibrėžia hiperbolių šeimą (žr. 2.4 pav.). Tokio tipo ypatingas taškas vadinamas *balno tašku*.

3. Lygties

$$x \, dy - 2y \, dx = 0$$

bendrasis sprendinys $y = cx^2$ apibrėžia parabolių šeimą (žr. 2.5 pav.).



2.5 pav.

Tokio tipo ypatingas taškas vadinamas *mazgu*.


4. Lygties

$$(x + y) \, dx - (x - y) \, dy = 0$$

integralinės kreivės yra logaritminių spiralių šeima (žr. 2.6 pav.)

$$\sqrt{x^2 + y^2} = ce^{\operatorname{arctg} \frac{y}{x}}.$$

Polinése koordinatėse šią lygtį galima perrašyti taip: $r = ce^\varphi$.



2.6 pav.

Tokio tipo ypatingas taškas vadinamas *židiniu*.

Tegu Σ yra aibė ypatingų taškų. Kadangi funkcijos M ir N yra tolydžios, tai aibė Σ yra uždara. Kartu aibė $G \setminus \Sigma$ yra atvira.

Kiekvienam taškui $(x_0, y_0) \in G \setminus \Sigma$ egzistuoja tokia jo aplinka, kurioje arba $M(x, y) \neq 0$ arba $N(x, y) \neq 0$. Šioje aplinkoje (2.23) lygtis yra ekvivalenti vienai iš lygčių

$$y' = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}, \quad x' = -\frac{N(x, y)}{M(x, y)}. \quad (2.24)$$

Todėl (2.23) lygties sprendinj galima apibrėžti kaip vienos iš (2.24) lygčių sprendinj.

Koši uždavinys diferencialinės lygties simetrinėje formoje atveju formulojamas taip pat kaip nesimetrinės lygties atveju. Reikia rasti (2.23) lygties sprendinj, einanti per tašką (x_0, y_0) . Jeigu $(x_0, y_0) \in G \setminus \Sigma$ ir $y = \varphi(x)$ (arba $x = \psi(y)$) yra Koši uždavinio

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad y(x_0) = y_0 \text{ (arba } x(y_0) = x_0\text{)}$$

sprendinys, tai jis yra vienos iš (2.24) lygčių sprendinys. Todėl nagrinėjant (2.23) lygtį išlieka teisingi visi ankstesni apibrėžimai ir teiginiai, turintys lokalų charakterį.

Srityje G (2.23) lygtis apibrėžia krypciu lauką. Tiksliau ši lauką apibrėžia viena iš (2.24) lygčių. Todėl krypciu laukas yra apibrėžtas kiekviename neypatingame srities G taške. I ši krypciu lauką įeina ir kryptys lygiagrečios koordinacių ašims. Priminsime, kad integralinė kreivė tai sprendinio grafikas. Todėl kiekviena glodi kreivę gulinti srityje G yra integralinė kreivė, jeigu jos kiekviename taške liestinės kryptis sutampa su lauko kryptimi. Bet kurios dvi integralinės kreivės gulinčios vienatinumo srityje ir turinčios bendrą tašką, sutampa bendroje jų apibrėžimo srityje. Be to, kiekviena glodi kreivę, kurios visi taškai yra ypatingi, yra integralinė kreivė.

Reikalavimas, kad integralinė kreivė būtų apibrėžta lygtimi $y = \varphi(x)$ arba lygtimi $x = \psi(y)$ yra susijęs tik su sprendinio apibrėžimu. Bendru atveju integralinę kreivę galima apibrėžti kaip bet kokią glodžią kreivę, kurios liestinės kryptis kiekviename taške sutampa su lauko kryptimi. Kiekvieno savo taško aplinkoje tokia kreivė yra funkcijos grafikas. Tačiau visoje srityje G ją ne visada galima apibrėžti kaip funkcijos grafiką. Todėl visumoje integralinę kreivę galima apibrėžti lygtimi $U(x, y) = 0$.

Išnagrinėsime kelis pavyzdžius.

1. $x dy - y dx = 0, \quad G = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$. Šios lygties bendrasis sprendinys $y = Cx$. Išsprendę pastarają lygtį C atžvilgiu, gausime bendrajį integralą $y/x = C$.
2. $y dy + x dx = 0, \quad G = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$. Suintegravę šią lygtį, gausime bendrajį integralą $y^2 + x^2 = c$. Išsprendę pastarają lygtį y atžvilgiu, gausime bendrajį sprendinį $y = \sqrt{c - x^2}, 0 < c < \infty$. Atkreipsime dėmesį į tai, kad sprendinio apibrėžimo sritis priklauso nuo c . Tiksliau sprendinys yra apibrėžtas intervale $(0, \sqrt{c})$.

2.6 PIRMOS EILĖS DIFERENCIALINĖS LYGTYS NEIŠREIKŠTOS IŠVESTINĖS ATŽVILGIU

Tegu funkcija $F \in C(D)$, D – sritis erdvėje \mathbb{R}^3 . Nagrinėsime pirmos eilės diferencialinę lygtį

$$F(x, y, y') = 0, \quad (2.25)$$

neišreikštą išvestinės atžvilgiu. Išskirsime keliis paprasčiausius tokų lycių integravimo atvejus.

1. Tarkime, funkcija F nepriklauso nuo kintamųjų x ir y . Tada (2.25) lygtį galima perrašyti taip:

$$F(y') = 0. \quad (2.26)$$

Tegu p^* yra reali lygties

$$F(p) = 0 \quad (2.27)$$

šaknis. Tada integruodami lygtį

$$y' = p^*,$$

gausime

$$y = p^*x + C.$$

Kadangi

$$\frac{y - C}{x} = p^*$$

yra (2.27) lygties šaknis, tai

$$F\left(\frac{y - C}{x}\right) = 0$$

yra (2.26) lygties bendrasis integralas.

P a v y z d y s . Lygtis

$$y'^3 + y'^2 + y' - 3 = 0$$

išvestinės y' atžvilgiu turi realią šaknį $y' = 1$. Integruodami randame $y = x + C$. Todėl nagrinėjamos lygties bendrasis integralas yra

$$\left(\frac{y - C}{x}\right)^3 + \left(\frac{y - C}{x}\right)^2 + \frac{y - C}{x} - 3 = 0.$$

2. Tarkime, funkcija F nepriklauso nuo kintamojo y . Tada (2.25) lygtį galima perrašyti taip:

$$F(x, y') = 0. \quad (2.28)$$

Jeigu šią lygtį galima išspręsti kintamojo y' atžvilgiu, tai gausime lygtį su atskiriamais kintamaisiais. Priešingu atveju patogu įvesti parametrą. Lygtis $F(x, u) = 0$ kintamujų x, u plokštumoje apibrėžia kreivę. Tarkime,

kad $x = \varphi(p)$, $u = \psi(p)$ yra šios kreivės parametrinės lygtys. Tada (2.28) lygtį galima pakeisti dviem lygtimis

$$x = \varphi(p), \quad y' = \psi(p).$$

Kadangi

$$dy = \psi(p) dx = \psi(p)\varphi'(p) dp,$$

tai parametrinės lygtys

$$x = \varphi(p), \quad y = \int \psi(p)\varphi'(p) dp + C$$

apibrėžia (2.28) lyties integralines kreives. Jeigu (2.28) lygtį galima išspręsti kintamojo x atžvilgiu: $x = \varphi(y')$, tai šią lygtį patogu pakeisti parametrinėmis lygtimis: $x = \varphi(p)$, $y' = p$. Šiuo atveju parametrinės lygtys

$$x = \varphi(p), \quad y = \int p\varphi'(p) dp + C$$

apibrėžia (2.28) lyties integralines kreives.

P a v y z d y s . Lygtis

$$x = (y')^3 - y' - 1$$

yra išspręsta x atžvilgiu. Todėl ją patogu pakeisti dviem parametrinėmis lygtimis

$$y' = p, \quad x = p^3 - p - 1.$$

Kadangi

$$dy = p dx = p(3p^2 - 1) dp,$$

tai

$$y = \int p(3p^2 - 1) dp = \frac{3}{4}p^4 - \frac{1}{2}p^2 + C.$$

Todėl parametrinės lygtys

$$x = p^3 - p - 1, \quad y = \frac{3}{4}p^4 - \frac{1}{2}p^2 + C$$

apibrėžia nagrinėjamos lyties integralines kreives.

3. Tegu funkcija F nepriklauso nuo kintamojo x . Tada (2.25) lygtį galima perrašyti taip:

$$F(y, y') = 0. \tag{2.29}$$

Jeigu šią lygtį galima išspręsti kintamojo y' atžvilgiu, tai gausime lygtį su atskiriamais kintamaisiais. Priešingu atveju patogu įvesti parametrumą. Lygtis $F(y, u) = 0$ kintamujų y, u plokštumoje apibrėžia kreivę. Tarkime, kad $y = \varphi(p)$, $u = \psi(p)$ yra šios kreivės parametrinės lygtys. Tada (2.29) lygtį galima pakeisti dviem lygtimis

$$y = \varphi(p), \quad y' = \psi(p).$$

Kadangi

$$dx = \frac{1}{\psi(p)} dy = \frac{1}{\psi(p)} \varphi'(p) dp,$$

tai parametrinės lygtys

$$y = \varphi(p), \quad x = \int \frac{\varphi'(p)}{\psi(p)} dp + C$$

apibrėžia (2.29) lygties integralines kreives. Jeigu (2.29) lygtį galima išspręsti kintamojo y atžvilgiu: $y = \varphi(y')$, tai šią lygtį patogu pakeisti parametrinėmis lygtimis: $y = \varphi(p)$, $y' = p$. Šiuo atveju parametrinės lygtys

$$y = \varphi(p), \quad x = \int \frac{\varphi'(p)}{p} dp + C$$

apibrėžia (2.28) lygties integralines kreives.

Pavyzdys. Lygti

$$y^{2/3} + (y')^{2/3} = 1$$

galima pakeisti dviem parametrinėmis lygtimis

$$y = \cos^3 p, \quad y' = \sin^3 p.$$

Kadangi

$$dx = \frac{dy}{y'} = -\frac{3 \cos^2 p}{\sin^3 p} \sin p dp = -3 \operatorname{ctg}^2 p dp,$$

tai

$$x = 3p + 3 \operatorname{ctg} p + C.$$

Todėl parametrinės lygtys

$$y = \cos^3 p, \quad x = 3p + 3 \operatorname{ctg} p + C$$

apibrėžia nagrinėjamos lygties integralines kreives.

3 SKYRIUS

Aukštesnės eilės paprastosios diferencialinės lygtys

3.1 PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS, KURIŲ EILĘ GALIMA SUMAŽINTI

Nagrinėjant n – tos eilės diferencialinę lygtį

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (3.1)$$

arba lygtį išreikštą išvestinės atžvilgiu

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (3.2)$$

kartais pavyksta sumažinti jos eilę. Dažniausiai tai palengvina lygties integravimą. Išskirsite kelis paprasčiausius atvejus, kai lygties eilę galima sumažinti.

Tarkime (3.2) lygties dešinioji pusė nepriklauso nuo ieškomos funkcijos y ir jos išvestinių, t.y.

$$y^{(n)} = f(x). \quad (3.3)$$

Pažymėję $y^{(n-1)} = v$ gausime pirmos eilės diferencialinę lygtį $v' = f(x)$. Suintegravę šią lygtį rasime funkciją $v = g(x) + c$. Taigi padarę tokį keitinį gavome tokio pačio pavidalo $n - 1$ eilės diferencialinę lygtį

$$y^{(n-1)} = g(x) + c_1.$$

Pakartojė šiai lygčiai tokius pačius samprotavimus $n - 1$ kartą, rasime ieškomą sprendinį

$$y = q(x) + c_1 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + c_2 \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + c_n.$$

Tačiau praktikoje, ieškant (3.3) lygties sprendinio elgiamasi kitaip. Tiksliau abi lygties puses n kartų integruojame panariui. Pavyzdžiu tegu turime antros eilės lygtį

$$y'' = f(x).$$

Suintegravę abi šios lygties puses panariui, gausime lygtį

$$y' = \int f(x) dx := g(x) + c_1.$$

Integruodami ją panariui rasime ieškomą sprendinį

$$y = \int (g(x) + c_1) dx := q(x) + c_1 x + c_2.$$

Tarkime, (3.1) lygtis nepriklauso nuo ieškomos funkcijos ir visų jos išvestinių iki $k - 1$ eilės imtinai, t.y.

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0, \quad k < n.$$

Padarę keitinių $y^{(k)} = v$ naujos ieškomos funkcijos v atžvilgiu gausime $n - k$ eilės lygtį

$$F(x, v, v', \dots, v^{(n-k)}) = 0.$$

P a v y z d y s . Rasti lygties

$$y'' - y'/x = 0$$

bendrajį sprendinį. Ši lygtis nepriklauso nuo ieškomos funkcijos y . Padarę keitinių $y' = v$ naujos ieškomos funkcijos v atžvilgiu gausime lygtį su atskiriamais kintamaisiais:

$$v' - v/x = 0 \iff \frac{dv}{v} = \frac{dx}{x}.$$

Integruodami ją randame

$$\ln|v| = \ln|x| + \ln|c_1| \iff v = c_1 x.$$

Grįžę prie seno kintamojo y , randame $y' = c_1 x$ ir bendrasis nagrinėjamos lygties sprendinys $y = c_1 x^2 + c_2$.

Tarkime, (3.1) lygtje funkcija F priklauso tik nuo ieškomos funkcijos y išvestinių $y^{(n-1)}$ ir $y^{(n)}$ ir šią lygtį galima išspręsti išvestinės $y^{(n)}$ atžvilgiu. Tada tokią lygtį galima užrašyti pavidalu

$$y^{(n)} = f(y^{(n-1)}).$$

Apibrėžę naują ieškomą funkciją $v = y^{(n-1)}$, gausime pirmos eilės lygtį su atskiriamais kintamaisiais

$$v' = f(v) \iff \frac{dv}{f(v)} = dx.$$

Jos bendrasis integralas

$$\int \frac{dv}{f(v)} = x + c_1, \quad f(v) \neq 0.$$

Tarkime šį sąryšį galima išspręsti v atžvilgiu: $v = \varphi(x, c_1)$. Pakeitę čia v į $y^{(n-1)}$ gausime lygtį

$$y^{(n-1)} = \varphi(x, c_1).$$

Integruodami ją $n - 1$ kartą, gausime bendrąjį sprendinį

$$y = \int \cdots \int \varphi(x, c_1) dx \dots dx + c_2 \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + c_3 \frac{x^{n-3}}{(n-3)!} + \dots + c_{n-1} x + c_n.$$

Tarkime, (3.1) lygyje funkcija F priklauso tik nuo ieškomos funkcijos y išvestinių $y^{(n-2)}$ ir $y^{(n)}$ ir šią lygtį galima išspręsti išvestinės $y^{(n)}$ atžvilgiu. Tada tokią lygtį galima užrašyti pavidalu

$$y^{(n)} = f(y^{(n-2)}).$$

Apibrėžę naują ieškomą funkciją $v = y^{(n-2)}$, gausime antros eilės diferencialinę lygtį

$$v'' = f(v).$$

Padaugine šią lygtį iš $2v'$ perrašykime ją taip:

$$2v'dv' = 2v'f(v)dx \iff d(v')^2 = 2f(v)dv.$$

Pastarają lygtį integruodami ir atlikdami elementarius veiksmus, randame

$$v'^2 = 2 \int f(v)dv + c_1 \iff v' = \pm \sqrt{2 \int f(v)dv + c_1}.$$

Gauta lygtis yra lygtis su atskiriamais kintamaisiais. Tarkime, jos bendrajį integralą

$$\int \frac{dv}{\sqrt{2 \int f(v)dv + c_1}} = \pm x + c_2$$

galima išspręsti v atžvilgiu. Tiksliau tegu $v = \varphi(x, c_1, c_2)$. Pakeitę čia v į $y^{(n-2)}$ gausime $n - 2$ eilės lygtį

$$y^{(n-2)} = \varphi(x, c_1, c_2),$$

kurios bendrajį integralą randame $n - 2$ kartus integruodami šią lygtį panariui.

3.2 TIESINĖS HOMOGENINĖS ANTROS EILĖS LYGTYS

Tarkime, funkcijos a_1, a_2 yra tolydžios intervale (a, b) ir

$$L(y) = y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y$$

Reiškinys $L(y)$ yra vadinamas antros eilės *tiesiniu diferencialiniu reiškiniu*, o operatorius L antros eilės *tiesiniu diferencialinu operatoriumi*. Jo apibrėžimo sritis yra funkcijų erdvė $C^2(a, b)$. Kadangi funkcija y ir visos jos išvestinės iki antros eilės imtinai įjungti į operatorių L tiesiškai, tai

1. $L(\lambda\varphi) = \lambda L(\varphi), \quad \forall \varphi \in C^2(a, b), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$
2. $L(\varphi + \psi) = L(\varphi) + L(\psi), \quad \forall \varphi, \psi \in C^2(a, b).$

Nagrinėsime tiesinę homogeninę antros eilės diferencialinę lygtį

$$L(y) = 0. \quad (3.4)$$

Tegu funkcijos φ_1 ir φ_2 yra (3.4) lygties sprendiniai. Tada jų tiesinis darinys

$$\varphi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \quad (3.5)$$

taip pat yra (3.4) lygties sprendinys. Iš tikrujų

$$\begin{aligned} L(\varphi) &= L(c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2) = L(c_1\varphi_1) + L(c_2\varphi_2) = \\ &c_1 L(\varphi_1) + c_2 L(\varphi_2) = c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Pavyzdys. Lygtis

$$y'' = 0$$

turi du atskirus sprendinius $y = 1$ ir $y = x$. Todėl jų tiesinis darinys

$$y = c_1 + xc_2$$

taip pat yra sprendinys.

Sprendinys (3.5) priklauso nuo dviejų laisvų konstantų c_1 ir c_2 . Išsiaiškinsime ar jis yra bendrasis (3.4) lygties sprendinys.

A�ibėžim. Sakysime, tolydžios funkcijos φ_1, φ_2 yra *tiesiškai ne-priklausomos* intervale (a, b) , jeigu lygubė

$$c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b)$$

yra galima tik tuo atveju, kai

$$c_1 = c_2 = 0.$$

Priešingu atveju jos vadinamos *tiesiškai priklausomomis*. Tiksliau, jeigu egzistuoja konstantos c_1, c_2 , iš kurių bent viena nelygi nuliui, tokios, kad

$$c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

tai sakysime, kad funkcijos φ_1, φ_2 yra tiesiškai priklausomos.

Iš šio apibrėžimo matome, kad funkcijos φ_1, φ_2 yra tiesiškai priklausomos, jeigu bent viena iš jų lygi nuliui. Be to, jeigu prie tiesiškai priklausomų funkcijų prijungsime dar kelias funkcijas, tai gauta funkcijų sistema bus tiesiškai priklausoma. Akivaizdu, dvi funkcijos φ_1, φ_2 yra tiesiškai priklausomos, jei jos yra proporcingsos, t.y. kai $\varphi_1 = \lambda\varphi_2$, $\lambda = \text{const}$.

Pavyzdžiu, funkcijos $\varphi_1 = e^{2x}$ ir $\varphi_2 = e^x$ yra tiesiškai nepriklausomos bet kokiam intervalė $(a, b) \subset \mathbb{R}$, nes lygybė

$$c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 = c_1e^{2x} + c_2e^x = 0, \quad \forall x \in (a, b)$$

yra galima tik tuo atveju, kai $c_1 = c_2 = 0$. Funkcijos $\varphi_1 = 2\sin x$ ir $\varphi_2 = \sin x$ yra tiesiškai priklausomos, nes jos yra proporcingsos

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{2\sin x}{\sin x} = 2.$$

Tegu φ_1, φ_2 yra diferencijuojamos intervalo (a, b) funkcijos. Iš šių funkcijų ir jų išvestinių sudarome determinantą

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \end{vmatrix}.$$

Taip apibrėžtas determinantas yra vadinamas funkcijų sistemos φ_1, φ_2 *Vronskio determinantu*.

3.1 teorema. Jeigu funkcijos φ_1, φ_2 yra tiesiškai priklausomos intervalo (a, b) , tai jas atitinkantis Vronskio determinantas šiame intervale tapačiai lygus nuliui.

« Pagal apibrėžimą funkcijos φ_1, φ_2 yra tiesiškai priklausomos intervalo (a, b) , jeigu

$$c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

ir bent vienas iš koeficientų c_1, c_2 nelygus nuliui. Tarkime, $c_2 \neq 0$. Tada

$$\varphi_2(x) = -\frac{c_1}{c_2}\varphi_1(x).$$

ir funkcijas φ_1, φ_2 atitinkantis Vronskio determinantas

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & -\frac{c_1}{c_2}\varphi_1(x) \\ \varphi'_1(x) & -\frac{c_1}{c_2}\varphi'_1(x) \end{vmatrix} = 0. \triangleright$$

Tarkime, kad φ_1, φ_2 yra (3.4) lygties sprendiniai ir $W(x)$ yra šiuos sprendinius atitinkantis Vronskio determinantas. Tada yra teisinga teorema.

3.2 teorema. Teiginiai¹

¹Ši ir kai kurios kitos šio skyrelio teoremos pateiktos be įrodymų. Jų įrodymus galima rasti bet kokiam paprastųjų diferencialinių lygčių vadovėlyje.

1. $W(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b),$
2. $W(x_0) = 0$, kokiame nors taške $x_0 \in (a, b),$
3. Sprendiniai φ_1, φ_2 – tiesiškai priklausomi
yra ekvivalentūs.

I švad a. Tegu funkcijos φ_1, φ_2 yra (3.4) lygties tiesiškai nepriklausomai sprendiniai intervale (a, b) . Tada jie yra tiesiškai nepriklausomi ir bet kokiame intervale $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$.

Tegu funkcijos φ_1, φ_2 yra (3.4) lygties tiesiškai nepriklausomai sprendiniai intervale (a, b) . Tada

$$W'(x) = \begin{vmatrix} \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \\ \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi''_1(x) & \varphi''_2(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi''_1(x) & \varphi''_2(x) \end{vmatrix}$$

Kadangi funkcijos φ_1, φ_2 yra (3.4) lygties sprendiniai, tai

$$\varphi''_1(x) = -a_1(x)\varphi'_1(x) - a_2(x)\varphi_1(x), \quad \varphi''_2(x) = -a_1(x)\varphi'_2(x) - a_2(x)\varphi_2(x)$$

ir Vronskio determinanto išvestinė

$$\begin{aligned} W'(x) &= \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ -a_1(x)\varphi'_1(x) - a_2(x)\varphi_1(x) & -a_1(x)\varphi'_2(x) - a_2(x)\varphi_2(x) \end{vmatrix} = \\ &= -a_1(x) \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi'_1(x) & \varphi'_2(x) \end{vmatrix} - a_2(x) \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \end{vmatrix} = -a_1(x)W(x). \end{aligned}$$

Vadinasi Vronskio determinantas W yra diferencialinės lygties

$$W'(x) = -a_1(x)W(x)$$

sprendinys. Tai yra pirmos eilės tiesinė homogeninė lygtis. Jos sprendinys

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(s) ds}.$$

Pastaroji formulė vadinama *Liuvilio – Ostrogradskio* formulė. Iš jos matome, kad Vronskio determinantas tapačiai lygus nuliui, jeigu jis lygus nuliui bent vienam taške. Kartu galime tvirtinti, kad sprendiniai φ_1, φ_2 yra tiesiškai nepriklausomi, jeigu Vronskio determinantas bent vienam taške nelygus nuliui.

Kiekvienas (3.4) lygties sprendinys $\varphi_k, k = 1, 2$ vienareikšmiškai apibrėžiamas jo ir jo išvestinės reikšmėmis kokiame nors fiksotame taške $x_0 \in (a, b)$. Šias pradines reikšmes galima užrašyti stulpeliu ir iš jų sudaryti matricą

$$\Phi(x_0) = \begin{pmatrix} \varphi_1(x_0) & \varphi_2(x_0) \\ \varphi'_1(x_0) & \varphi'_2(x_0) \end{pmatrix}.$$

Pavadinkime ją pradine matrica. Akivaizdu, kad

$$W(x_0) = \det \Phi(x_0).$$

Taigi (3.4) lygties sprendiniai φ_1, φ_2 yra tiesiškai nepriklausomi, jeigu juos atitinkanti pradinė matrica yra neišsigimusi, t.y.

$$\det \Phi(x_0) \neq 0.$$

Kartu ji yra neišsigimusi ir kiekviename intervalo (a, b) taške.

A p i b r é ž i m a s. Sakysime, du (3.4) lygties sprendiniai φ_1, φ_2 , yra šios lygties sprendinių bazė, jeigu bet kurį šios lygties sprendinį φ galima išreikšti sprendinių φ_1, φ_2 , tiesiniu dariniu, t.y.

$$\varphi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Koeficientai c_1, c_2 vadinami sprendinio φ koordinatėmis duotoje bazėje.

3.3 teorema. *Bet kokie (3.4) lygties sprendiniai φ_1, φ_2 su neišsigimusia pradinė matrica yra šios lygties sprendinių bazė.*

Pagal 3.3 teoremą (3.4) lygties sprendiniai φ_1, φ_2 yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai iš jų sudaryta pradinė matrica Φ yra neišsigimusi kokiam nors taške $x_0 \in (a, b)$. Todėl pastarają teoremą galima formuliuoti taip.

3.4 teorema. *Bet kokie du tiesiškai nepriklausomi (3.4) lygties sprendiniai yra šios lygties sprendinių bazė.*

Tegu φ_1, φ_2 yra (3.4) lygties sprendinių bazė. Funkcija

$$\varphi(x) = c_1\varphi_1(x) + c_2\varphi_2(x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad (3.6)$$

yra vadinama (3.4) lygties bendruoju sprendiniu.

Bendrasis sprendinys pasižymi šiomis savybėmis:

1. Kiekvienam konkrečiam parametrų c_1, c_2 rinkiniui funkcija φ , apibrėžta (3.6) formule, yra (3.4) lygties sprendinys.
2. Kiekvieną (3.4) lygties sprendinį galima išreikšti (3.6) formule, tinkamai parinkus parametrų c_1, c_2 reikšmes.

Sprendinių erdvės bazė, t.y. dviejų tiesiškai nepriklausomų sprendinių visuma, vadinama *fundamentaliaja sprendinių sistema*.

3.3 KONSTANTŲ VARIAVIMO METODAS

Šiame skyrelyje parodysime, kad tiesimės nehomogeninės lyties atskirajį sprendinį galima rasti žinant šią lygtį atitinkančios tiesinės homogeninės lyties kokią nors fundamentaliąją sprendinių sistemą. Be to, įsitikinsime, kad nehomogeninės lyties bendrajį sprendinį galima išreikšti šios lyties atskirojo sprendinio ir ją atitinkančios homogeninės lyties bendojo sprendinio suma.

Iš pradžių nagrinėsime tiesinę nehomogeninę antros eilės lygtį

$$L(y) := y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = q(x), \quad x \in (a, b). \quad (3.7)$$

Tegu y ir v yra kokie nors du šios lyties sprendiniai intervale (a, b) , t.y.

$$L(y) = q(x) \quad \text{ir} \quad L(v) = q(x), \quad x \in (a, b).$$

Tada jų skirtumas $\varphi = y - v$ yra tiesinės homogeninės lyties

$$L(\varphi) := \varphi'' + a_1(x)\varphi' + a_2(x)\varphi = 0.$$

sprendinys. Iš tikrujų,

$$L(\varphi) = L(y - v) = L(y) - L(v) = q(x) - q(x) = 0.$$

Todėl jeigu žinome kokią nors (3.7) lyties atskirajį sprendinį v , tai bet kurį kitą šios lyties sprendinį y galima apibrėžti formule $y = v + \varphi$, kurioje φ yra tiesinės homogeninės lyties $L(\varphi) = 0$ bendarasis sprendinys. Jeigu žinome homogeninės lyties kokią nors fundamentaliąją sprendinių sistemą φ_1, φ_2 , tai jos bendarasis sprendinys

$$\varphi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2.$$

Tačiau tada

$$y = v + \varphi = v + c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \quad (3.8)$$

yra (3.7) lyties bendarasis sprendinys. Norint tuo įsitikinti pakanka pastebėti, kad bet kurį kitą (3.7) lyties sprendinį ψ galima išreikšti (3.8) formule. Iš tikrujų, tegu ψ yra koks nors (3.7) lyties sprendinys. Sudarykime tiesinę dvių algebrinių lygčių sistemą

$$v(x_0) + c_1\varphi_1(x_0) + c_2\varphi_2(x_0) = \psi(x_0),$$

$$v'(x_0) + c_1\varphi'_1(x_0) + c_2\varphi'_2(x_0) = \psi'(x_0)$$

kintamujų c_1, c_2 atžvilgiu. Šios sistemos determinantas yra fundamentalios sprendinių sistemos φ_1, φ_2 Vronskio determinantas $W(x_0)$. Kadangi jis nelygus nuliui, tai sistema turi vienintelį sprendinį $c_1 = c_1^0, c_2 = c_2^0$. Kartu galime tvirtinti, kad sprendiniai

$$y = v + c_1^0\varphi_1 + c_2^0\varphi_2 \quad \text{ir} \quad y = \varphi$$

tenkina tas pačias pradies sąlygas. Remiantis vienaties teorema šie sprendiniai sutampa.

Taigi, jeigu žinome homogeninės lygties fundamentaliąjį sprendinių sistemą, tai nehomogeninės lygties sprendimas sisiveda į jos atskirojo sprendinio radimą. Pasirodo, kad nehomogeninės lygties atskirajį sprendinį galima surasti, jeigu yra žinoma kokia nors homogeninės lygties fundamentalioji sprendinių sistema. Atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį ieškosime *konstantų variavimo metodu*. Šio metodo esmė yra tame, kad atskirasis (3.7) lygties sprendinys yra ieškomas pavidalu:

$$v(x) = c_1(x)\varphi_1(x) + c_2(x)\varphi_2(x); \quad (3.9)$$

čia c_1, c_2 – ieškomos diferencijuojamos funkcijos, o φ_1, φ_2 – fundamentalioji homogeninės lygties sprendinių sistema. Suskaičiuosime funkcijos v išvestines ir pareikalaujome, kad pabrauktas narys būtų lygus nuliui.

$$v'(x) = c_1(x)\varphi'_1(x) + c_2(x)\varphi'_2(x) + c'_1(x)\varphi_1(x) + c'_2(x)\varphi_2(x),$$

$$v''(x) = c_1(x)\varphi''_1(x) + c_2(x)\varphi''_2(x) + c'_1(x)\varphi'_1(x) + c'_2(x)\varphi'_2(x),$$

Padaugine funkcią v iš a_2 , jos pirmają išvestinę v' iš a_1 , o antają išvestinę v'' iš 1 ir viską sudėjė, gausime

$$L(v) = c_1 L(\varphi_1) + c_2 L(\varphi_2) + c'_1 \varphi'_1 + c'_2 \varphi'_2 = c'_1 \varphi'_1 + c'_2 \varphi'_2.$$

Funkcija v tenkins (3.7) lygtį, jeigu paskutinis reiškinys yra lygus $q(x)$. Taigi funkcijų c'_1, c'_2 atžvilgiu, gavome dviejų tiesinių lygtių sistemą

$$c'_1(x)\varphi_1(x) + c'_2(x)\varphi_2(x) = 0,$$

$$c'_1(x)\varphi'_1(x) + c'_2(x)\varphi'_2(x) = q(x).$$

Šios sistemos determinantas $W(x) \neq 0$. Todėl ji turi vienintelį sprendinį

$$c'_1(x) = \frac{W_1(x)}{W(x)}, \quad c'_2(x) = \frac{W_2(x)}{W(x)};$$

čia W_1 ir W_2 yra determinantai, gaunami iš Vronskio determinanto W , pakeitus atitinkamai pirmajį ir antrajį stulpelį į stulpelį colon($0, q(x)$). Taigi

$$c_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_k(s)}{W(s)} ds + c_{k0}, \quad k = 1, 2;$$

čia c_{k0} – fiksuotos konstantos. Istatę taip apibrėžtas funkcijas c_k į (3.9) formulę, gausime atskirą (3.7) lygties sprendinį.

Pavyzdys. Rasime lygties

$$y'' + y = \frac{1}{\cos x}$$

bendrąjį sprendinį. Šią lygtį atitinkanti tiesinė homogeninė lygtis

$$y'' + y = 0$$

turi du tiesiškai nepriklausomus sprendinius $\varphi_1 = \cos x$ ir $\varphi_2 = \sin x$. Todėl $\varphi = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ yra bendrasis homogeninės lygties sprendinys. Rasime atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį. Remiantis (3.9) formule šį sprendinį galima užrašyti pavidalu

$$v = c_1(x) \cos x + c_2(x) \sin x.$$

Nežinomų funkcijų c_1 ir c_2 išvestines rasime iš lygčių:

$$\begin{cases} c'_1(x) \cos x + c'_2(x) \sin x = 0, \\ c'_1(x)(-\sin x) + c'_2(x) \cos x = \frac{1}{\cos x}. \end{cases}$$

Funkcijų sistemos $\cos x, \sin x$ Vronskio determinantas

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Determinantai

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\cos x} & \cos x \end{vmatrix} = -\operatorname{tg} x, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\cos x} \end{vmatrix} = 1.$$

Todėl

$$c'_1(x) = \frac{W_1(x)}{W(x)} = -\operatorname{tg} x \implies c_1(x) = \int (-\operatorname{tg} x) dx = \ln |\cos x|;$$

$$c'_2(x) = \frac{W_2(x)}{W(x)} = 1 \implies c_2(x) = \int 1 dx = x,$$

o atskirasis sprendinys $v = \ln |\cos x| \cdot \cos x + x \cdot \sin x$. Taigi bendrasis nagrinėjamos lygties sprendinys

$$y = \ln |\cos x| \cdot \cos x + x \cdot \sin x + c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

Irodyti teiginiai antros eilės tiesinei lygčiai yra teisingi ir n -tos eilės tiesinei lygčiai

$$L(y) := y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = q(x), \quad x \in (a, b). \quad (3.10)$$

Tiksliau bendrajį šios lygties sprendinį galima išreikšti pavidalu

$$y = v + \varphi,$$

kur v yra koks nors atskiras šios lygties sprendinys, o φ yra bendrasis homogeninės lygties

$$L(y) := y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0, \quad x \in (a, b). \quad (3.11)$$

sprendinys. Be to, jeigu žinoma kokia nors fundamentalioji homogeninės lygties sprendinių sistema $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, tai bendrasis homogeninės lygties sprendinys

$$\varphi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 + \dots + c_n\varphi_n.$$

Atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį galima ieškoti pavidalu

$$v = c_1(x)\varphi_1(x) + c_2(x)\varphi_2(x) + \dots + c_n(x)\varphi_n(x); \quad (3.12)$$

čia ieškomos funkcijos c_1, c_2, \dots, c_n randamos iš n algebrinių lygčių sistemas:

$$\begin{cases} c'_1(x)\varphi_1(x) + \dots + c'_n(x)\varphi_n(x) = 0, \\ c'_1(x)\varphi'_1(x) + \dots + c'_n(x)\varphi'_n(x) = 0, \\ \dots \\ c'_1(x)\varphi_1^{(n-2)}(x) + \dots + c'_n(x)\varphi_n^{(n-2)}(x) = 0, \\ c'_1(x)\varphi_1^{(n-1)}(x) + \dots + c'_n(x)\varphi_n^{(n-1)}(x) = q(x). \end{cases}$$

Šios sistemos Vronskio determinantas $W(x) \neq 0$. Todėl ji turi vienintelį sprendinį

$$c'_1(x) = \frac{W_1(x)}{W(x)}, \dots, c'_n(x) = \frac{W_n(x)}{W(x)};$$

čia $W_k, k = 1, \dots, n$ yra determinantai, gaunami iš Vronskio determinanto W , pakeitus k -ajį stulpelį į stulpelį $\text{colon}(0, \dots, 0, q(x))$. Taigi

$$c_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_k(s)}{W(s)} ds + c_{k0};$$

čia c_{k0} – fiksuotos konstantos. Istatę taip apibrėžtas funkcijas c_k į (3.12) formulę, gausime atskirajį (3.10) lygties sprendinį.

Šio skyrelio pabaigoje pateiksime pavyzdį, kai žinant vieną homogeninės lygties sprendinį jos eilę galima sumažinti vienetu.

Pavyzdys. Tarkime, yra žinomas antros eilės lygties

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad (3.13)$$

netrivialus sprendinys $y = \varphi(x)$. Apibrėžkime naują ieškomą funkciją z formule

$$y(x) = \varphi(x) \int z(x) dx.$$

Tada

$$y'(x) = \varphi'(x) \int z(s) ds + \varphi(x)z(x),$$

$$y''(x) = \varphi''(x) \int z(s) ds + 2\varphi'(x)z(x) + \varphi(x)z'(x).$$

Įstatę taip apibrėžtos funkcijos y ir jos išvestinių y', y'' reikšmes į (3.13) lygtį, gausime funkcijos z atžvilgiu pirmos eilės tiesinę homogeninę lygtį

$$\varphi(x)z'(x) + (a_1(x)\varphi(x) + 2\varphi'(x))z(x) = 0,$$

kurios bendrasis sprendinys

$$z = ce^{-\int (a_1(x) + 2\frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}) dx} = c\varphi^{-2}(x)e^{-\int a_1(x) dx}.$$

Todėl

$$y = \varphi(x) \quad \text{ir} \quad y = \varphi(x) \int e^{-\int a_1(x) dx} \varphi^{-2}(x) dx$$

yra (3.13) lygties sprendiniai. Akivaizdu, kad jie yra tiesiškai nepriklausomi. Todėl jų tiesinis darinys yra (3.13) lygties bendrasis sprendinys.

3.4 TIESINĖS ANTROS EILĖS LYGTYS SU PASTOVIAIS REALIAIS KOEFICIENTAIS

Tiesinė antros eilės lygti

$$L(y) := y'' + 2ay' + by = q(x) \quad (3.14)$$

su pastoviais realiais koeficientais a, b atitinka homogeninę lygtį

$$L(y) := y'' + 2ay' + by = 0. \quad (3.15)$$

Jos sprendinį ieškosime pavidalu $y = e^{\lambda x}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Istatę taip apibrėžtą funkciją į (3.15) lygtį gausime

$$e^{\lambda x}(\lambda^2 + 2a\lambda + b) = 0.$$

Taigi funkcija $y = e^{\lambda x}$ yra (3.15) lygties sprendinys, jeigu skaičius λ yra *charakteristinės lygties*

$$\lambda^2 + 2a\lambda + b = 0$$

šaknis. Šios lygties šaknys

$$\lambda_1 = -a - \sqrt{a^2 - b}, \quad \lambda_2 = -a + \sqrt{a^2 - b}.$$

Išskirsime tokius atvejus:

1. Šaknys λ_1, λ_2 yra realios ir skirtinos, t.y.

$$a^2 - b > 0.$$

2. Šaknys λ_1, λ_2 yra realios ir sutampa, t.y.

$$a^2 - b = 0.$$

3. Šaknys λ_1, λ_2 yra kompleksinės ir jų realioji dalis nelygi nuliui, t.y.

$$a^2 - b < 0, \quad a \neq 0.$$

4. Šaknys λ_1, λ_2 yra menamos, t.y.

$$a = 0, \quad b > 0.$$

Kiekvieną iš šių atveju išnagrinėsime atskirai.

1. Tegu λ_1, λ_2 yra realios charakteristinės lygties šaknys ir $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Tada

$$\varphi_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad \varphi_2 = e^{\lambda_2 x}$$

yra du tiesiškai nepriklausomi (3.15) homogeninės lygties sprendiniai, nes Vronskio determinantas

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{\lambda_1 x} e^{\lambda_2 x} \neq 0.$$

Bendrasis homogeninės lygties sprendinys

$$\varphi = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Atskirą (3.14) nehomogeninės lygties sprendinį galima rasti konstantų variavimo metodu. Remiantis šiuo metodu atskirasis sprendinys ieškomas pavidalu:

$$v = c_1(x) e^{\lambda_1 x} + c_2(x) e^{\lambda_2 x},$$

nežinomų funkcijų c_1, c_2 išvestinės randamos iš dviejų algebrinių lygčių sistemos

$$\begin{cases} c'_1(x) e^{\lambda_1 x} + c'_2(x) e^{\lambda_2 x} = 0, \\ c'_1(x) \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + c'_2(x) \lambda_2 e^{\lambda_2 x} = q(x). \end{cases}$$

Išsprendę šią lygčių sistemą ir gautus sprendinius suintegruavę, randame

$$\begin{aligned} c_1(x) &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_{x_1}^x q(s) e^{-\lambda_1 s} ds, \\ c_2(x) &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{x_2}^x q(s) e^{-\lambda_2 s} ds. \end{aligned}$$

Todėl atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį galima apibrėžti taip:

$$v(x) = \frac{e^{\lambda_1 x}}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_{x_1}^x q(s) e^{-\lambda_1 s} ds + \frac{e^{\lambda_2 x}}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{x_2}^x q(s) e^{-\lambda_2 s} ds$$

Tarkime, funkcija q yra apréžta, t.y. $\max |q(x)| \leq M$. Imkime $x_1 = x_2 = \infty$, kai $\lambda_1 > 0$, $x_1 = x_2 = -\infty$, kai $\lambda_2 < 0$, $x_1 = -\infty, x_2 = \infty$, kai $\lambda_1 < 0, \lambda_2 > 0$. Tada

$$|v(x)| \leq \left(\frac{1}{|\lambda_1|} + \frac{1}{|\lambda_2|} \right) \frac{M}{|\lambda_2 - \lambda_1|}.$$

Atkreipsime dėmesį į tai, kad ne visoms x reikšmėms funkcija q gali būti apibrėžta. Šiuo atveju ją reikia pratęsti ir pasirūpinti, kad integralai

$$\int q(s) e^{-\lambda_1 s} ds, \quad \int q(s) e^{-\lambda_2 s} ds$$

su atitinkamais rėžiais konverguotų.

2. Tegu $\lambda_1 = \lambda_2 = -a, a^2 = b$ ir $a \neq 0$. Tada $\varphi_1 = e^{-ax}$ yra (3.15) homogeninės lygties sprendinys. Kitą tiesiškai nepriklausomą šios lygties sprendinį galima ieškoti pavidalu $\varphi_2 = c(x) e^{-ax}$, kur c – nežinoma funkcija. Istatę taip apibrėžtą funkciją į (3.15) lygtį ieškomai funkcijai c gausime lygtį $c'' = 0$. Suintegruavę šią lygtį randame jos sprendinį $c(x) = x$. Taigi kitas tiesiškai nepriklausomas (3.15) lygties sprendinys $\varphi_2 = xe^{-ax}$. Sprendinių sistemos φ_1, φ_2 Vronskio determinantas

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-ax} & xe^{-ax} \\ -ae^{-ax} & e^{-ax} - axe^{-ax} \end{vmatrix} = e^{-2ax} \neq 0.$$

Todėl bendrasis (3.15) homogeninės lygties sprendinys

$$\varphi = c_1 e^{-ax} + c_2 x e^{-ax}.$$

Atskirasis (3.14) nehomogeninės lygties sprendinys

$$v(x) = e^{-ax} \int_{x_1}^x (x-s)q(s)e^{as} ds.$$

Ji galima rasti konstantų variavimo metodu. Taigi bendrasis (3.14) nehomogeninės lygties sprendinys

$$y = c_1 e^{-ax} + c_2 x e^{-ax} + v(x).$$

3. Tegu $\lambda_1 = -\alpha - i\beta$, $\lambda_2 = -\alpha + i\beta$, $\alpha = a$, $\beta = \sqrt{b - a^2}$. Tada

$$\varphi_1 = e^{-(\alpha+i\beta)x} = e^{-\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x),$$

$$\varphi_2 = e^{-(\alpha-i\beta)x} = e^{-\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

yra du kompleksiškai jungtiniai (3.15) lygties sprendiniai. Kadangi pastarosios lygties koeficientai yra realūs, tai sprendinių z_1, z_2 realioji ir menamoji dalys

$$\varphi_1 = e^{-\alpha x} \cos \beta x, \quad \varphi_2 = e^{-\alpha x} \sin \beta x$$

yra relūs (3.15) lygties sprendiniai. Funkcijų sistemos φ_1, φ_2 Vronskio determinantas

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-\alpha x} \cos \beta x & e^{-\alpha x} \sin \beta x \\ (e^{-\alpha x} \cos \beta x)' & (e^{-\alpha x} \sin \beta x)' \end{vmatrix} = \beta e^{-2\alpha x} \neq 0.$$

Todėl (3.15) sistemos bendrasis sprendinys

$$\varphi = c_1 e^{-\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{-\alpha x} \sin \beta x.$$

Atskirasis (3.14) lygties sprendinys

$$v(x) = \frac{\sin \beta x}{\beta} \int_{x_2}^x q(s) e^{\alpha(s-x)} \cos \beta s ds - \frac{\cos \beta x}{\beta} \int_{x_1}^x q(s) e^{\alpha(s-x)} \sin \beta s ds.$$

Ji galima rasti konstantų variavimo metodu. Paėmę $x_1 = x_2$ perrašysime pastarąjį formulę taip:

$$v(x) = \frac{1}{\beta} \int_{x_1}^x q(s) e^{\alpha(s-x)} \sin(x-s)\beta ds.$$

4. Tegu $a = 0$, $\beta = \sqrt{b}$, $b > 0$, $\lambda_1 = -i\beta$, $\lambda_2 = +i\beta$. Šiuo atveju (3.14) lygtį galime perrašyti taip:

$$y'' + \beta^2 y = q(x). \tag{3.16}$$

Homogeninė lygtis

$$y'' + \beta^2 y = 0 \quad (3.17)$$

turi du kompleksiškai jungtiniai sprendiniai

$$e^{-i\beta x} = \cos \beta x - i \sin \beta x, \quad e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x.$$

Šiu sprendinių realioji ir menamoji dalys

$$\varphi_1 = \cos \beta x, \quad \varphi_2 = \sin \beta x$$

yra realūs tiesiškai nepriklausomi (3.17) homogeninės lygties sprendiniai. Todėl bendrasis(3.17) homogeninės lygties sprendinys

$$\varphi = c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x.$$

Atskirasis (3.16) lygties sprendinys

$$v(x) = -\frac{\cos \beta x}{\beta} \int_{x_1}^x q(s) \sin \beta s \, ds + \frac{\sin \beta x}{\beta} \int_{x_2}^x q(s) \cos \beta s \, ds.$$

Ji galima rasti konstantų variavimo metodu. Bendrasis (3.16) lygties sprendinys

$$y = c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x + v(x) = c \sin(\beta x + \tau) + v(x);$$

čia $c = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$, $\tau = \text{arcctg}(c_2/c_1)$. Jis yra aprėžtas tada ir tik tada, kai yra aprėžtas atskirasis (3.16) lygties sprendinys v .

Pavyzdys. Nagrinėsime lygtį

$$y'' + \beta^2 y = A \sin \alpha x, \quad A > 0.$$

Išskirsime du atvejus:

1. $\alpha \neq \beta$.
2. $\alpha = \beta$.

Pirmuoju atveju atskirasis sprendinys

$$v(x) = \frac{A}{\beta^2 - \alpha^2} \sin \alpha x.$$

Bendrasis sprendinys

$$y = c_1 \sin \beta x + c_2 \cos \beta x + \frac{A}{\beta^2 - \alpha^2} \sin \alpha x = c \sin(\beta x + \tau) + \frac{A}{\beta^2 - \alpha^2} \sin \alpha x;$$

čia $c = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$, $\tau = \text{arctg}(c_2/c_1)$. Taigi pirmuoju atveju visi sprendiniai yra aprėžti.

Antruoju atveju atskirasis sprendinys

$$v(x) = -\frac{Ax}{2\beta} \cos \beta x.$$

Bendrasis sprendinys

$$y = c \sin(\beta x + \tau) - \frac{Ax}{2\beta} \cos \beta x.$$

Taigi antruoju atveju visi sprendiniai yra neaprėžti ir turime rezonansą.

Tuo atveju, kai (3.14) lygties dešinioji pusė q turi specialų pavidalą, jos atskirajį sprendinį galima rasti žymiai lengvai. Tiksliau neapibrėžtinių koeficientų metodų. Metodo esmė yra ta, kad pagal lygties dešiniosios pusės išraišką atskirajį sprendinį ieškome specialiu (priklausančiu nuo lygties dešiniosios pusės) pavidalu su neapibrėžtiniais koeficientais. Vėliau taip apibrėžtą sprendinį ištame į lygtį ir iš gautos tapatybės randame neapibrėžtinius koeficientus. Išskirsime funkcijos q kelis specialius pavidalus:

$$1. q(x) = e^{\alpha x} P_n(x), \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^n p_k x^k, \quad \alpha, p_k \in \mathbb{R}, \forall k = 0, 1, \dots, n.$$

$$2. q(x) = e^{\alpha x} P_n(x) \cos \beta x, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

$$3. q(x) = e^{\alpha x} P_n(x) \sin \beta x, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pirmuoju atveju (3.14) lygties atskirajį sprendinį ieškome pavidalu:

$$v(x) = x^r e^{\alpha x} Q_n(x), \quad Q_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{R};$$

čia skaičius r gali įgyti reikšmes 0, 1 arba 2 priklausomai nuo tuo ar skaičius α yra charakteristinės lygties $\lambda^2 + 2a\lambda + b = 0$ šaknis ir koks jos kartotinumas. Tiksliau, jeigu skaičius α néra charakteristinės lygties $\lambda^2 + 2a\lambda + b = 0$ šaknis, tai imame $r = 0$, jeigu α yra charakteristinės lygties pirmo kartotinumo šaknis, tai imame $r = 1$, o kai antro kartotinumo šaknis, tai imame $r = 2$.

Antruoju ir trečiuoju atveju (3.14) lygties atskirajį sprendinį ieškome pavidalu:

$$v(x) = x^r e^{\alpha x} (Q_n(x) \cos \beta x + G_n(x) \sin \beta x);$$

čia Q_n ir G_n yra n -tojo laipsnio polinomai, o skaičius r gali įgyti reikšmes 0 arba 1 priklausomai nuo to ar skaičius $\alpha + i\beta$ yra charakteristinės lygties šaknis.

P a v y z d ū i a i .

1. Rasime lygties

$$y'' - 2y' + y = x - 4$$

bendrąjį sprendinį. Šią lygtį atitinka homogeninė lygtis

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

Charakteristinė lygtis

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

turi vieną šaknį $\lambda = 1$, kurios kartotinumas $r = 2$. Todėl $\varphi_1 = e^x$ yra homogeninės lygties sprendinys. Antras, tiesiškai nepriklausomas, šios lygties sprendinys $\varphi_2 = xe^x$ (žr. 97 pusl.). Taigi bendrasis homogeninės lygties sprendinys $\varphi = c_1e^x + c_2xe^x$. Nagrinėjamu atveju $\alpha = 0 \neq 1$. Todėl nehomogeninės lygties atskirojo sprendinio ieškome pavidalu $v = ax + b$; čia a ir b neapibrėžtiniai koeficientai. Istatę taip apibrėžtą funkciją v į nehomogeninę lygtį gausime tapatybę $ax + b - 2a = x - 4$. Sulyginę koeficientus prie vienodų x laipsnių randame $a = 1$, $b - 2a = -4 \Rightarrow b = -2$. Taigi atskirasis sprendinys $v = x - 2$, o bendrasis sprendinys $y = c_1e^x + c_2xe^x + x - 2$.

2. Rasime lygties

$$y'' - 4y' + 13y = 40 \cos 3x$$

bendrajį sprendinį. Šią lygtį atitinka homogeninė lygtis

$$y'' - 4y' + 13y = 0.$$

Charakteristinė lygtis

$$\lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0$$

turi dvi kopleksiškai jungtines šaknis $\lambda_1 = 2 + i3$, $\lambda_2 = 2 - i3$. Todėl homogeninė lygtis turi du kompleksiškai jungtinius sprendinius

$$z_1 = e^{(2+i3)x} = e^{2x}(\cos 3x + i \sin 3x), \quad z_2 = e^{(2-i3)x} = e^{2x}(\cos 3x - i \sin 3x).$$

Šių sprendinių realioji ir menamoji dalys

$$\varphi_1 = e^{2x} \cos 3x, \quad \varphi_2 = e^{2x} \sin 3x$$

yra homogeninės lygties du tiesiškai nepriklausomi sprendiniai. Todėl bendrasis homogeninės lygties sprendinys

$$\varphi = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x).$$

Rasime atskirajį nehomogeninės lygties sprendinį. Nagrinėjamu atvejui $q(x) = e^{0 \cdot x}(40 \cos 3x + 0 \sin 3x)$, $\alpha = 0$, $\beta = 3$. Be to, $0 + i3 \neq 2 \pm i3$. Todėl $r = 0$ ir atskirojo sprendinio ieškome pavidalu $y = a \cos 3x + b \sin 3x$. Istate taip apibrėžtą funkciją į nehomogeninę lygtį gausime tapatybę

$$(4a - 12b) \cos 3x = (12a + 4b) \sin 3x = 40 \cos 3x.$$

Sulyginę koeficientus prie tiesiškai nepriklausomų funkcijų $\sin 3x$ ir $\cos 3x$ gausime dviejų algebrinių lygčių sistemą

$$\begin{cases} 4a - 12b = 40, \\ 12a + 4b = 0. \end{cases}$$

Išsprendę šią sistemą randame $a = 1, b = -3$. Taigi atskirasis nehomogeninės lygties sprendinys $v = \cos 3x - 3 \sin 3x$, o bendrasis sprendinys

$$y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x) + \cos 3x - 3 \sin 3x.$$

P a s t a b a . Tegu y_1 ir y_2 yra atskiriejį tiesinių nehomogeninių lygčių

$$L(y) = q_1(x) \quad \text{ir} \quad L(y) = q_2(x)$$

sprendiniai. Tada $y = y_1 + y_2$ yra atskirasis tiesinės nehomogeninės lygties

$$L(y) = q_1(x) + q_2(x)$$

sprendinys. Iš tikrujų,

$$L(y) = L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) = q_1(x) + q_2(x).$$

4 SKYRIUS

Diferencialinių lygčių sistemos

4.1 BENDROS SĄVOKOS

Tegu G yra sritis erdvėje \mathbb{R}^{n+1} ir $f = \text{colon}(f_1, \dots, f_n)$ tolydi funkcija apibrėžta srityje G . Nagrinėsime normaliają diferencialinių lygčių sistemą

$$y' = f(x, y), \quad y = \text{colon}(y_1, \dots, y_n), \quad f = \text{colon}(f_1, \dots, f_n). \quad (4.1)$$

Jeigu (4.1) sistemoje funkcija f tiesiogiai nepriskluso nuo kintamojo x , tai tokia sistema vadinama *autonomine*. Autonominę sistemą vektoriniu pavidalu galima užrašyti taip:

$$y' = f(y), \quad y \in \Omega \subset \mathbb{R}^n. \quad (4.2)$$

Bendru atveju (4.1) lygties sprendinys priklauso nuo n laisvų konstantų ir ji galima užrašyti taip:

$$y = \varphi(x, C), \quad C = (c_1, \dots, c_n).$$

Norint iš jų išskirti kokį nors vieną reikia pareikalauti, kad sprendinys tenkintų kokią nors papildomą sąlygą. Dažniausiai tokia sąlyga apibrėžiama taip:

$$y(x_0) = y_0, \quad y_0 = \text{colon}(y_{10}, \dots, y_{0n}). \quad (4.3)$$

Ši sąlyga yra vadinama *pradine* arba *Koši* sąlyga. Jeigu (4.1) lygtį nagrinėsime kartu su (4.3) sąlyga, tai tokį uždavinį vadinsime *pradiniu* arba *Koši uždaviniu*.

Tegu $y = \varphi(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$ yra (4.1) lygčių sistemos sprendinys. Tada funkcija φ srityje $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ apibrėžia kreivę

$$l = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} : y = \varphi(x), x \in \langle a, b \rangle\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

kuri yra vadinama šios sistemos *integraline kreive*. Be integralinės kreivės erdvėje \mathbb{R}^{n+1} sprendinys φ apibrėžia kreivę

$$\{y \in \mathbb{R}^n : y = \varphi(x), x \in \langle a, b \rangle\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Taip apibrėžta kreivė, kartu su apėjimo kryptimi, vadinama *fazine trajektorija*, o erdvė \mathbb{R}^n – *fazine erdvė*. Taigi fazinė trajektorija yra integralinės kreivės projekcija lygiagrečiai x ašiai. Jeigu kokiame nors taške kertasi dvi integralinės kreivės ir siame taške jų liestinių krypties koeficientai sutampa, tai siame taške néra Koši uždavinio sprendinio vienaties. Trjektorijos fazinėje erdvėje gali kirstis nepažeidiant šios savybės. Be to, trajektorija gali sutapti su tašku. Tokia trajektorija yra vadinama *pusiausvyros tašku* (kartais *ramybės tašku*). Kadangi

pusiausvyros taškas yra pastovaus sprendinio trajektorija, tai taškas y yra pusiausvyros taškas tada ir tik tada, kai

$$f(x, y) = 0 \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Jeigu (4.1) sistemoje funkcijos f_1, \dots, f_n yra tiesinės kintamųjų y_1, \dots, y_n atžvilgiu, tai tokia sistema vadinama pirmosios eilės *tiesinių diferencialinių lygčių sistema*. Bendruoju atveju pirmosios eilės tiesinių diferencialinių lygčių sistemą galima užrašyti taip:

$$\begin{cases} y'_1 + a_{11}(x)y_1 + \dots + a_{1n}(x)y_n &= q_1(x), \\ \vdots &\vdots \\ y'_n + a_{n1}(x)y_1 + \dots + a_{nn}(x)y_n &= q_n(x). \end{cases}$$

arba matriciniu pavidalu

$$y' + A(x)y = q(x); \quad (4.4)$$

čia $A = \{a_{ij}\}$ – žinoma $n \times n$ eilės matrica, o $q = \text{colon}(q_1, \dots, q_n)$ – žinomas vektorius stulpelis. Kai funkcija q yra lygi nuliui, tai sistema

$$y' + A(x)y = 0 \quad (4.5)$$

yra vadinama *homogenine*. Priešingu atveju – *nehomogenine*.

Normaliajai diferencialinių lygčių sistemai išlieka teisingi visi teiginiai apie sprendinių egzistavimą, vienatį ir pratesimą, kurie buvo suformuluoti 2.1 skyrelyje vienos lygties atveju. Tiksliau yra teisingi tokie teiginiai.

4.1 teorema (Egzistavimo ir vienaties). Tegu funkcija $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ yra tolydi ir kintamųjų y atžvilgiu lokalai srityje G tenkina Lipšico sąlygą. Tada

1. Bet kokiam pradiniam taškui $(x_0, y_0) \in G$ egzistuoja (4.1) lygties sprendinys $y = y(x)$, apibrėžtas pakankamai mažoje taško x_0 aplinkoje ir tenkinantis pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$.
2. Sritis G yra vienaties sritis.

4.2 teorema. Tarkime, (4.4) lygtysteje matricos A elementai a_{ij} ir vektoriaus q elementai q_j yra tolydžios intervale (a, b) funkcijos. Tada

1. Bet kokiam pradiniam taškui (x_0, y_0) , $x_0 \in (a, b)$, $y_0 \in \mathbb{R}^n$ egzistuoja (4.4) sistemos sprendinys $y = y(x)$, apibrėžtas visame intervale (a, b) ir tenkinantis pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$.
2. Sritis $G = (a, b) \times \mathbb{R}^n$ yra vienaties sritis.

Tegu $y = \varphi(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$ yra (4.1) sistemos sprendinys. Sakysime, kad ji galima pratesti į dešinę, jeigu egzistuoja šios sistemos sprendinys $y = \psi(x)$ apibrėžtas intervale $\langle a, b_1 \rangle$, $b_1 > b$, kuris intervale $\langle a, b \rangle$ sutampa su sprendiniu $y = \varphi(x)$. Analogiskai apibrėžiamas sprendinio pratesimas į kaire.

4.3 teorema. Tegu $y = \varphi(x)$, $x \in [a, b]$ yra (4.1) sistemos sprendinys. Ji galima prateesti į dešinę tada ir tik tada, kai egzistuoja riba

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \varphi(x) = y^* \quad \text{ir} \quad (b, y^*) \in G.$$

A p i b r ė ž i m a s. Sakysime (4.1) sistemos sprendinys $y = \varphi(x)$ apibrėžtas intervale I yra *nepratesiamas*, o intervalas I *maksimalus* sprendinio egzistavimo intervalas, jeigu jo negalima prateesti nei į dešinę, nei į kairę už intervalo I .

4.4 teorema. Normaliosios (4.1) sistemos sprendinys $y = \varphi(x)$, $x \in (a, b)$ yra nepratesiamas tada ir tik tada, kai arba $b = \infty$ ($a = -\infty$), arba bet kokiam kompaktyui $K \subset G$ galima nurodyti tokį skaičių $\delta > 0$, kad taškas $(x, \varphi(x)) \in G/K$, kai $x \in (b - \delta, b)$ ($x \in (a, a + \delta)$).

Jeigu yra žinoma, kad autonominiems sistemoms nepratesiamąjį sprendinį atitinkanti trajektorija nepalieka koks nors kompakto, tai tokio sprendinio apibrėžimo sritis yra visa realių skaičių tiesė. Tiksliau yra teisinga teorema.

4.5 teorema. Tegu K yra kompaktas srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ir $y = \varphi(x)$ yra (4.2) autonominės sistemos sprendinys, apibrėžtas maksimaliame intervale (a, b) . Tada, jeigu sprendinį $y = \varphi(x)$, $x \in (a, b)$ apibrėžianti trajektorija γ nepalieka kompakto K , tai $(a, b) = \mathbb{R}$.

« Tegu $y = \varphi(x)$ yra autonominės sistemos sprendinys, apibrėžtas maksimaliame intervale (a, b) ir $Q = K \times (a, b)$ yra cilindras erdvėje \mathbb{R}^{n+1} . Reikia įrodyti, kad $(a, b) = \mathbb{R}$. Tarkime priešingai, $(a, b) \neq \mathbb{R}$. Pagal teoremos sąlygą integralinė kreivė $\{(x, y) : y = \varphi(x), x \in (a, b)\}$ nepalieka cilindro Q per jo šoninių paviršių. Todėl ji pasiekia cilindrą jo apatiniai ir viršutiniai pagrinduose: $x = a$ ir $x = b$. Tai rieškia, kad taškuose $x = a$ ir $x = b$ funkcija φ yra apibrėžta. Todėl sprendinį $y = \varphi(x)$ galima prateesti į intervalo (a, b) išorę. Tačiau tai prieštarauja tam, kad sprendinys $y = \varphi(x)$ yra apibrėžtas maksimaliame intervale (a, b) . Gauta prieštara įrodo, kad padaryta prielaida yra neteisinga ir $(a, b) = \mathbb{R}$. »

P a s t a b a. Įrodant šią teoremą pasinaudojome tik tuo, kad kiekvienam taškui (x_0, y_0) , $y_0 \in \Omega$, egzistuoja Koši uždavinio

$$y' = f(y), \quad y(x_0) = y_0$$

sprendinys, apibrėžtas koks nors taško x_0 aplinkoje $|x_0| < \delta$. Todėl iš funkcijos f pakanka reikalauti, kad $f \in C(\Omega)$. Jeigu (4.5) teoremos sąlygos nėra patenkintinos, tačiau funkcija f tenkina Lipšico sąlygą srityje Ω , tai (žr. 2.4) teorema, galima įrodyti, kad bet kuris autonominės sistemos sprendinys $y = \varphi(x)$ yra aprėžtas ir jį galima prateesti į visą realių skaičių aši.

Iš kitų sistemų autonominė sistema išskiria viena svarbia savybe.

4.6 teorema. Tegu $y = \varphi(x)$, $x \in (a, b)$ yra autonominės sistemos sprendinys. Tada $y = \psi(x) = \varphi(x + c)$, $x \in (a - c, b - c)$, $c \in \mathbb{R}$, taip pat yra šios sistemos sprendinys.

▫ Pagal funkcijos ψ apibrėžimą

$$\psi'(x) = \varphi'(x + c) = f(\varphi(x + c)) = f(\psi(x)).$$

Taigi integralinė kreivė, apibrėžiama lygtimi $y = \varphi(x)$, gaunama iš integralinės kreivės, apibrėžiamos lygtimi $y = \psi(x)$, poslinkiu teigama x ašies kryptimi dydžiu c . ▷

Išvados:

1. Tarkime, Ω yra vienaties sritis ir $y = y(x, x_0, y_0)$ yra autonominės sistemos

$$y' = f(y)$$

sprendinys, tenkinantis pradinę sąlygą $y(x_0) = y_0$. Tada $\forall x$ iš maksimalaus sprendinio egzistavimo intervalo yra teisinga lygybė

$$y(x + c, x_0 + c, y_0) = y(x, x_0, y_0). \quad (4.6)$$

Iš tikrujų, kai $x = x_0$, reiškiniai kairėje ir dešinėje sutampa su y_0 . Kadangi Ω yra vienaties sritis, tai jie sutampa $\forall x$ iš jų apibrėžimo intervalo.

2. Imkime (4.6) formulėje $c = -x_0$. Tada autonominės sistemos sprendinį galima užrašyti taip:

$$y(x, x_0, y_0) = y(x - x_0, 0, y_0) := \varphi(x - x_0, y_0).$$

Iš čia išplaukia, kad autonominės sistemos sprendinys priklauso ne nuo nepriklausomo kintamojo x , pradinės reikšmės x_0 ir pradinio taško y_0 , o nuo skirtumo $x - x_0$ ir pradinio taško y_0 . Geometriškai šią savybę galima interpretuoti taip. Jeigu dvi autonominės sistemos trajektorijos turi bendrą tašką, tai jos sutampa.

4.2 TIESINĖS HOMOGENINIŲ DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS

Nagrinėsime tiesinių homogeninių lygčių sistemą

$$y' = A(x)y. \quad (4.7)$$

Jos sprendiniai turi svarbių išskirtinių savybių. Tiesinės homogeninės lygčių sistemų sprendinių aibė yra tisinė erdvė, t.y.

1. Jeigu funkcija φ yra (4.7) sistemos sprendinys, tai funkcija $c\varphi$ taip pat yra šios sistemos sprendinys, c – skaliarinė konstanta;
2. Jeigu funkcijos φ ir ψ yra (4.7) sistemos sprendiniai, tai funkcija $\varphi + \psi$ taip pat yra šios sistemos sprendinys.

Iš tikrujų, tegu φ ir ψ yra (4.7) sistemos sprendiniai. Tada

$$\frac{d}{dx}(c\varphi) = c\varphi' = cA(x)\varphi = A(x)c\varphi,$$

$$\frac{d}{dx}(\varphi + \psi) = \varphi' + \psi' = A(x)\varphi + A(x)\psi = A(x)(\varphi + \psi).$$

Išvados:

1. Jeigu $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ yra (4.7) sistemos sprendiniai, tai jų tiesinis darinys

$$c_1\varphi_1 + \dots + c_m\varphi_m$$

taip pat yra (4.7) sistemos sprendinys.

2. Tegu $x = \varphi + i\psi$ yra kompleksinis (4.7) lygčių sistemos su realiais koeficientais a_{kj} , $k, j = 1, \dots, n$ sprendinys. Tada

$$\varphi' + i\psi' = A(x)\varphi + iA(x)\psi.$$

Sulyginę realią ir menamą dalis, gausime

$$\varphi' = A(x)\varphi, \quad \psi' = A(x)\psi.$$

Taigi kompleksinio sprendinio realioji ir menamoji dalys yra (4.7) lygčių sistemų sprendiniai.

A p i b r ė ž i m a s. Sakysime, vektorinės funkcijos $\varphi_1, \dots, \varphi_m : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ yra tiesiškai nepriklausomos, jeigu lygybė

$$c_1\varphi_1(x) + \dots + c_m\varphi_m(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b)$$

yra galima tik tuo atveju, kai $c_1 = \dots = c_m = 0$. Priešingu atveju sakysime, kad vektorinės funkcijos $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ yra tiesiškai priklausomos.

Vektorinės funkcijos $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ yra tiesiškai priklausomos, jeigu egzistuoja konstantos c_1, \dots, c_m , iš kurių bent viena nelygi nuliui, tokios, kad

$$c_1\varphi_1(x) + \dots + c_m\varphi_m(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Jeigu vektorinės funkcijos $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ yra tiesiškai priklausomos, tai kiekviename fiksuarame taške $x_0 \in (a, b)$ vektoriai $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_m(x_0)$ yra tiesiškai priklausomi. Atvirštinis teiginys yra neteisingas. Tačiau, jeigu vektoriai $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ yra (4.7) sistemos sprendiniai ir jie yra tiesiškai priklausomi kokiam nors taške $x_0 \in (a, b)$, tai jie yra tiesiškai priklausomi visame intervale (a, b) . Tiksliau yra teisinga teorema.

4.7 teorema. *Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_m : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ yra (4.7) sistemos sprendiniai ir kokiam nors taške $x_0 \in (a, b)$ vektoriai $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_m(x_0)$ yra tiesiškai priklausomi, t.y.*

$$c_1\varphi_1(x_0) + \dots + c_m\varphi_m(x_0) = 0, \quad \sum_{k=1}^n c_k^2 \neq 0.$$

Tada

$$c_1\varphi_1(x) + \dots + c_m\varphi_m(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

▫ Funkcija

$$\varphi(x) = c_1\varphi_1(x) + \dots + c_m\varphi_m(x)$$

yra (4.7) sistemos sprendinys. Be to, taške $x_0 \in (a, b)$ jis tenkina homogeninę pradinę sąlygą

$$\varphi(x_0) = c_1\varphi_1(x_0) + \dots + c_m\varphi_m(x_0) = 0.$$

Funkcija $\psi(x) \equiv 0$ taip pat tenkina (4.7) sistemą ir tą pačią homogeninę pradinę sąlygą. Pagal sprendinio egzistavimo ir vienaties teorematą šie sprendiniai sutampa, t.y. $\varphi(x) = 0, \forall x \in (a, b)$. ▷

4.8 teorema. *Bet kokie n tiesiškai nepriklausomi (4.7) sistemos sprendiniai yra šios sistemos sprendinių erdvės bazė.*

▫ Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_n - n$ tiesiškai nepriklausomi (4.7) sistemos sprendiniai. Tada vektoriai $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_n(x_0)$ yra tiesiškai nepriklausomi, $\forall x_0 \in (a, b)$. Todėl jie yra erdvės \mathbb{R}^n bazė.

Laisvai pasirenkame (4.7) sistemos sprendinį ψ . Vektorius $\psi(x_0) \in \mathbb{R}^n$. Išreiškė ji per bazinius vektorius $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_n(x_0)$, gausime

$$\psi(x_0) = c_1\varphi_1(x_0) + \dots + c_n\varphi_n(x_0).$$

Iš šios lygybės matome, kad vektoriai $\psi(x_0), \varphi_1(x_0), \dots, \varphi_n(x_0)$ yra tiesiškai priklausomi taške x_0 . Pagal 4.7 teoremą jie yra tiesiškai priklausomi visame intervale (a, b) (su tais pačiais koeficientais), t.y.

$$\psi(x) = c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x). \diamond$$

Išvada. Bet kokie (4.7) sistemos sprendiniai $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yra šios sistemos sprendinių erdvės bazė, jeigu kokiame nors taške $x_0 \in (a, b)$ vektoriai $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_n(x_0)$ yra tiesiskai nepriklausomi.

Atkreipsite dėmesį į tai, kad (4.7) sistemos sprendinių erdvės bazė egzistuoja. Vektorius $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ galima apibrėžti kaip Koši uždavinių

$$\begin{aligned} y' &= A(x)y, \quad y(x_0) = (1, 0, \dots, 0), \\ y' &= A(x)y, \quad y(x_0) = (0, 1, \dots, 0), \\ &\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ y' &= A(x)y, \quad y(x_0) = (0, \dots, 0, 1); \end{aligned}$$

sprendinius.

Sprendinių erdvės bazė dažnai yra vadinama *fundamentaliaja sprendinių sistema*. Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yra (4.7) sistemos fundamentalioji sprendinių sistema. Tada funkcija

$$\varphi(x) = c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x) \quad (4.8)$$

su laisvais koeficientais c_1, \dots, c_n yra (4.7) sistemos bendrasis sprendinys. Iš tikrujų, funkcija φ , apibrėžta (4.8) formule, yra (4.7) sistemos sprendinys su kiekvienu konstantu rinkiniu c_1, \dots, c_n . Atvirščiai, tegu $y = \varphi(x)$ yra koks nors (4.7) sistemos sprendinys tenkinantis pradinę sąlygą $\varphi(x_0) = y_0$. Tada tiesinė algebrinių lygčių sistema

$$y_0 = c_1\varphi_1(x_0) + \dots + c_n\varphi_n(x_0)$$

turi vienintelį netrivialų sprendinį c_1^0, \dots, c_n^0 . Funkcija

$$\varphi_0(x) = c_1^0\varphi_1(x) + \dots + c_n^0\varphi_n(x)$$

taip pat yra (4.7) sistemos sprendinys tenkinantis tą pačią pradinę sąlygą. Pagal sprendinio egzistavimo ir vienaties teoremą $\varphi_0(x) = \varphi(x)$. Taigi funkciją φ galima išreikšti (4.8) formule.

Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ – fundamentalioji sprendinių sistema, Φ – iš šių vektorių sudaryta matrica. Matrica Φ vadinama *fundamentaliaja matrica*. Pažymėjė $C = \text{colon}(c_1, \dots, c_n)$ bendrajį (4.7) sistemos sprendinį galime užrašyti taip:

$$\varphi(x) = \Phi(x)C. \quad (4.9)$$

Matricos Φ determinantas

$$W(x) = \det \Phi(x)$$

yra vadinamas funkcijų sistemos $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ *Vronskio determinantu*.

4.9 teorema. Yra ekvivalentūs tokie trys teiginiai:

1. $W(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b);$
2. $W(x_0) = 0, \text{ kokiame nors taške } x_0 \in (a, b);$
3. Sprendiniai $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ – tiesiskai priklausomi.

▫ Irodysime, kad $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 1$. Implikacija $1 \Rightarrow 2$ yra akivaizdi. Tarkime, kad $W(x_0) = 0, x_0 \in (a, b)$. Tada vektoriai $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_n(x_0)$ yra tiesiškai priklausomi. Tačiau tada pagal 4.7 teoremą sprendiniai $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yra tiesiškai priklausomi. Taigi iš $2 \Rightarrow 3$. Tarkime, sprendiniai $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yra tiesiškai priklausomi. Tada vektoriai $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x), x \in (a, b)$ yra tiesiškai priklausomi ir iš jų sudarytas determinantas yra lygus nuliui. ▷

Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ – fundamentalioji sprendinių sistema, $W = \det \Phi$ – ja atitinkantis Vronskio determinantas, $\varphi_k = \text{colon}(\varphi_{k1}, \dots, \varphi_{kn}), k = 1, \dots, n$. Tada

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_{11}(x) & \cdots & \varphi_{1k}(x) & \cdots & \varphi_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(x) & \cdots & \varphi_{nk}(x) & \cdots & \varphi_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

Jo išvestinė

$$W'(x) = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \varphi_{11}(x) & \cdots & \varphi'_{1k}(x) & \cdots & \varphi_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(x) & \cdots & \varphi'_{nk}(x) & \cdots & \varphi_{nn}(x). \end{vmatrix} \quad (4.10)$$

Kiekviena iš funkcijų φ_k yra (4.7) sistemos sprendinys. Todėl

$$\varphi'_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{kj} \varphi_{ij}$$

ir

$$W'(x) = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \varphi_{11}(x) & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{kj} \varphi_{1j}(x) & \cdots & \varphi_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(x) & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{kj} \varphi_{nj}(x) & \cdots & \varphi_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

Išskleidę determinantą po sumos ženklu, gausime sumą determinantų su koeficientais a_{kj} , iš kurių vienas prie koeficiente a_{kk} lygus $W(x)$, o kiti lygūs nuliui. Taigi

$$W'(x) = \left(\sum_{k=1}^n a_{kk} \right) W(x).$$

Ši lygtis yra pirmos eilės tiesinė homogeninė diferencialinė lygtis. Jos sprendinys

$$W(x) = W(x_0) \exp \left\{ \int_{x_0}^x \sum_{k=1}^n a_{kk}(x) dx \right\}. \quad (4.11)$$

Pastaroji formulė vadinama *Liuvinlio* formule.

4.3 NEHOMOGENINĖS TIESINIŲ DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS

Tegu $\psi = \text{colon}(\psi_1, \dots, \psi_n)$ yra koks nors tiesinės nehomogeninės lygčių sistemos

$$y' = A(x)y + q(x) \quad (4.12)$$

sprendinys. Padarę keitinį $y = \varphi + \psi$, gausime tiesinę homogeninę lygčių sistemą

$$\varphi' = A(x)\varphi. \quad (4.13)$$

Tarkime $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ yra šios sistemos fundamentalioji sprendinių sistema. Tada jos bendrasis sprendinys

$$\varphi = c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n.$$

Kartu

$$y = c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n + \psi \quad (4.14)$$

yra (4.12) sistemos sprendinys. Irodysime, kad (4.14) formulė apibrėžia bendrąjį (4.12) sistemos sprendinį juosteje $x \in (a, b)$, $y \in (-\infty, \infty)$.

Akivaizdu, kad kiekvienam konstantų rinkiniui c_1, \dots, c_n (4.14) formulė apibrėžia (4.12) sistemos sprendinį. Tegu $y = y(x)$ yra Koši uždavinio

$$y' = A(x)y + q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

sprendinys. Tiesinė algebrinių lygčių sistema

$$c_1\varphi_1(x_0) + \dots + c_n\varphi_n(x_0) + \psi(x_0) = y_0$$

turi vienintelį sprendinį, nes jos determinantas nelygus nuliui. Pažymėkime jį c_1^0, \dots, c_n^0 . Tada

$$y = y(x) \quad \text{ir} \quad y = c_1^0\varphi_1(x) + \dots + c_n^0\varphi_n(x) + \psi(x)$$

yra to paties Koši uždavinio sprendiniai. Pagal Koši uždavinio sprendinių vienaties teoremą jie sutampa. Taigi kiekvieną Koši uždavinio sprendinį $y = y(x)$ galima išreikšti (4.14) formule.

Išvada. Bendrasis (4.12) sistemos sprendinys

$$y = \varphi + \psi;$$

čia ψ – koks nors atskirasis (4.12) sistemos sprendinys, o φ – bendrasis (4.13) sistemos sprendinys.

Tegu $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ – fundamentalioji (4.13) sistemos sprendinių sistema, Φ – iš jų sudaryta fundamentalioji matrica. Rasime atskirajį (4.12) sistemos sprendinį. Jį ieškosime konstantų variavimo metodu.

Apibrėžkime funkciją

$$\psi(x) = \Phi(x)c(x);$$

čia $c(x) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ – nežinoma vektorinė funkcija. Istatę taip apibrėžtą funkciją į (4.12) sistemą, gausime

$$\Phi'(x)c(x) + \Phi(x)c'(x) = A(x)\Phi(x)c(x) + q(x).$$

Fundamentalioji matrica Φ tenkina homogeninę diferencialinių lygčių sistemą, t.y.

$$\Phi'(x) = A(x)\Phi(x).$$

Todėl vektorinė funkcija c turi tenkinti sistemą

$$\Phi(x)c'(x) = q(x).$$

Šios sistemos Vronskio determinantas

$$W(x) = \det \Phi(x) \neq 0.$$

Todėl ją galima išspresti c' atžvilgiu, t.y.

$$c'(x) = \Phi^{-1}(x)q(x).$$

Ši lygtis turi sprendinį

$$c(x) = \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)q(s) ds$$

Taigi atskirasis (4.12) sistemos sprendinys

$$\psi(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)q(s) ds. \quad (4.15)$$

Bendrasis (4.13) sistemos sprendinys

$$y = \Phi(x)c;$$

čia $c \in \mathbb{R}^n$ – pastovus vektorius. Todėl (4.12) sistemos bendrasis sprendinys

$$y = \Phi(x)c + \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)q(s) ds. \quad (4.16)$$

4.4 TIESINIŲ DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SISTEMOS SU PASTOVIAIS REALIAIS KOEFICIENTAIS

Nagrinėsime tiesinę diferencialinių lygčių sistemą

$$y' = Ay + q(x), \quad (4.17)$$

kurioje matricos A elementai a_{ij} yra pastovūs realūs skaičiai. Šios sistemos sprendimas susiveda į homogeninės sistemos

$$y' = Ay \quad (4.18)$$

sprendimą. Iš tikrujų, jeigu žinome kokią nors (4.18) sistemos fundamentaliąją sprendinių sistemą, tai konstantų variavimo metodu galime rasti (4.17) sistemos atskirajį sprendinį. Kartu galime rasti ir jos bendrąjį sprendinį. Todėl toliau nagrinėsime (4.18) sistemą.

Atskirojo (4.18) sistemos sprendinio ieškosime pavidalu

$$y = be^{\lambda x}, \quad b = \text{colon}(b_1, \dots, b_n).$$

Istatę taip apibrėžtą funkciją į (4.18) sistemą, gausime

$$\lambda be^{\lambda x} = Abe^{\lambda x} \iff (A - \lambda E)be^{\lambda x} = 0.$$

Tai yra tiesinė algebrinė n lygčių sistema b_1, \dots, b_n atžvilgiu. Ji turi netrivialų sprendinį¹ tada ir tik tada, kai jos determinantas

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

Ši lygtis vadinama *charakteristinė lygtimi* (4.18) sistemai. Parametras λ atžvilgiu kairioji charakteristinės lygties pusė yra n -ojo laipsnio polinomas. Jis vadinamas *charakteristiniu polinomu*. Iš tiesinės algebro yra žinoma, kad n -ojo laipsnio polinomas turi lygiai n šaknų. Tegu $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra charakteristinio polinomo šaknys. Atskirai išnagrinėsime tris atvejus:

1. Šaknys $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra skirtinos ir realios.
2. Šaknys $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra skirtinos, tačiau tarp jų yra kompleksinės.
3. Kai kurios iš šaknų $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra kartotinės.

Iš pradžių išnagrinėsime atvejį, kai šaknys $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra skirtinos ir realios. Šiuo atveju vektorinės funkcijos

$$\varphi_k = b_k e^{\lambda_k x}, \quad b_k = \text{colon}(b_{k1}, \dots, b_{kn}), \quad k = 1, \dots, n \quad (4.19)$$

yra (4.18) sistemos sprendiniai, o vektoriai b_k yra algebrinių lygčių sistemos $(A - \lambda_k E)b = 0$ sprendiniai. Be to, funkcijos φ_k , $k = 1, 2, \dots, n$ yra tiesiskai

¹Tokių sprendinių yra be galio daug. Tiksliau, jeigu vektorius $be^{\lambda x}$ yra (4.18) sistemos sprendinys, tai vektorius $kbe^{\lambda x}$, $k \in \mathbb{R}$ taip pat yra šios sistemos sprendinys.

nepriklausomos (patikrinkite). Todėl taip apibrėžtos funkcijos φ_k yra fundamentalioji sprendinių sistema.

Išnagrinėsime antrajį atvejį. Tarkime, šaknys $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra skirtinges, taciau tarp jų yra kompleksinės. Tegu $\sigma = \alpha + i\beta$ yra viena iš kompleksinių šaknų. Tada $\bar{\sigma} = \alpha - i\beta$ taip pat yra kompleksinė šaknis, t.y. kompleksinės šaknys įeina poromis. Šaknį σ atitinka algebrinių lygčių sistema

$$(A - \sigma E)b = 0.$$

Kadangi visos šaknys yra skirtinges, tai ši sistema turi vienintelį, daugiklio tikslumu, netrivialų kompleksinį sprendinį $b = u + iv$ ir

$$be^{\sigma x} = (u + iv)e^{(\alpha+i\beta)x} = (u + iv)e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

yra (4.18) sistemos kompleksinis sprendinys¹. Atskyre Jame realią ir menamą dalis, gausime du realius (4.18) sistemos sprendinius

$$(u \cos \beta x - v \sin \beta x)e^{\alpha x}, \quad (v \cos \beta x + u \sin \beta x)e^{\alpha x}.$$

Lengvai galima įsitikinti, kad kompleksiškai jungtinę šaknį $\bar{\sigma} = \alpha - i\beta$ atitinka ta pati realių sprendinių pora. Kartu kiekvieną kompleksiškai jungtinių šaknų porą atitinka du realūs sprendiniai, o skirtinges n šaknų atitinka lygiai n realių sprendinių. Be to, šie sprendiniai yra tiesiskai nepriklausomi. Norint tuo įsitikinti reikia grįžti nuo trigonometrinii prie rodiklinių funkcijų.

Išnagrinėsime trečiąjį atvejį. Tarkime, dalis šaknų $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra kartotinės. Jeigu kurios nors šaknies, pavyzdžiu λ_1 , kartotinumas lygus vienetui, tai nepriklausomai nuo to kokios yra kitos šaknys, ją visada atitinka sprendinys $be^{\lambda x}$, $b = \text{colon}(b_1, \dots, b_n)$.

Tegu μ yra charakteristikinio polinomo r kartotinumo šaknis. Tada matematinės indukcijos metodu galima įrodyti, kad šia šaknį atitinka sprendinys

$$P_{r-1}(x)e^{\mu x}, \quad P_{r-1}(x) = \text{colon}(p_{1r-1}(x), \dots, p_{nr-1}(x));$$

čia $p_{1r-1}(x), \dots, p_{kr-1}(x)$ yra $s \leq r-1$ laipsnio polinomai, turintis visumoje lygiai r laisvų koeficientų.

Tegu μ yra charakteristikinio polinomo r karotinumo kompleksinė šaknis. Tada jungtinė šaknis $\bar{\mu}$ taip pat yra r kartotinumo šaknis. Šaknį μ atitinka kompleksinis sprendinys $P_{k-1}(x)e^{\mu x}$ su r kompleksinių laisvų konstantų. Atskirę Jame realią ir menamą dalis, gausime porą realių sprendinių. Kiekviename iš jų yra r laisvų konstantų.

Taigi kiekvieną realią charakteristikinio polinomo r kartotinumo šaknį atitinka sprendinys su r laisvų konstantų. Kiekvieną kompleksinių r kartotinumo šaknų porą atitinka realus sprendinys su $2r$ laisvų konstantų. Visumą

¹ Kompleksinė funkcija $x = y + iz$ yra (4.18) sistemos sprendinys, jeigu

$$y' + iz' = Ay + iAz.$$

Tuo atveju, kai matricos A koeficientai yra realūs, kompleksinio sprendinio realioji ir menamoji dalys taip pat yra (4.18) sistemos sprendiniai.

charakteristinio polinomo šaknų atitinka sprendinys su n laisvų konstantų. Iš jo galima išskirti lygiai n realių, teisiškai nepriklausomų sprendinių, t.y. galime sukonstruoti fundamentaliąjį sprendinių sistemą. Kartu galime rasti bendrajį homogeninės lyties sprendinį.

Pavyzdžiai:

1. Rasime sistemos

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 - y_2, \\ y'_2 = -4y_1 + y_2 \end{cases} \iff y' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} y,$$

$y = \text{colon}(y_1, y_2)$ bendrajį sprendinį. Charakteristinės lyties

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

šaknys $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$ yra realios ir skirtinos. Todėl atskirus nagrinėjamos sistemos sprendinius ieškome pavidalu:

$$\varphi_1 = \text{colon}(b_1, b_2)e^{-x}, \quad \varphi_2 = \text{colon}(d_1, d_2)e^{3x}.$$

Istatę pirmajį sprendinį į sistemą gausime algebrinę homogeninę dviejų lygčių sistemą

$$\begin{cases} -b_1 = b_1 - b_2, \\ -b_2 = -4b_1 + b_2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2b_1 - b_2 = 0, \\ -4b_1 + 2b_2 = 0. \end{cases}$$

Ji turi be galio daug sprendinių. Paėmę $b_1 = 1$, $b_2 = 2$ gausime atskirąjį sprendinį $\varphi_1 = \text{colon}(1, 2)e^{-x}$. Istatę į nagrinėjamą sistemą sprendinį φ_2 gausime sistemą

$$\begin{cases} 3d_1 = d_1 - d_2, \\ 3d_2 = -4d_1 + d_2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2d_1 + d_2 = 0, \\ 4d_1 + 2d_2 = 0. \end{cases}$$

Ji turi be galio daug sprendinių. Paėmę $d_1 = 1$, $d_2 = -2$ rasime atskirąjį sprendinį $\varphi_2 = \text{colon}(1, -2)e^{3x}$. Taigi bendrasis nagrinėjamos sistemos sprendinys

$$y = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 = \begin{pmatrix} c_1e^{-x} + c_2e^{3x} \\ 2c_1e^{-x} - 2c_2e^{3x} \end{pmatrix}.$$

2. Rasime sistemos

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 + y_2, \\ y'_2 = -y_1 + y_2 - y_3, \\ y'_3 = 3y_2 + y_3, \end{cases} \iff y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} y,$$

$y = \text{colon}(y_1, y_2, y_3)$ bendrajį sprendinį. Charakteristinės lyties

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 5) = 0$$

šaknys $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1 + 2i$, $\lambda_3 = 1 - 2i$. Šaknį λ_1 atitinkanti atskirajį sprendinį galime ieškoti pavidalu $\varphi_1 = \text{colon}(b_1, b_2, b_3)e^x$. Istatę taip apibrėžtą sprendinį į lygtį gausime algebrinę homogeninę trijų lygčių sistemą

$$\begin{cases} b_1 = b_1 + b_2, \\ b_2 = -b_1 + b_2 - b_3 \\ b_3 = +3b_2 + b_3 \end{cases} \iff \begin{cases} b_2 = 0, \\ -b_1 - b_3 = 0, \\ 3b_2 = 0. \end{cases}$$

Ji turi be galo daug sprendinių. Paėmę $b_1 = 1$ gausime $b_3 = -1$. Taigi atskirasis sprendinys $\varphi_1 = \text{colon}(1, 0, -1)e^x$. Šaknį λ_2 atitinka kompleksinis sprendinys $\tilde{\varphi} = \text{colon}(d_1, d_2, d_3)e^{(1+2i)x}$ su kompleksinėm laisvom konstantom d_1, d_2, d_3 . Istatę taip apibrėžtą sprendinį į lygtį gausime algebrinę homogeninę trijų lygčių sistemą

$$\begin{cases} (1+2i)d_1 = d_1 + d_2, \\ (1+2i)d_2 = -d_1 + d_2 - d_3 \\ (1+2i)d_3 = +3d_2 + d_3 \end{cases} \iff \begin{cases} 2id_1 = d_2, \\ 2id_2 = -d_1 - d_3, \\ 2id_3 = 3d_2. \end{cases}$$

kintamujų d_1, d_2, d_3 atžvilgiu. Ji turi be galo daug sprendinių. Paėmę $d_2 = 2i$ randame: $d_1 = 1$, $d_3 = 3$. Todėl kompleksinis sprendinys

$$\tilde{\varphi} = \text{colon}(1, 2i, 3)e^{(1+2i)x}.$$

Atskyrię tame raliaj ir menamą dalis gausime du realius sprendinius

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \text{colon}(\cos 2x, -2 \sin 2x, 3 \cos 2x)e^x, \\ \varphi_2 &= \text{colon}(\sin 2x, 2 \cos 2x, 3 \sin 2x)e^x. \end{aligned}$$

Kompleksinę šaknį λ_3 atitinka ta pati realių sprendinių pora. Taigi bendrasis nagrinėjamos sistemas sprendinys

$$y = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 + c_3\varphi_3 = e^x \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x \\ -2c_2 \sin 2x + 2c_3 \cos 2x \\ -c_1 + 3c_2 \cos 2x + 3c_3 \sin 2x \end{pmatrix}.$$

3. Rasime sistemas

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 - y_2 + y_3, \\ y'_2 = y_1 + y_2 - y_3, \\ y'_3 = -y_2 + 2y_3, \end{cases} \iff y' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} y,$$

$y = \text{colon}(y_1, y_2, y_3)$ bendrajį sprendinį. Charakteristinės lygties

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (2 - \lambda)(\lambda - 1)^2 = 0$$

šaknys $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 1$. Šaknij λ_1 atitinkantį atskirąjį sprendinį galime ieškoti pavidalu $\varphi_1 = \text{colon}(b_1, b_2, b_3)e^{2x}$. Istatę taip apibrėžtą sprendinį į lygtį gausime algebrinę homogeninę trijų lygčių sistemą

$$\begin{cases} 2b_1 = b_1 - b_2 + b_3, \\ 2b_2 = b_1 + b_2 - b_3 \\ 2b_3 = -b_2 + 2b_3 \end{cases} \iff \begin{cases} b_1 + b_2 - b_3 = 0, \\ b_1 - b_2 - b_3 = 0, \\ b_2 = 0. \end{cases}$$

Ji turi be galo daug sprendinių. Paėmę $b_1 = 1$ gausime $b_3 = 1$. Taigi atskirasis sprendinys $\varphi_1 = \text{colon}(1, 0, 1)e^{2x}$. Antrosios charakteristinio polinomo šaknies kartotinumas lygus dviem. Todėl kitų atskirų sprendinių galima ieškoti pavidalu

$$\tilde{\varphi} = \text{colon}(b_1 + b_2 x, d_1 + d_2 x, \gamma_1 + \gamma_2 x) e^x.$$

Istatę taip apibrėžtą sprendinį į lygtį gausime lygybes

$$\begin{cases} b_2 + (b_1 + b_2 x) = (b_1 + b_2 x) - (d_1 + d_2 x) + (\gamma_1 + \gamma_2 x), \\ d_2 + (d_1 + d_2 x) = (b_1 + b_2 x) + (d_1 + d_2 x) - (\gamma_1 + \gamma_2 x) \\ \gamma_2 + (\gamma_1 + \gamma_2 x) = -(d_1 + d_2 x) + 2(\gamma_1 + \gamma_2 x). \end{cases}$$

Sutraukę panašius narius jas perrašysime taip:

$$\begin{cases} (\gamma_2 - d_2)x + \gamma_1 - d_1 - b_2 = 0, \\ (b_2 - \gamma_2)x + b_1 - \gamma_1 - d_2 = 0, \\ (\gamma_2 - d_2)x + \gamma_1 - d_1 - \gamma_2 = 0. \end{cases}$$

Šios lygybės bus teisingos su visais $x \in \mathbb{R}$ tada ir tik tada, kai

$$\begin{cases} \gamma_2 - d_2 = 0, \\ b_2 - \gamma_2 = 0, \\ \gamma_2 - d_2 = 0, \\ \gamma_1 - d_1 - b_2 = 0, \\ b_1 - \gamma_1 - d_2 = 0, \\ \gamma_1 - d_1 - \gamma_2 = 0. \end{cases}$$

Kadangi šaknies kartotinumas $r = 2$, tai pastarosios algebrinės šešių lygčių sistemos sprendinių aibė priklauso nuo dviejų laisvų konstantų. Išsprendę šią sistemą atžvilgiu konstantų b_2 ir γ_1 randame:

$$\gamma_2 = b_2, d_2 = b_2, d_1 = \gamma_1 - b_2, b_1 = \gamma_1 + b_2.$$

Tegu $b_2 = 1, \gamma_1 = 0$. Tada $\gamma_2 = 1, d_2 = 1, d_1 = -1, b_1 = 1$. Kai $b_2 = 0, \gamma_1 = 1$ turime $\gamma_2 = 0, d_2 = 0, d_1 = 1, b_1 = 1$. Taigi antrają kartotinumo $r = 2$ šaknį atitinka du tiesiškai nepriklausomi sprendiniai

$$\varphi_2 = \text{colon}(1 + x, -1 + x, x) e^x, \quad \varphi_3 = \text{colon}(1, 1, 1) e^x,$$

o bendrasis nagrinėjamos sistemos sprendinys

$$y = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 + c_3\varphi_3 = \begin{pmatrix} c_1e^{2x} + c_2(1+x)e^x + c_3e^x \\ c_2(x-1)e^x + c_3e^x \\ c_1e^{2x} + c_2xe^x + c_3e^x \end{pmatrix}.$$

P a s t a b a . Čia pateikta konstrukcija nesuteikia pilnos informacijos apie fundamentaliosios matricos struktūrą, kol fundamentalioji matrica néra surasta. Žemiau pateiksime metodą, kurio pagalba galima sukonstruoti iš karto visą fundamentaliąjį matricą, skirtingai nuo čia pateikto metodo, kuriame fundamentalioji matrica yra konstruojama palaipsniui.

Tegu A – pastovioji $n \times n$ eilės matrica. Tiesinė sistema $y' = Ay$ keitiniu $y = Qz$, $\det Q \neq 0$, susiveda į sistemą $z' = Q^{-1}AQz$. Neišsigimusią matricą Q galima parikti taip, kad $Q^{-1}AQ = J$; čia J – Žordano matrica. Kartu tiesinę sistemą su pastoviais koeficientais galima suvesti į paprastesnę sistemą

$$z' = Jz. \quad (4.20)$$

Ši sistema vadinama *kanonine*. Tegu

$$J = \text{diag}\{J_{s_1}(\lambda_1), \dots, J_{s_m}(\lambda_m)\};$$

čia λ_k yra s_k kartotinumo charakteristikinio polinomo $\det(A - \lambda E) = 0$ šaknis, o $J_{s_k}(\lambda_k)$ – Žordano langelis. Tada (4.20) sistemą galima perrašyti taip:

$$\begin{aligned} z'_1 &= \lambda_1 z_1 + z_2, \\ z'_2 &= \lambda_1 z_2 + z_3, \\ &\vdots && \vdots \\ z'_{s_1} &= \lambda_1 z_{s_1}, \\ &\vdots && \vdots \\ z'_{n-s_m+1} &= \lambda_m z_{n-s_m+1} + z_{n-s_m+2}, \\ z'_{n-s_m+2} &= \lambda_m z_{n-s_m+2} + z_{n-s_m+3}, \\ &\vdots && \vdots \\ z_n &= \lambda_m z_n. \end{aligned}$$

Pastaroji sistema turi svarbų privalumą prieš bendro pavidalo sistemą. Visu pirma ji išskaido į m nepriklausomų sistemų. Kiekvieną iš šių sistemų galima suintegruoti atskirai. Bendrajų sistemos sprendinį lengvai galima apibrėžti nuosekliai ją integrnuojant, pradedant nuo paskutinės sistemos lygties.

Antra – nagrinėjant įvairius diferencialinių lygčių teorijos klausimus, pakanka šiuos klausimus ištirti kanoninėms sistemoms. Pavyzdžiui, nagrinėjant įvairius uždavinius susijusius su antros eilės sistema

$$y' = Ay \iff \begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, \\ y'_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases}$$

pakanka išnagrinėti tokias tris sistemas

$$\begin{cases} y'_1 = \lambda_1 y_1, \\ y'_2 = \lambda_2 y_2, \end{cases} \quad \begin{cases} y'_1 = \lambda_1 y_1, \\ y'_2 = \lambda_1 y_2, \end{cases} \quad \begin{cases} y'_1 = \lambda_1 y_1 + y_2, \\ y'_2 = \lambda_1 y_2. \end{cases} \quad (4.21)$$

Kartu galime tvirtinti, kad tiesinės sistemas $y' = Ay$ su pastoviais koeficientais fundamentalioji matrica sutampa su viena iš matricų

$$Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & 0, \\ 0 & e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix}, \quad Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & 0, \\ 0 & e^{\lambda_1 x} \end{pmatrix}, \quad Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & xe^{\lambda_1 x}, \\ 0 & e^{\lambda_1 x} \end{pmatrix}.$$

4.5 KANONINIŲ SISTEMŲ PLOKŠTUMOJE FAZINIAI PORTRETAI

Tegu A yra antros eilės kvadratinė matrica ir J yra ją atitinkanti Žordano matrica. Tada tiesinę sistemą

$$y' = Ay, \quad y \in \mathbb{R}^2 \quad (4.22)$$

atitinka kanoninę sistemą

$$y' = Jy, \quad y \in \mathbb{R}^2; \quad (4.23)$$

Ištirsime šios sistemos pusiausvyros taškų charakterį, priklausomai nuo charakteristinio polinomo šaknų λ_1, λ_2 . Charakteristinę lygtį $\det(A - \lambda E) = 0$ galima užrayti taip:

$$\lambda^2 - (\text{Sp } A)\lambda + \det A = 0;$$

čia $\text{Sp } A = \sum_{i=1}^2 a_{ii}$. Jos šaknys

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(\text{Sp } A \pm \sqrt{D}), \quad D = (\text{Sp } A)^2 - 4 \det A.$$

Pagal Vijetos teoremą

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{Sp } A, \quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det A.$$

Panašių matricų¹ charakteristiniai polinomai sutampa. Todėl

$$\text{Sp } A = \text{Sp } J = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \det A = \det J = \lambda_1 \cdot \lambda_2.$$

Tegu matricos A tikrinės reikšmės λ_1, λ_2 yra realios, skirtinges ir nelygios nuliui. Tada (4.23) sistemą (žr. (4.21) formulę) galima perrašyti taip:

$$y'_1 = \lambda_1 y_1, \quad y'_2 = \lambda_2 y_2.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$y_1(x) = c_1 e^{\lambda_1 x}, \quad y_2(x) = c_2 e^{\lambda_2 x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (4.24)$$

Eliminavę iš (4.24) lygčių kintamajį x , gausime lygtį

$$y_1 = c |y_2|^{\lambda_1/\lambda_2}, \quad c = c_1 / |c_2|^{\lambda_1/\lambda_2}. \quad (4.25)$$

Išskirsime tris atvejus:


¹Kvadratinės matricos A ir B yra panašios, jeigu egzistuoja tos pačios eilės kvadratinė neišsigimus matrica Q tokia, kad $AQ = QB$. Panašių matricų charakteristiniai polinomai sutampa. Iš tikrujų

$$|A - \lambda E| = |QBQ^{-1} - \lambda QQ^{-1}| = |Q(B - \lambda E)Q^{-1}| = |B - \lambda E|.$$

1. Tikrinės reikšmės λ_1, λ_2 yra neigiamos. Tai bus tada ir tik tada, kai $\det A > 0$, $D > 0$ ir $\text{Sp } A < 0$. Tegu $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$. Tada $|y_1(x)| \rightarrow 0$ ir $|y_2(x)| \rightarrow 0$, kai $x \rightarrow \infty$. Taigi visos nagrinėjamos sistemos trajektorijos artėja į koordinatinių pradžią. Iš (4.25) lygčių išplaukia, kad (4.23) sistemos trajektorijos yra parabolės². Be to, $\lambda_1/\lambda_2 > 1$. Todėl visos jos liečia ašį y_2 (žr. 4.1 pav.)

2. Tikrinės reikšmės λ_1, λ_2 yra priešingų ženklų. Tai bus tada ir tik tada, kai $\det A < 0$, $D > 0$. Tegu $\lambda_1 < \lambda_2$. Tiksliau tegu $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$. Tada $|y_1(x)| \rightarrow 0$, $|y_2(x)| \rightarrow \infty$, kai $x \rightarrow \infty$. Kadangi $\lambda_1/\lambda_2 < 0$, tai (4.23) lygčių sistemos trajektorijos, apibrėžiamos (4.25) lygtimi, yra hiperbolės³ (žr. 4.2 pav.).

3. Tikrinės reikšmės λ_1, λ_2 yra teigiamos. Tai bus tada ir tik tada, kai $\det A > 0$, $D > 0$ ir $\text{Sp } A > 0$. Tegu $0 < \lambda_1 < \lambda_2$. Tada $|y_1(x)| \rightarrow \infty$, $|y_2(x)| \rightarrow \infty$, kai $x \rightarrow \infty$. Kadangi $\lambda_1/\lambda_2 > 0$, tai (4.23) lygčių sistemos trajektorijos, apibrėžiamos (4.25) lygtimi, yra parabolės¹. Be to, $\lambda_1/\lambda_2 < 1$. Todėl jos visos liečia ašį y_1 (žr. 4.3 pav.).



4.1 pav.

4.2 pav.

4.3 pav.

Pusiausvyros taškas, pavaizduotas 4.1 ir 4.3 paveikslėliuose, vadinamas *mazgo* tašku, o pusiausvyros taškas, pavaizduotas 4.2 paveikslėlyje – *balno* tašku.

Tarkime dabar, kad tikrinės reikšmės λ_1, λ_2 sutampa ir nelygios nuliui. Tai bus tada ir tik tada, kai $\det A > 0$ ir $D = 0$. Tegu $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \neq 0$. Išskirsime du atvejus:

1. Tarkime, matrica J yra diagonali. Tada (4.23) sistemo galima perrašyti taip:

$$y'_1 = \lambda y_1, \quad y'_2 = \lambda y_2.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$y_1(x) = c_1 e^{\lambda x}, \quad y_2(x) = c_2 e^{\lambda x}.$$

Tegu $\lambda > 0$. Tada $|y_1(x)| \rightarrow \infty$, $|y_2(x)| \rightarrow \infty$, kai $x \rightarrow \infty$. Jeigu $\lambda < 0$, tai $|y_1(x)| \rightarrow 0$, $|y_2(x)| \rightarrow 0$, kai $x \rightarrow \infty$. Eliminavę iš pastarųjų lygčių kintamajį x , gausime lygtį


$$y_1 = ky_2, \quad k = c_1/c_2.$$

²Iš tikruju tikrosios parabolės yra gaunamos tik tuo atveju, kai $\lambda_1/\lambda_2 = 2$.

³Iš tikruju tikrosios hiperbolės gaunamos tik tuo atveju, kai $\lambda_1/\lambda_2 = -1$.

¹Iš tikruju tikrosios parabolės gaunamos tik tuo atveju, kai $\lambda_1/\lambda_2 = 1/2$.

Taigi sistemos trajektorijos yra spinduliai, išeinantys iš koordinačių pradžios, kai $\lambda > 0$, ir įeinantys į koordinačių pradžią, kai $\lambda < 0$ (žr. 4.5 ir 4.4 pav.). Pusiausvyros taškai, pavaizduoti 4.5 ir 4.4 paveikslėliuose, vadinami *dikritiniais* (žvaigždiniiais) mazgais.



2. Matrica J néra diagonali. Tada turime sistemą

$$y'_1 = \lambda y_1 + y_2, \quad y'_2 = \lambda y_2.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$y_1(x) = (c_1 + c_2 x)e^{\lambda x}, \quad y_2(x) = c_2 e^{\lambda x}.$$


Jeigu $\lambda > 0$, tai $|y_1(x)| \rightarrow \infty$, $|y_2(x)| \rightarrow \infty$, kai $x \rightarrow \infty$. Jeigu $\lambda < 0$, tai $|y_1(x)| \rightarrow 0$, $|y_2(x)| \rightarrow 0$, kai $x \rightarrow \infty$. Eliminavę iš pastarųjų lygčių kintamajį x , gausime sistemos trajektorijų lygtį

$$y_1 = \frac{c_1}{c_2} y_2 + \frac{1}{\lambda} y_2 \ln \frac{y_2}{c_2}.$$

Išvestinė $dy_1/dy_2 \rightarrow \infty$, kai $y_2 \rightarrow 0$. Todėl visos trajektorijos liečia ašį y_1 koordinačių pradžios taške. Geometrinė vieta taškų, kuriuose trajektorijos keičia kryptį, apibrėžiama lygtimi $y'_1 = 0$. Iš pirmosios sistemos lygties gauname, kad tai yra tiesė

$$l : \lambda y_1 + y_2 = 0.$$

Fazinis sistemos portretas, kai $\lambda < 0$ ir $\lambda > 0$, pavaizduotas 4.6 ir 4.7 paveikslėliuose. Abiem atvejais pusiausvyros taškas vadinas *išsigimusiu mazgo* tašku.



Tarkime, tikrinės reikšmės yra kompleksiškai jungtinės: $\lambda = \alpha + i\beta$, $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$. Tai bus tada ir tik tada, kai $D < 0$. Šiuo atveju (4.23) sistemą galima perrašyti taip:

$$y'_1 = \alpha y_1 + \beta y_2, \quad y'_2 = -\beta y_1 + \alpha y_2.$$

Įvedę polines koordinates

$$y_1 = r \cos \theta, \quad y_2 = r \sin \theta,$$

gausime sistemą

$$r' = \alpha r, \quad \theta' = -\beta.$$

Jos sprendinys


$$r = r_0 e^{\alpha x}, \quad \theta = \theta_0 - \beta x.$$

Taigi

$$y_1 = r_0 e^{\alpha x} \cos(\theta_0 - \beta x), \quad y_2 = r_0 e^{\alpha x} \sin(\theta_0 - \beta x).$$

Jeigu $\alpha < 0$, tai $|y_1(x)| \rightarrow 0$, $|y_2(x)| \rightarrow 0$, kai $x \rightarrow \infty$. Jeigu $\alpha > 0$, tai $|y_1(x)| \rightarrow \infty$, $|y_2(x)| \rightarrow \infty$, kai $x \rightarrow \infty$. Jeigu $\alpha = 0$, tai visos trajektorijos yra $2\pi/\beta$ periodinės funkcijos.

Tarkime $\alpha = 0$, t.y. tikrinė reikšmė λ yra gryna menama (tai bus tada ir tik tada, kai $\text{Sp } A = 0$). Šiuo atveju trajektorijos yra koncentriški apskritimai su centru koordinačių pradžioje (žr. 4.8 pav.). Pusiausvyros taškas, pavaizduotas 4.8 paveikslėlyje, vadinamas *centro* tašku. Tegu $\alpha \neq 0$. Tada trajektorijos yra spiralės. Kai $x \rightarrow \infty$ ir $\alpha < 0$ ($\Leftrightarrow \text{Sp } A < 0$), fasinis taškas juda spirale, artėdamas prie koordinačių pradžios (žr. 4.9 pav.), o kai $\alpha > 0$ ($\Leftrightarrow \text{Sp } A > 0$), fasinis taškas juda spirale, toldamas nuo koordinačių pradžios į begalybę (žr. 4.10 pav.). Pusiausvyros taškas, pavaizduotas 4.9, 4.10 paveikslėliuose, vadinamas *židinio* tašku. Visais atvejais judėjimą prieš ar pagal laikrodžio rodyklę, nusako koeficiente β ženklas.



4.8 pav.

4.9 pav.

4.10 pav.

Tarkime $\det J = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0$. Jeigu $\lambda_1 = 0$, o $\lambda_2 \neq 0$, tai (4.23) sistemą galima perrašyti taip:

$$y'_1 = 0, \quad y'_2 = \lambda_2 y_2.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$y_1(x) = C_1, \quad y_2(x) = C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Iš čia išplaukia, kad bet kuris taškas, gulintis y_1 ašyje, yra pusiausvyros taškas. Kai $\lambda_2 > 0$ ($\lambda_2 < 0$), trajektorijos yra iš y_1 ašies išeinantys (jeinantys) spin-duliai, lygiagretūs y_2 ašiai. Fazinis sistemos portretas, kai $\lambda_2 > 0$ ir $\lambda_2 < 0$, pavaizduotas 4.11 ir 4.12 paveikslėliuose.


Jeigu $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ ir matrica J nėra nulinė, tai (4.23) sistemą (žr. (4.21) formulę) galima perrašyti taip:

$$y'_1 = y_2, \quad y'_2 = 0.$$


Jos bendrasis sprendinys

$$y_1(x) = C_2 x, \quad y_2(x) = C_2.$$

Iš čia išplaukia, kad bet kuris taškas, gulintis y_1 ašyje, yra pusiausvyros taškas, o trajektorijos yra tiesės, lygiagrečios y_1 ašiai. Fazinis sistemos portretas pavaizduotas 4.13 paveikslėlyje.



Kanoninės sistemos $y' = Jy$ pusiausvyros taško charakteris priklauso nuo Žordano matricos J tikrinių reikšmių. Tiksliau, nuo charakteristinio polinomo koeficientų $\text{Sp } J$ ir $\det J$. Kadangi panašių matricų charakteristiniai polinomai sutampa, tai $\text{Sp } J = \text{Sp } A$, $\det J = \det A$. Todėl tiesinių sistemų $y' = Ay$ pusiausvyros taškus galima klasifikuoti lygiai taip pat kaip ir jas atitinkančių kanoninių sistemų pusiausvyros taškus. Pavyzdžiu, jeigu kokios nors kanoninės sistemos $y' = Jy$ pusiausvyros taškas yra židinys, tai visų jų atitinkančių tiesinių sistemų pusiausvyros taškai taip pat yra židiniai.



Kiekvieną fiksuotą reikšmių $\text{Sp } A$ ir $\det A$ porą atitinka charakteristinis polinomas

$$\lambda^2 - (\text{Sp } A)\lambda + \det A = 0.$$

Kadangi

$$\text{Sp } A = \text{Sp } J = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \det A = \det J = \lambda_1 \cdot \lambda_2,$$

tai šis charakteristinis polinomas vienareikšmiškai apibrėžia kanoninę sistemą $y' = Jy$ bei jos pusiausvyros tašką. Kartu yra apibrėžiamas ir su šia sistema susijusios tiesinės sistemos $y' = Ay$ pusiausvyros taškas. Taigi kiekvieną reikšmių $\text{Sp } A$, $\det A$ porą atitinka tam tikras tiesinės sistemos $y' = Ay$ pusiausvyros taškas. Ši atitinkamybė geometriškai pavaizduota 4.14 paveikslėlyje

Tegu Q yra neišsigimus matrica, kurios pagalba matrica A suvedama į Žordanovo pavidalą J . Tada transformacija $y = Qz$ deformuoja kanoninės sistemos $z' = Jz$ fazinių portretų į tiesinės sistemos $y' = Ay$ fazinių portretų. Kadangi tokia transformacija yra tiesinė ir tolydi, tai trajektorijų kokybinis vaizdas išlieka tokš pats. Jos gali būti tik kiek ištemptos (suspaustos) ir pasuktos apie koordinačių pradžią. Pavyzdžiu, sistema

$$y'_1 = \frac{5}{3}y_1 - \frac{4}{3}y_2, \quad y'_2 = \frac{4}{3}y_1 - \frac{5}{3}y_2$$

tiesinės transformacijos

$$y_1 = 2z_1 + z_2, \quad y_2 = z_1 + 2z_2$$

pagalba suvedama į kanoninį pavidalą

$$z'_1 = z_1, \quad z'_2 = -z_2.$$

Šiuo atveju Žordanovo matricos tikrinės reikšmės $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$. Todėl pusiausvyros taškas yra balno taškas. Kanoninės sistemos bendrasis sprendinys

$$z_1 = c_1 e^x, \quad z_2 = c_2 e^{-x}.$$

Eliminavę nepriklausomą kintamąjį x gauname, kad fazinės trajektorijos yra hiperbolės

$$z_1 z_2 = c, \quad c = c_1 c_2.$$


Fazinis sitemos portretas pavaizduotas 4.15 paveikslėlyje. Grįžę prie kintamųjų y_1, y_2 , gausime

$$y_1 = 2c_1 e^x + c_2 e^{-x}, \quad y_2 = c_1 e^x + 2c_2 e^{-x}.$$

Iš šių lygčių eliminavę kintamąjį x , gausime nagrinėjamos sistemos trajektorijų lygtį

$$(y_2 - 2y_1)(y_1 - 2y_2) = c;$$

čia $c = 9c_1 c_2$. Taigi nagrinėjamos sistemos trajektorijos yra hiperbolės. Jų fazinis portretas pavaizduotas 4.16 paveikslėlyje.



4.15 pav.

4.16 pav.

5 SKYRIUS

Autonominės sistemos

5.1 AUTONOMINĖS LYGTYS TIESĖJE

Nagrinėjant autonomines lygtys nepriklausomos kintamasis dažniausiai yra laikas. Todėl šiame skyriuje nepriklausomą kintamąjį žymėsime raide t , o ieškomą funkciją raide x . Lygtys, kurių dešinioji pusė tiesiogiai nepriklauso nuo laiko t , t.y.

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in (a, b) \subset \mathbb{R} \quad (5.1)$$

vadinamos *autonominėmis*. Jų sprendinio kitimo greitis priklauso tik nuo paties sprendinio. Kitais žodžiais tariant, tokią lygčių sprendinys pats valdo savo keitimąsi.


Priminsime, kad autonominės lygtys išskiria iš kitų viena svarbia savybe. Jeigu $x = \varphi(t)$, $t \in (a, b)$ yra (5.1) lygties sprendinys, tai $x = \psi(t) = \varphi(t+c)$, $t \in (a-c, b-c)$, $c \in \mathbb{R}$, taip pat yra (5.1) lygties sprendinys.

Išvadai. Tegu $x = \varphi(t)$ yra (5.1) lygties sprendinys, apibrėžtas $\forall t \in \mathbb{R}$ ir I – šio sprendinio reikšmių sritis. Be to, tegu per kiekvieną juostos $\Pi = \mathbb{R} \times I$ tašką eina tik viena (5.1) lygties integralinė kreivė. Tada bet kurią kitą šios lygties integralinę kreivę, esančią juostoje Π , galima apibrėžti lygtimi $x = \varphi(t+c)$, $c \in \mathbb{R}$. Taigi integralinės kreivės juostoje Π gaunamos viena iš kitos poslinkiu t ašies kryptimi.

Pavyzdys. Lygtis

$$\dot{x} = x^2$$

turi trivialų sprendinį $x(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$ ir netrivialius sprendinius $x = (c-t)^{-1}$, kai $t > c$ bei $x = (c-t)^{-1}$, kai $t < c$. Pastaruosius sprendinius atitinkančios integralinės kreivės yra hiperbolės (žr. 5.1 pav.).



5.1 pav.

Integralinės kreivės dalina plokštumą \mathbb{R}^2 į dvi pusplokštumas $x > 0$ ir $x < 0$. Pusplokštumėje $x > 0$ bet kurią integralinę kreivę galima gauti paslinkus

viršutinę hiperbolės $x = -t^{-1}, t < 0$ šaką t ašies kryptimi. Analogiškai pusplokštumėje $x < 0$ bet kurią integralinę kreivę galima gauti paslinkus apatinę hiperbolės $x = -t^{-1}, t > 0$ šaką t ašies kryptimi.

Integralinių kreivių šeimų, kurios gaunamos viena iš kitos poslinkiu t ašies kryptimi, kokybinį vaizdą nusako kiekvienas individualus sprendinys. Savo ruožtu kiekvieno tokio sprendinio kokybinį vaizdą apibrėžia funkcija f . Jeigu kokiame nors taške $x = c$ funkcija $f(c) = 0$, tai funkcija

$$\varphi(t) = c, \quad t \in (-\infty, \infty)$$


yra (5.1) lygties sprendinys. Toks sprendinys vadinamas *stacionariuoju* sprendiniu, o taškas c -*pusiausvyros* tašku. Jeigu $f(x) \neq 0$, t.y. $f(x) > 0$, arba $f(x) < 0$, tai kiekvienas (5.1) lygties sprendinys yra arba didėjanti, arba mažėjanti funkcija. Tokias sprendinių savybes patogiau vaizduoti x ašyje negu (t, x) plokštumoje. Pavyzdžiui taškas $x = 0$ yra lygties

$$\dot{x} = x$$


pusiausvyros taškas. Kai $x > 0$, visi šios lygties sprendiniai yra didėjančios, o kai $x < 0$ – mažėjančios funkcijos. Integralinių kreivių kokybinis vaizdas (t, x) plokštumoje ir x ašyje pavaizduotas 5.2 paveikslėlyje. Lygties

$$\dot{x} = x^2 - 1$$

pusiausvyros taškai $x = \pm 1$. Kai $x > 1$ arba $x < -1$, visi šios lygties sprendiniai yra didėjančios, o kai $-1 < x < 1$ – mažėjančios funkcijos. Integralinių kreivių kokybinis vaizdas (t, x) ir x ašyje pavaizduotas 5.3 paveikslėlyje.




5.2 pav.



5.3 pav.




Geometrinis sprendinių kokybinis vaizdas x ašyje vadinamas *faziniu portretu*, x ašis – *fazine* ašimi, o jos taškai – *faziniai* taškais. Jeigu sprendinys $x = \varphi(t)$ nėra pusiausvyros taškas, tai φ yra arba didėjanti, arba mažėjanti funkcija. Todėl jeigu pusiausvyros taškų yra baigtinis skaičius, tai juos atitinkančių skirtinį fazinių portretų taip pat yra tik baigtinis skaičius. Čia, sakydami "skirtingi", turime omenyje, kad jie skiriiasi sritimis, kuriose sprendiniai didėja arba mažėja.

Pavyzdžiui lygties $\dot{x} = x^2$ fazinis portretas, pavaizduotas 5.4 paveikslėlyje



5.4 pav.

skiriasi nuo lygties $\dot{x} = x$ fazinio portreto pavaizduoto 5.2 paveikslėlyje. Aki-
vaizdu, kad vieno pusiausvyros taško atveju yra galimi tik keturi skirtini faziiniai
portretai (žr. 5.5 paveikslėli).



5.5 pav.

Pusiausvyros taškas a vadinamas *atraktoriumi*, taškai b ir c – *šuntu*, o taškas d – *repeleriu*.

A p i b r ė ž i m a s . Sakysime, skirtinges diferencialinės lygtys yra *kokybiš-
kai ekvivalenčios*, jeigu jos turi tą patį fazių portretą, t.y. turi vienodą skaičių
ta pačia tvarka išsidėsiusiu pusiausvyros taškų.


Pavyzdžiui, lygtys:

$$\dot{x} = x, \quad \dot{x} = x^3$$

yra kokybiškai ekvivalenčios. Jos turi vieną pusiausvyros tašką – repelerį. Lyg-
tys:

$$\dot{x} = (x+2)(x+1), \quad \dot{x} = x^2 - 1$$

taip pat yra kokybiškai ekvivalenčios. Jos turi po du pusiausvyros taškus.
Vienas iš jų yra atraktorius, o kitas – repeleris. Be to, atraktorių atitinka
mažesnioji reikšmę (žr. 5.6 pav.).





5.6 pav.

Lygtys:

$$\dot{x} = -(x+2)(x+1), \quad \dot{x} = x^2 - 1$$

néra kokybiškai ekvivalenčios. Jos turi po du pusiausvyros taškus: atraktorių ir
repelerį. Tačiau jie yra išsidėstę priešinga tvarka (žr. 5.7 pav.).



5.7 pav.

Diferencialinės lygtys gali turėti be galo daug pusiausvyros taškų (pvz. lygtis $\dot{x} = \sin x$). Todėl skirtinges fazinių portretų taip pat gali būti be galo daug.
Tačiau, bet kuris faziinis portretas gali turėti ne daugiau kaip keturis skirtinges
pusiausvyros taškus.

5.2 AUTONOMINĖS SISTEMOS PLOKŠTUMOJE

Autonominę diferencialinių lygčių sistemą plokštumoje \mathbb{R}^2 galima užrašyti vektoriniu pavidalu

$$\dot{x} = f(x); \quad (5.2)$$

čia $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, $f = (f_1, f_2)$. Tegu $x = \varphi(t)$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ yra šios sistemos sprendinys. Tada fazinėje plokštumoje \mathbb{R}^2 jis apibrėžia kreivę. Jeigu ši kreivė nėra taškas, tai jai galima priskirti apėjimo kryptį, kai laikas t auga. Priminsime, kad kreivė, kartu su jos apėjimo kryptimi, vadinama *trajektorija*.

Bendru atveju (5.2) sistemos sprendiniai priklauso nuo dviejų laisvų konstantų. Todėl fazinėje plokštumoje \mathbb{R}^2 šie sprendiniai apibrėžia dviparametrinę kreivią (trajektoriją) šeimą. Norint gauti kokybinį (5.2) sistemos trajektoriją vaizdą, reikia žinoti kaip kinta fazinis taškas x fazinėje plokštumoje \mathbb{R}^2 , kai laikas t auga. Taigi (5.2) sistemos fazinis portretas yra dvimatis, o jos kokybinį vaizdą nusako kreivią šeima kartu su jų apėjimo kryptimi.

Kokybinį (5.2) sistemos tyrimą plokštumoje \mathbb{R}^2 pradėsime nuo šios sistemos pusiausvyros taškų. Taškas $c = (c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$ yra (5.2) sistemos *pusiausvyros* taškas, jeigu $f(c) = 0$. Pusiausvyros tašką c atitinka *stacionarusis* (5.2) sistemos sprendinys $\varphi(t) = c$, $t \in \mathbb{R}$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$.

Išsiaiškinsime (5.2) sistemos trajektorijų galimą elgesį pusiausvyros taško aplinkoje. Tuo tikslu išnagrinėsime keletą paprasčiausių sistemų su vienu pusiausvyros tašku.

1 P a v y z d y s . Sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = -x_2 \quad (5.3)$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$ ir išsiskaido į dvi lygtis, kurių sprendiniai

$$x_1(t) = c_1 e^{-t}, \quad x_2(t) = c_2 e^{-t}, \quad t \in (-\infty, \infty).$$


Iš šių formulų eliminavę kintamąjį t gausime, kad sprendiniai x_1, x_2 tenkina lygtį

$$x_1 = kx_2, \quad k = c_1/c_2.$$

Todėl galime tvirtinti, kad kiekviena (5.3) sistemos trajektorija yra kokioje nors tiesėje, einančioje per koordinačių pradžią. Be to, kai $t \rightarrow \infty$,

$$|x_1(t)| \rightarrow 0, \quad |x_2(t)| \rightarrow 0.$$

Taigi kiekvienas (5.3) sistemos fazinis taškas artėja prie koordinačių pradžios taško tiese $x_1 = kx_2$, kai $t \rightarrow \infty$. Fazinis (5.2) sistemos portretas pavaizduotas 5.8 paveikslėlyje.



2 Pav yzdy s. Sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = -2x_2 \quad (5.4)$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$ ir išsiskaido į dvi lygtis, kurių sprendiniai

$$x_1(t) = c_1 e^{-t}, \quad x_2(t) = c_2 e^{-2t}, \quad t \in (-\infty, \infty).$$

Iš šių formulų eliminavę kintamąjį t , gausime, kad sprendiniai x_1, x_2 tenkina lygtį

$$x_2 = kx_1^2, \quad k = c_2/c_1^2.$$

Be to, kai $t \rightarrow \infty$,

$$|x_1(t)| \rightarrow 0, \quad |x_2(t)| \rightarrow 0.$$

Taigi kiekvienas (5.4) sistemos fazinis taškas juda parabole $x_2 = kx_1^2$ ir artėja prie koordinacijų pradžios, kai $t \rightarrow \infty$. Fazinis (5.4) sistemos portretas pavaizduotas 5.9 paveikslėlyje.

3 Pav yzdy s. Sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad \dot{x}_2 = x_2 \quad (5.5)$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$ ir išsiskaido į dvi lygtis, kurių sprendiniai

$$x_1(t) = c_1 e^{-t}, \quad x_2(t) = c_2 e^t, \quad t \in (-\infty, \infty).$$


Iš šių formulų eliminavę kintamąjį t , gausime, kad sprendiniai x_1, x_2 tenkina lygtį

$$x_1 x_2 = k, \quad k = c_1 c_2.$$

Be to, kai $t \rightarrow \infty$,

$$|x_1(t)| \rightarrow 0, \quad |x_2(t)| \rightarrow \infty.$$

Taigi kiekvienas (5.5) sistemos fazinis taškas juda hiperbole $x_1 x_2 = k$ ir artėja į begalybę, kai $t \rightarrow \infty$. Fazinis (5.5) sistemos portretas pavaizduotas 5.10 paveikslėlyje.



5.10 pav.

5.11 pav.

4 Pav yzdys. Sistema

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 \quad (5.6)$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$. Apibrėžkime polines koordinates

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi.$$

Naujose koordinatėse gausime sistemą

$$\dot{r} = 0, \quad \dot{\varphi} = -1,$$

kurios sprendiniai

$$r = c_1, \quad \varphi = -t + c_2.$$

Grįžę prie senų kintamujų x_1, x_2 , rasime (5.6) sistemos sprendinius

$$x_1(t) = c_1 \cos(-t + c_2), \quad x_2(t) = c_1 \sin(-t + c_2), \quad t \in (-\infty, \infty).$$

Iš šių formulų eliminavę kintamąjį t , gausime, kad sprendiniai x_1, x_2 tenkina lygtį

$$x_1^2 + x_2^2 = c^2, \quad c = c_1.$$

Iš (5.6) lygties išplaukia, kad pusplokštumėje $x_2 > 0$ sprendinys x_1 didėja, o pusplokštumėje $x_2 < 0$ jis mažėja. Be to, pusplokštumėje $x_1 > 0$ sprendinys x_2 mažėja, o pusplokštumėje $x_1 < 0$ jis didėja. Taigi (5.6) sistemos trajektorijos yra koncentriniai apskritimai su centru pusiausvyros taške $(0, 0)$ ir apėjimo kryptimi pagal laikrodžio rodyklę, kai laikas t didėja. Fazinis (5.6) sistemos portretas pavaizduotas 5.11 paveikslėlyje.

5 Pav yzdys. Sistema

$$\dot{x}_1 = x_1, \quad \dot{x}_2 = x_1 + x_2 \quad (5.7)$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$ ir sprendinius

$$x_1(t) = c_1 e^t, \quad x_2(t) = e^t(c_1 t + c_2), \quad t \in (-\infty, \infty).$$

Eliminavę kintamąjį t , gausime, kad sprendiniai x_1, x_2 tenkina lygtį

$$x_2 = x_1(\ln x_1/c_1 + c_2/c_1).$$

Antrosios eilės išvestinė $d^2x_2/dx_1^2 = 1/x_1$. Todėl visos trajektorijos yra iškilos i apăčią, kai $x_1 > 0$ ir iškilos į viršų, kai $x_1 < 0$.


Tegu $c_1 > 0$. Tada sprendinys x_1 didėja nuo 0 iki ∞ , kai t kinta nuo $-\infty$ iki $+\infty$. Sprendinys $x_2 \rightarrow +\infty$, kai $t \rightarrow +\infty$, ir $x_2 \rightarrow -0$, kai $t \rightarrow -\infty$. Kai $c_1 = 0$, turime sprendinį

$$x_1(t) = 0, \quad x_2(t) = c_2 e^t, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

Kai $c_1 < 0$, kiekviena sistemos trajektorija yra simetrinė koordinačių pradžios taško atžvilgiu vienai iš trajektorijų, atitinkančių atvejį $c_1 > 0$. Tuo lengvai galima įsitikinti ir iš pačios sistemos. Reikia tik pastebėti, kad ji yra invariantiška keitinio $x_1 \rightarrow -x_1$, $x_2 \rightarrow -x_2$ atžvilgiu. Be to, iš pačios sistemos išplaukia, kad

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &> 0, & \text{kai } x_1 > 0, \\ \dot{x}_1 &< 0, & \text{kai } x_1 < 0, \\ \dot{x}_2 &> 0, & \text{kai } x_1 + x_2 > 0, \\ \dot{x}_2 &< 0, & \text{kai } x_1 + x_2 < 0, \\ \dot{x}_2 &= 0, & \text{kai } x_1 + x_2 = 0. \end{aligned}$$

Fazinis (5.7) sistemos portretas pavaizduotas 5.12 paveikslėlyje.



5.12 pav.

5.13 pav.

6 Pav y z d y s. Sistema

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1 \tag{5.8}$$

turi pusiausvyros tašką $(0, 0)$. Padalinę antrają šios sistemos lygtį iš pirmosios, gausime paprastąjį diferencialinį lygtį

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{x_1}{x_2}, \quad x_2 \neq 0$$

kintamujų x_1, x_2 atžvilgiu. Šios lygties sprendiniai yra hiperbolės

$$x_2^2 - x_1^2 = c.$$

Jų asymptotės yra tiesės $x_1 + x_2 = 0$ ir $x_1 - x_2 = 0$. Hiperbolų apėjimo kryptį galima nustatyti iš (5.8) lygčių. Pavyzdžiu, $\dot{x}_2 > 0$, kai $x_1 > 0$, $\dot{x}_1 > 0$, kai $x_2 > 0$, t.y. pusplokštumėje $x_1 > 0$ sprendinys x_2 didėja, o pusplokštumėje $x_2 > 0$ didėja sprendinys x_1 . Fazinis (5.8) sistemos portretas pavaizduotas 5.13 paveikslėlyje.

Norint nubrėžti (5.2) sistemos trajektorijų kokybinį vaizdą, nevisada būtina žinoti jos sprendinius apibrėžiančias formules. Tai galima padaryti nesprendžiant pačios sistemos. Šiuo atveju reikia pasinaudoti izoklinių metodu.

Tarkime, funkcija f yra apibrėžta srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Kiekviename taške $x \in \Omega$ yra apibrėžtas vektorius \dot{x} . Sių vektorių visuma sudaro krypčių lauką. Priminsime, kad izoklinė yra geometrinė vieta taškų, kuriose krypčių laukas yra pastovus, t.y.

$$\frac{dx_2}{dx_1} = k = \text{const.}$$

Ypatingai įdomūs tie izoklinių taškai, kuriose dx_2/dx_1 lygus nuliui arba be galybei, t.y. izoklinės, kuriose $\dot{x}_2 = 0$ arba $\dot{x}_1 = 0$.

7 Pavyzdys. Sistemos

$$\dot{x}_1 = x_2^2, \quad \dot{x}_2 = x_1 \quad (5.9)$$

vienintelis pusiausvyros taškas yra koordinačių pradžioje. Izoklinės yra apibrėžiamos lygtimi

$$\frac{x_1}{x_2^2} = k.$$

Kai $x_2 = 0$, turime $k = \infty$. Kai $x_1 = 0$, turime $k = 0$. Kitoms k reikšmėms izoklinės yra parabolės $x_1 = kx_2^2$. Pavyzdžiu,

$$\begin{aligned} k = 1/2, & \text{ parabolėje } x_1 = x_2^2/2, \\ k = 1, & \text{ parabolėje } x_1 = x_2^2, \\ k = 2, & \text{ parabolėje } x_1 = 2x_2^2, \\ k = -1/2, & \text{ parabolėje } x_1 = -x_2^2/2, \\ k = -1, & \text{ parabolėje } x_1 = -x_2^2, \\ k = -2, & \text{ parabolėje } x_1 = -2x_2^2. \end{aligned}$$

Trajektorijų apėjimo kryptį nusako sistemos lygčių dešiniosios pusės. Iš pirmosios lygties išplaukia, kad x_1 didėja, kai t kinta nuo $-\infty$ iki ∞ . Iš antrosios lygties gauname, kad x_2 didėja, kai $x_1 > 0$ ir mažėja, kai $x_1 < 0$.


Padalinę antrają šios sistemos lygtį iš pirmosios, gausime paprastąją diferencialinę lygtį

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{x_1}{x_2^2}, \quad x_2 \neq 0$$


kintamujų x_1, x_2 atžvilgiu. Šios lygties sprendiniai yra apibrėžiami formule

$$x_2^3 - 3x_1^2 = c.$$

Kai $c = 0$, gauname trajektoriją $x_2^3 - 3x_1^2 = 0$, einančią per koordinacių pradžią. Trajektorijų fazinis portretas pavaizduotas 5.14 paveikslėlyje.



5.14 pav.



5.15 pav.

8 Pavyzdys. Sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1 x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1^2 + x_2^2 \quad (5.10)$$

turi vienintelį pusiausvyros tašką $(0, 0)$. Jos izoklinės apibrėžiamos lygtimi

$$-\frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = k.$$

Iš šios lygties išplaukia, kad $k \geq 2$ ir izoklinės yra tiesės

$$x_2 = \alpha x_1;$$

čia α yra randamas iš lygties

$$-\frac{1 + \alpha^2}{\alpha} = k.$$

Kai $\alpha = 0$, turime $k = \pm\infty$. Todėl visos trajektorijos kerta statmenai x_1 aši.
Kai $\alpha \rightarrow \pm\infty$, $k \rightarrow \mp\infty$. Kai $x_1 = 0$, turime trajektoriją, apibrėžtą lygtimi $\dot{x}_2 = x_2^2$. Kitoms k reikšmėms izoklinės yra tiesės $x_2 = \alpha x_1$. Pavyzdžiuui,

$$\begin{aligned} k = 5/2, & \text{ tiesės } x_2 = -2x_1, x_2 = -x_1/2, \\ k = 2, & \text{ tiesėj } x_2 = -x_1, \\ k = -5/2, & \text{ tiesės } x_2 = 2x_1, x_2 = x_1/2, \\ k = -2, & \text{ tiesė } x_2 = x_1. \end{aligned}$$

Trajektorijų apejimo kryptį nusako lygčių sistemos dešiniosios pusės. Iš antroiosios lygties išplaukia, kad x_2 didėja, kai x kinta nuo $-\infty$ iki ∞ . Iš pirmosios lygties gauname, kad x_1 didėja, kai $x_1 x_2 < 0$ ir mažėja, kai $x_1 x_2 > 0$. Fazinis (5.10) sistemos portretas pavaizduotas 5.15 paveikslėlyje

9 Pavyzdys. Nubrėžti sistemos

$$\dot{x}_1 = x_1^2, \quad \dot{x}_2 = x_2(2x_1 - x_2) \quad (5.11)$$

trajektorijų kokybinė vaizdą. Nagrinėjamu atveju

$$f_1(x) = x_1^2, \quad f_2(x) = x_2(2x_1 - x_2).$$

Todėl lygtis $f(x) = 0$ turi tik trivialų sprendinį $x = (0, 0)$. Kartu galime tvirtinti, kad vienintelis (5.11) sistemos pusiausvyros taškas yra koordinačių pradžioje. Be to, $f(x) = f(-x)$. Iš čia išplaukia, kad visos trajektorijos yra invariantinės keitinio $x \rightarrow -x$ atžvilgiu. Atkreipsime dėmesį, kad izoklinė $\dot{x}_1 = 0$ sutampa su x_2 ašimi. Jos taškuose $\dot{x}_2 = -x_2^2$. Todėl egzistuoja trajektorija, einanti per šią ašį. Tiksliau ji įeina į koordinačių pradžią, kai $x_2 > 0$ ir išeina iš jos, kai $x_2 < 0$. Kai $x_1 \neq 0$, izoklinių lygtį galima užrašyti taip:

$$\frac{x_2(2x_1 - x_2)}{x_1^2} = k \iff x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 = kx_1^2.$$

Iš jos randame

$$x_1^2(1 - k) = (x_1 - x_2)^2.$$

Taigi $k \leq 1$, o izoklinės yra apibrėžiamos lygtimi

$$x_2 = x_1(1 \pm \sqrt{1 - k}).$$

Kai $k = 1$, izoklinė yra tiesė $x_2 = x_1$. Per šią tiesę einančių trajektorijų kryptis nusako lygtys $\dot{x}_1 = x_1^2$, $\dot{x}_2 = x_2^2$. Iš šių lygčių išplaukia, kad funkcijos x_1 ir x_2 didėja, kai laikas t auga. Todėl per šią tiesę einanti trajektorija įeina į koordinačių pradžią, kai $x_1, x_2 < 0$ ir išeina iš koordinačių pradžios, kai $x_1, x_2 > 0$. Kitoms k reikšmėms izoklinė yra pora tiesių. Pavyzdžiui,

$$\begin{aligned} k = 0, \quad & \text{tiesėse } x_2 = 0 \text{ ir } x_2 = 2x_1, \\ k = 1/2, \quad & \text{tiesėse } x_2 = x_1(1 \pm \sqrt{2}/2), \\ k = 3/4, \quad & \text{tiesėse } x_2 = x_1(1 \pm 1/2), \\ k = -1, \quad & \text{tiesėse } x_2 = x_1(1 \pm \sqrt{2}), \\ k = -2, \quad & \text{tiesėse } x_2 = x_1(1 \pm \sqrt{3}), \\ k = -3, \quad & \text{tiesėse } x_2 = 3x_1 \text{ ir } x_2 = -x_1. \end{aligned}$$


Trajektorijų iškilumo į apačią (iškilumo į viršų) taškai randami iš sąlygos

$$\frac{d^2x_2}{dx_1^2} > 0 \quad \left(\frac{d^2x_2}{dx_1^2} < 0 \right).$$


Nagrinėjamu atveju $\ddot{x}_2 = x_2[(2x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_1^2]$, $\ddot{x}_1 = 2x_1^3$. Todėl

$$\frac{d^2x_2}{dx_1^2} = \frac{\ddot{x}_2\dot{x}_1 - \ddot{x}_1\dot{x}_2}{\dot{x}_1^3} = \frac{2x_2(x_1 - x_2)^2}{x_1^4};$$

Taigi pusplokštumėje $x_2 > 0$ trajektorijos yra iškilos, o pusplokštumėje $x_2 < 0$ – įgaubtos. Fazinis (5.11) sistemos trajektorijų vaizdas pavaizduotas 5.16 paveikslėlyje.



5.16 pav.



5.17 pav.

Tarkime, funkcija f yra apibrėžta ir tolydi srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Jeigu $\forall x_0 \in \Omega$ ir $\forall t_0 \in \mathbb{R}$ egzistuoja vienintelis 5.2 sistemos sprendinys $x = \varphi(t)$ toks, kad $\varphi(t_0) = x_0$, tai per kiekvieną sritys Ω tašką eina lygiai viena (5.2) sistemos trajektorija. Jeigu vienaties nėra, tai dažniausiai jos nėra kokios nors kreivės, esančios srityje Ω , taškuose. Šios kreivės taškų aplinkoje trajektorijų kokybinių vaizdą ne iš karto galima nustatyti vien tik pagal sistemos dešinę pusę.

10 Pavyzdys. Sistema

$$\dot{x}_1 = 3x_1^{2/3}, \quad \dot{x}_2 = 1 \quad (5.12)$$

pusiausvyros taškų neturi. Jos sprendiniai randami iš formuliu

$$x_1(t) = (t + c_1)^3, \quad x_2(t) = t + c_2.$$

Be to, yra dar vienas sprendinys

$$x_1(t) \equiv 0, \quad x_2(t) = t + c_2.$$

Imkime šiose formulėse $c_2 = 0$, $c_1 = -c$. Abiem atvejais taškas

$$(x_1(c), x_2(c)) = (0, c).$$

Vadinasi taškas $(0, c)$ guli ne mažiau kaip dviejose skirtingose trajektorijose. Eliminavę iš šių formuliu kintamajų t , gausime, kad (5.12) sistemos trajektorijos yra apibrėžiamos lygtimi:

$$x_1 = (x_2 + c)^3, \quad x_1 = 0;$$

čia $c = c_1 - c_2$. Taigi trajektorijos yra kubinės parabolės, liečiančios ašį x_2 . Jų apėjimo kryptį lengvai galima nustatyti iš (5.12) sistemos dešinės pusės. Fazinis sistemos portretas pavaizduotas 5.17 paveikslėlyje.

Toliau nagrinėsime tik tokias sistemas, kurios tenkina vienaties sąlygą. Priminsime, kad ši sąlyga yra patenkinta, jeigu funkcija f yra diferencijuojama.

Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad iš trajektorijų sudarytų skirtingų geometrinių konfigūracijų gali būti be galio daug. Kartu galime tvirtinti, kad skirtingų

pusiausvyros taškų tipų taip pat gali būti be galio daug. Tiesa, čia, kaip ir 5.1 skyrelyje, reikia susitarti, ką reiškia žodis "skirtingi". Priklausomai nuo nagninėjamų sistemų bei keliamų reikalavimų galima pasirinkti įvairius kriterijus.

Pavyzdžiu, galime nekreipti dėmesio į trajektorijų, jeinančių į pusiausvyros tašką, formą. Tiksliau, tegu a yra sistemos $\dot{x} = f(x)$, o b sistemos $\dot{x} = g(x)$ pusiausvyros taškai. Be to, tegu sistemos $\dot{x} = f(x)$ visos trajektorijos sueina į tašką a , o sistemos $\dot{x} = g(x)$ – į tašką b . Tada natūralu tokius nagninėjamų sistemų taškus laikyti "vienodais". Pagal šį apibrėžimą sistemos $\dot{x} = -f(x)$ pusiausvyros takas a ir sistemos $\dot{x} = g(x)$ pusiausvyros taškas b yra "skirtingi", nes sistemos $\dot{x} = -f(x)$ visos trajektorijos išeina iš taško a . Be to, galime išskirti tiesines sistemas. Kiekvieną tokią sistemą atitinka kvadratinė matrica. Šią matricą galima suvesti į žordaninę pavidalą. Pagal tai, kokie yra šios matricos žordano langeliai, galima klasifikuoti tiesinių sistemų pusiausvyros taškus.

5.3 AUTONOMINIŲ SISTEMŲ TRAJEKTORIJOS

Tarkime, funkcija $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ yra tolydi srityje Ω ir šioje srityje tenkina Lipšico sąlygą. Tada per kiekvieną tašką $x_0 \in \Omega$ eina lygiai viena autonominės sistemos

$$\dot{x} = f(x) \quad (5.13)$$

trajektorija. Kiekvieno jos taško padėtį fasinėje erdvėje nusako pradinis taškas x_0 ir laiko atkarpa $t - t_0$ (žr. 2.2 skyrelį), t.y. (5.13) sistemos sprendinj $x = x(t, t_0, x_0)$ galima užrašyti tokiu pavidalu

$$x = x(t - t_0, 0, x_0) := \varphi(t - t_0, x_0).$$

Tegu $t_0 = 0$. Taškas $x_0 \in \Omega$ yra (5.13) sistemos pusiausvyros taškas, jeigu

$$\varphi(t, x_0) = x_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Akivaizdu, kad taškas x_0 yra pusiausvyros taškas tada ir tik tada, kai $f(x_0) = 0$. Tašką $x_0 \in \Omega$ vadinsime (5.13) sistemos paprastuoju tašku, jeigu $f(x_0) \neq 0$. Jeigu taškas x_0 yra paprastasis (5.13) sistemos taškas ir funkcija f yra tolydi, tai kiekvienas taškas iš pakankamai mažos taško x_0 aplinkos taip pat bus paprastasis taškas.

Tegu $x = \varphi(t)$ yra (5.13) sistemos sprendinys, apibrėžtas $\forall t \in \mathbb{R}$. Jeigu šis sprendinys yra periodinė, periodo $T > 0$ funkcija, tai jų atitinkanti trajektorija vadinama *uždara trajektorija* arba *ciklu*.

Tarkime, taškas x_0 yra paprastasis (5.13) sistemos taškas. Jeigu sprendinio $x = \varphi(t, x_0)$ trajektorija γ saveš nekerta, tai šis sprendinys yra neperiodinis. Irodysime, kad trajektorija γ kerta save tik tuo atveju, kai ji yra uždara, o ją apibrėžiantis sprendinys $x = \varphi(t, x_0)$ yra periodinis.

Tarkime, trajektorija γ kerta save. Tada egzistuoja tokie t_1, t_2 ($t_1 < t_2$), kad

$$\varphi(t_1, x_0) = \varphi(t_2, x_0).$$

Kadangi x_0 nėra pusiausvyros taškas, tai galime tarti, kad

$$\varphi(t, x_0) \neq \varphi(t_1, x_0), \quad \text{kai } t \in (t_1, t_2).$$

Irodysime, kad sprendinys $x = \varphi(t, x_0)$ yra periodinė funkcija su periodu $\omega = t_2 - t_1$. Iš tikrujų, funkcija ψ apibrėžta formule

$$\psi(t) = \varphi(t + \omega, x_0), \quad t \in [t_1 - \omega, t_2 - \omega] = [t_1 - \omega, t_1]$$

yra (5.13) sistemos sprendinys. Be to,

$$\varphi(t_1 + \omega, x_0) = \varphi(t_2, x_0) = \varphi(t_1, x_0).$$

Remiantis vienaties teorema, sprendiniai $x = \varphi(t + \omega, x_0)$ ir $x = \varphi(t, x_0)$ sutampa, kai $t \in [t_1 - \omega, t_1]$. Analogiskai galima įrodyti, kad sprendiniai $x = \varphi(t - \omega, x_0)$ ir $x = \varphi(t, x_0)$ sutampa, kai $t \in [t_2, t_2 + \omega]$. Taip samprotaudami

toliau gausime, kad sprendinį $x = \varphi(t, x_0)$ galima pratęsti į visą realių skaičių aši \mathbb{R} ir yra teisinga tapatybė

$$\varphi(t + \omega, x_0) = \varphi(t, x_0), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Taigi funkcija φ yra ω -periodinė, o ją atitinkanti trajektorija yra uždara. Kartu yra irodyta tokia teorema.

5.1 teorema. *Autonominės sistemos trajektorijos gali būti tik tokiu trijų rūšių:*

1. Pusiausvyros taškas.
2. Uždara trajektorija. Ją atitinka ω -periodinis sprendinys.
3. Nekertanti savęs trajektorija. Ją atitinka neperiodinis sprendinys.

Nagrinėjant (5.13) autonominę sistemą svarbu žinoti ar ji turi uždarų trajektorijų. Kai $n = 2$ nurodysime dvi pakankamas sąlygas garantuojančias, kad (5.13) sistema uždarų trajektorijų neturi.

5.2 teorema. *Tarkime, srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ funkcija f tenkina kurią nors vieną iš šių sąlygų:*

1. Vektorinis laukas f yra potencialus srityje Ω .
2. Vektorinio lauko divergencija $\operatorname{div} f$ turi pastovų ženklačių srityje Ω .

Tada (5.13) autonominė sistema srityje Ω neturi uždarų trajektorijų.

« Tarkime priešingai, (5.13) autonominė sistema srityje Ω turi uždara trajektoriją $\gamma \subset \Omega$. Sritį, apribota kreive γ , pažymėkime raide D . Jeigu yra patenkinta pirmoji teoremos sąlyga, tai $f_{2x_1} = f_{1x_2}$ ir

$$0 = \int_D (f_{2x_1}(x) - f_{1x_2}(x)) dx = \int_D \operatorname{div} f^*(x) dx = \int_\gamma (f^*(x), \mathbf{n}(x)) dl;$$

čia $\mathbf{n}(x)$ yra vienetinis normalės vektorius trajektorijai γ taške x , išorinis srities D atžvilgiu, o vektorius f^* turi koordinates $f_1^* = f_2$ ir $f_2^* = -f_1$. Vektorius f^* yra statmenas vektoriui f . Tačiau vektorius f yra statmenas vektoriui \mathbf{n} . Taigi vektoriai f^* ir \mathbf{n} yra lygiagretūs ir

$$\int_\gamma (f^*(x), \mathbf{n}(x)) dl \neq 0.$$

Gauta prieštara įrodo, kad (5.13) sistema negali turėti uždarų trajektorijų srityje Ω , jeigu yra patenkinta pirmoji teoremos sąlyga.

Tarkime, yra patenkinta antroji teoremos sąlyga. Tada

$$0 \neq \int_D \operatorname{div} f(x) dx = \int_{\gamma} (f(x), \mathbf{n}(x)) dl = 0,$$

nes vektoriai f ir \mathbf{n} yra statmeni. Gauta prieštara įrodo, kad (5.13) sistema negali turėti uždarų trajektorijų srityje Ω , jeigu yra patenkinta antroji teoremos sąlyga. ▷

Pavyzdys. Tegu $f(x) = Ax$, $A \in \mathbb{R}^{2,2}$. Vektorinis laukas $f(x)$ yra potencialus, jeigu matrica A yra simetrinė. Vektorinės funkcijos f divergencija yra lygi matricos A pėdsakui, t.y. $\operatorname{div} f(x) = \operatorname{Sp} A$. Todėl tiesinė sistema

$$\dot{x} = Ax$$

plokštumoje \mathbb{R}^2 neturės uždarų trajektorijų, jeigu matrica A yra simetrinė arba jos pėdsakas $\operatorname{Sp} A \neq 0$.

5.4 AUTONOMINIŲ SISTEMŲ PLOKŠTUMOJE PUSIAUSVYROS TAŠKAI

Tegu Ω yra sritis plokštumoje \mathbb{R}^2 , f – diferencijuojama srityje Ω vektorinė funkcija su komponentėmis f_1, f_2 . Nagrinėsime autonominę sistemą

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \Omega. \quad (5.14)$$

Iš teoremos apie trajektorijų ištiesinimą išplaukia, kad visos sistemos pakan-kamai mažoje paprastojo taško aplinkoje yra difeomorfiškai ekvivalentios. Tarkime, $x_0 \in \Omega$ yra (5.14) sistemos pusiausvyros taškas, t.y. $f(x_0) = 0$. Be to, tegu $x_0 = 0$. Priešingu atveju koordinacių pradžią perkeliate į tašką x_0 . Išskleidę funkciją f Teloro formule taško $x = 0$ aplinkoje, (5.14) sistemą perrašysime taip:

$$\dot{x} = Ax + q(x), \quad x \in \Omega; \quad (5.15)$$

čia $A = f_x(0) \in \mathbb{R}^{2,2}$ – pastovioji matrica su koeficientais $a_{ij} = \partial f_i(0)/\partial x_j$, q – vektorinė, tolydi taško $x = 0$ aplinkoje funkcija, tenkinanti sąlygą

$$|q(x)| \rightarrow 0, \quad \text{kai } |x| \rightarrow 0. \quad (5.16)$$

Atmetę (5.15) sistemoje narį $q(x)$, gausime (5.15) sistemos pirmajį artinį

$$\dot{x} = Ax. \quad (5.17)$$

Jeigu matricos A determinantas $\det A \neq 0$ ir funkcija f tenkina aukščiau su-formuluotas sąlygas, tai koordinacių pradžios taškas $x = 0$ yra izuoliotas (5.15) sistemos pusiausvyros taškas.

Tiesinė sistema $\dot{x} = Ax$ su $\det A \neq 0$ yra tiesiskai ekvivalenti vienai iš dešimties kanoninių sistemų (žr. 4.5 skyrelį). Jų faziniai portretai pavaizduoti 4.14 paveikslėlyje. Tiesines sistemas galima suskirstyti į keturias klases. Į pirmają klasę patenka tokios sistemas, kurių pusiausvyros taškas yra židinys arba mazgas¹ ir kiekvienas trajektorijos taškas artėja į pusiausvyros tašką, kai $t \rightarrow +\infty$. Į antrają – visos sistemas, kurių pusiausvyros taškas yra balno taškas. Į trečiąją – visos sistemas, kurių pusiausvyros taškas yra židinys, arba mazgas ir kiekvienas trajektorijos taškas tolsta nuo pusiausvyros taško, kai $t \rightarrow +\infty$. Ir į ketvirtąją – visos sistemas, kurių pusiausvyros taškas yra centro taškas. Netiesinių sistemų pusiausvyros taškus taip pat patogu suskirstyti į klases pagal tai, kaip elgiasi sistemas trajektorijos šio taško aplinkoje.

A p i b r ė ž i m a s. Sakysime, pusiausvyros taškas $x = 0$ yra (5.15) sistemas *traukos* taškas, jeigu egzistuoja toks skaičius $\delta > 0$, kad visi (5.15) sistemas sprendiniai $x = \varphi(t)$ yra apibréžti $\forall t \geq 0$ arba $\forall t \leq 0$ ir $\varphi(t) \rightarrow 0$, kai $t \rightarrow \infty$ arba $t \rightarrow -\infty$, jeigu tik $|\varphi(0)| < \delta$. Traukos tašką vadinsime *židinio* tašku, jeigu visos trajektorijos $x = \varphi(t) \neq 0$ yra spiralės. Židinio tašką vadinsime *taisyklingu židinio* tašku², jeigu kiekvienai trajektorijai, artėjančiai prie koordinacių

¹Sakydami mazgo taškas čia turime omenyje arba taisyklingą mazgą, arba paprastą mazgą, arba išsigimusį mazgą.

²Tiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta x_2, \quad \dot{x}_2 = -\beta x_1 + \alpha x_2, \quad \alpha \neq 0, \beta \neq 0$$

pradžios, kai $t \rightarrow +\infty$ (arba $t \rightarrow -\infty$), reiškinys $t^{-1}|x(t)|$ artėja prie tam tikros konstantos c ir atvirkščiai, bet kuriai konstantai c egzistuoja tokis netiesinės sistemos sprendinys $x = x(t)$, kad $t^{-1}|x(t)| \rightarrow c$, kai $t \rightarrow +\infty$ (arba $t \rightarrow -\infty$). Traukos tašką vadinsime *mazgo* tašku, jeigu visos trajektorijos $x = \varphi(t) \neq 0$ turi liestinę taške $x = 0$, t.y. egzistuoja riba

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} = \theta_0; \quad (\text{arba } t \rightarrow -\infty)$$

čia $\theta_0 \in (-\infty, \infty)$. Mazgo tašką vadinsime *taisyklingu mazgu*, jeigu kiekvienam $\theta_0 \pmod{2\pi}$ egzistuoja tokis vienintelis sprendinys $x = \varphi(t)$, kad

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} = \theta_0. \quad (\text{arba } t \rightarrow -\infty)$$

Priešingu atveju mazgo tašką vadinsime *netaisyklingu mazgu*.

A p i b r ė ž i m a s . Pusiausvyros tašką $x = 0$ vadinsime (5.15) sistemos *sukimosi* tašku, jeigu kiekvienoje jo aplinkoje yra uždara trajektorija, supanti ši tašką. Sukimosi tašką vadinsime centro tašku, jeigu kiekviena tokia trajektorija, išskyrus $x = 0$, yra uždara.

Egzistuoja pusiausvyros taškai, kurie nėra nei traukos taškai, nei sukimosi taškai ir traukos taškai, kurie nėra nei židiniai, nei mazgai. Pavyzdžiu, *balno taškas* nėra nei traukos taškas, nei sukimosi taškas. Jį galima apibrėžti kaip pusiausvyros tašką į kurį artėja tik baigtinis skaičius trajektorijų, kai $t \rightarrow \infty$ arba $t \rightarrow -\infty$.

Tiesinei sistemai $\dot{x} = Ax$, det $A \neq 0$, pusiausvyros taškas $x = 0$ yra traukos taškas tada ir tik tada, kai matricos A tikrinių reikšmių realiosios dalys yra abi teigiamos arba abi neigiamos. Pusiausvyros taškas $x = 0$ yra sukimosi taškas (centras) tada ir tik tada, kai matricos A tikrinių reikšmių realiosios dalys lygios nuliui. Netiesinei sistemai yra teisingas tokis teiginys.

5.3 teorema. Jeigu koordinačių pradžios taškas $x = 0$ yra (5.17) tiesinės sistemos traukos taškas, tai jis yra (5.15) netiesinės sistemos traukos taškas.

Pasirodo, kad analogiškas teiginys yra teisingas ir tuo atveju, kai traukos taškas yra židinys. Tiksliu yra teisinga tokia teorema.

5.4 teorema. Jeigu koordinačių pradžios taškas $x = 0$ yra (5.17) tiesinės sistemos židinio taškas, tai jis yra (5.15) netiesinės sistemos židinio taškas.

△ Taškas $x = 0$ yra (5.17) tiesinės sistemos židinio taškas, kai matricos A tikrinės reikšmės $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ yra kompleksinės ir $\alpha \neq 0$. Tarkime, matrica A turi kanoninį pavidalą, t.y.

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$ galima perrašyti taip: $\dot{r} = \alpha r$, $\dot{\varphi} = -\beta$. Išsprendę ją gausime, $r(t) = c_1 e^{\alpha t}$, $\varphi(t) = -\beta t + c_2$. Jeigu $\alpha < 0$ ir $\beta < 0$, tai $r(t) \rightarrow 0$, $\varphi(t) \rightarrow +\infty$, kai $t \rightarrow +\infty$. Be to, $\frac{\beta}{\alpha} \ln r(t) + \varphi(t) = c$, su tam tikra konstanta c . Ir atvirkščiai, bet kokiai konstantai c egzistuoja tokis nagrinėjamos tiesinės sistemos sprendinys, kad $\frac{\beta}{\alpha} \ln r(t) + \varphi(t) = c$.

(priešingu atveju, neišsigimusios tiesinės transformacijos pagalba, suvedame ją į kanoninį pavidalą). Tada (5.15) sistemą galima užrašyti taip:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + f_1(x), \\ \dot{x}_2 = -\beta x_1 + \alpha x_2 + f_2(x) \end{cases} \quad (5.18)$$

arba polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$,

$$\begin{cases} \dot{r} = \alpha r + o(r), \\ r\dot{\varphi} = -\beta r + o(r). \end{cases}$$

Jeigu $\alpha < 0$, tai iš pirmosios lygties gauname, kad $r \rightarrow 0$, $t \rightarrow +\infty$. Todėl

$$\dot{\varphi} = -\beta t + o(1),$$

kai $t \rightarrow +\infty$. Kartu galime tvirtinti, kad kiekviena (5.18) netiesinės sistemos trajektorijai, prasidedančiai pakankamai arti koordinačių pradžios,

$$\varphi(t) = -\beta t + o(t),$$

kai $t \rightarrow +\infty$. Iš čia išplaukia, kad $\varphi(t) \rightarrow \pm\infty$, kai $t \rightarrow +\infty$. Čia imame vieną iš ženklu \pm , priklausomai nuo to, koks yra β ženklas. Tačiau tai reiškia, kad bet kuri trajektorija, esanti pakankamai arti koordinačių pradžios ir nesant pusiausvyros tašku $r = 0$, yra spiralė. ▷

Šioje teoremoje židinio tašką pakeisti į mazgo tašką negalima. Pavyzdžiui, netiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1 - \frac{x_2}{\ln|x|}, \quad \dot{x}_2 = -x_2 + \frac{x_1}{\ln|x|}$$

tenkina visas skyrelio pradžioje suformuluotas sąlygas. Polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$ ją galima užrašyti taip:

$$\dot{r} = -r, \quad \dot{\varphi} = 1/\ln r, \quad r \neq 0.$$

Išsprendę pirmąją lygtį, gausime

$$r(t) = c_1 e^{-t}, \quad c_1 > 0.$$

Taigi, kai $t \rightarrow +\infty$, $r \rightarrow 0$ ir

$$\dot{\varphi} = 1/(\ln c_1 - t).$$

Šios lygties sprendinys

$$\varphi(t) = -\ln(t - \ln c_1) + c_2 \rightarrow -\infty,$$

kai $t \rightarrow +\infty$. Todėl koordinačių pradžios taškas $r = 0$ yra netiesinės sistemos židinio taškas. Tačiau ją atitinkančiai tiesinei sistemai

$$\dot{x}_1 = -x_1, \quad x_2 = -x_2,$$

koordinačių pradžios taškas yra taisyklingas mazgo taškas.

Tiesinės sistemos židinio taškas (kartu jis yra ir taisyklingas židinio taškas) nebūtinai yra netiesinės sistemos taisyklingas židinio taškas. Pavyzdžiui, netiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = -x_1 + \frac{x_1}{\ln|x|}, \quad \dot{x}_2 = -x_2 + \frac{x_2}{\ln|x|}$$

tenkina skyrelio pradžioje suformuluotas sąlygas. Polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$ ją galima užrašyti taip:

$$\dot{r} = -r + \frac{r}{\ln r}, \quad \dot{\varphi} = -1.$$

Išsprendę pirmają lygtį, gausime

$$r(t)(1 - \ln r(t)) = ce^{-t}.$$

Kadangi $r(t) \rightarrow 0$, kai $t \rightarrow +\infty$, tai $r(t)e^t \rightarrow 0$, kai $t \rightarrow +\infty$ ir nagrinėjamos netiesinės sistemos pusiausvyros taškas yra netaisyklingas židinio taškas.

Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad nurodytų skyrelio pradžioje glodumo sąlygų funkcijai q nepakanka, kad tiesinės sistemos taisyklingas židinio (mazgo) taškas būtų ją atitinkančios netiesinės sistemos taisyklingu židinio (mazgo) tašku. Tarkime, ψ yra tolydi funkcija intervale $[0, a]$, tenkinanti sąlygas:

$$|q(x)| \leq \psi(|x|); \quad \psi(r) = o(r), \text{ kai } r \rightarrow 0; \int_0^a \frac{\psi(r)}{r^2} dr < \infty. \quad (5.19)$$

Tada yra teisinga tokia teorema.

5.5 teorema. Jeigu funkcija q tenkina (5.19) sąlygas ir koordinačių pradžios taškas yra (5.17) tiesinės sistemos židinio taškas (taisyklingas mazgo taškas), tai jis yra ir netiesinės sistemos taisyklingas židinio taškas (taisyklingas mazgo taškas).

P a s t a b a . Jeigu funkcija q tenkina sąlygą

$$q(x) = O(|x|^{1+\varepsilon}),$$

kai $|x| \rightarrow 0$, tai ji tenkina ir (5.19) sąlygas. Kartu tokiai funkcijai yra teisinga pastaroji teorema.

Tarkime toliau, kad koordinačių pradžios taškas yra (5.15) tiesinės sistemos centro taškas. Iš pradžių išnagrinėsime kelis pavyzdžius.

1. Netiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = -x_2 - x_1|x|, \quad \dot{x}_2 = x_1 - x_2|x|$$

tenkina skyrelio pradžioje suformuluotas sąlygas. Polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$ ją galima užrašyti taip:

$$\dot{r} = -r^2, \quad \dot{\varphi} = 1.$$

Išsprendę šią sistemą, gausime, kad trajektorija, laiko momentu $t = 0$ einanti per tašką (r_0, t_0) , $r_0 \neq 0$, apibrėžiama formulė

$$r(t) = (t + r_0^{-1})^{-1}, \quad \varphi(t) = t + \varphi_0.$$

Todėl $r(t) \rightarrow 0$, kai $t \rightarrow +\infty$. Taigi koordinačių pradžios taškas yra netiesinės sistemos židinio taškas. Tačiau ją atitinkančiai tiesinei sistemai

$$\dot{x}_1 = -x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1$$

koordinačių pradžios taškas yra centro taškas.

2. Netiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = -x_2 + x_1|x|^2 \sin(\pi/|x|), \quad \dot{x}_2 = x_1 + x_2|x|^2 \sin(\pi/|x|)$$

tenkina skyrelio pradžioje suformuluotas salygas. Be to, šios sistemos dešinės pusės turi tolydžias dalines išvestines. Todėl tokia sistema tenkina vienaties teoremos sąlygas, t.y. $\forall x_0 \in \mathbb{R}^2$, $x_0 \neq 0$, egzistuoja vienintelis sprendinys, tenkinantis sąlygą $x(0) = x_0$.

Polinėse koordinatėse $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$ ją galima užrašyti taip:

$$\dot{r} = r^3 \sin(\pi/r), \quad \dot{\varphi} = 1.$$

Iš pirmos lygties gauname, kad apskritimai $r(t) = 1/k$, $k = 1, 2, \dots$ yra uždaros šios sistemos trajektorijos. Be to,

$$\begin{aligned} \dot{r} > 0, \quad &\text{kai } r > 1, \text{ arba } \frac{1}{2k+1} < r < \frac{1}{2k}, \\ \dot{r} < 0, \quad &\text{kai } \frac{1}{2k} < r < \frac{1}{2k-1}, \end{aligned}$$

$\forall k = 1, 2, \dots$ Taigi visos trajektorijos, išskyrus apskritimus $r(t) = 1/k$, nėra uždaros ir nekerta šių apskritimų. Funkcijos r ir φ , apibrėžiančios neuždaras trajektorijas, yra monotoninės. Todėl jos vyniojasi apie apskritimus $r(t) = 1/k$, kai $t \rightarrow +\infty$ (arba $t \rightarrow -\infty$) ir $r(t) \rightarrow +\infty$, kai $t \rightarrow +\infty$, jeigu $r > 1$. Todėl koordinačių pradžios taškas yra sukimosi taškas.

Taigi, jeigu koordinačių pradžios taškas tiesinei sistemai yra sukimosi (centro) taškas, tai netiesinei sistemai jis yra židinys arba sukimosi taškas. Pasirodo, kad kitokių atvejų būti negali. Tiksliau yra teisinga tokia teorema.

5.6 teorema. Tarkime, koordinačių pradžios taškas yra (5.17) tiesinės sistemos sukimosi (centro) taškas. Tada jis yra netiesinės sistemos sukimosi taškas arba židinys.

Tarkime, koordinačių pradžios taškas yra (5.17) tiesinės sistemos netaisyklingas mazgo taškas. Be to, tegu ši sistema turi kanoninį pavidalą, t.y.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

ir $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. Tada yra teisinga tokia teorema.

- 5.7 teorema.**
1. Kiekviena (5.15) netiesinės sistemos trajektorija, einančiai pakankamai arti koordinačių pradžios, artėja prie koordinačių pradžios kampu $\varphi = 0, \pi/2, \pi$, arba $3\pi/2$. Be to, egzistuoja be galio daug trajektorijų, artėjančių į koordinačių pradžią kampu $\varphi = 0$ ir π .
 2. Egzistuoja bent viena trajektorija, artėjanti į koordinačių pradžią kampu $\varphi = \pi/2$ ir kampu $\varphi = 3\pi/2$.
 3. Jeigu dalinės išvestinės q_{1x_1} ir g_{2x_1} egzistuoja ir yra tolydžios kokioje nors koordinačių pradžios taško aplinkoje, tai egzistuoja lygiai po vieną trajektoriją, artėjančią į koordinačių pradžią kampu $\varphi = \pi/2$ ir $\varphi = 3\pi/2$.

Tarkime, koordinačių pradžios taškas yra (5.17) tiesinės sistemos balno taškas. Be to, tegu ši sistema turi kanoninį pavidalą, t.y. matrica

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

ir $\lambda_1 < \lambda_2$. Tada yra teisinga tokia teorema.

5.8 teorema. Egzistuoja bent po vieną (5.15) netiesinės sistemos trajektoriją, artėjančią į koordinačių pradžią kampu $\varphi = 0$ ir kampu $\varphi = \pi$. Be to, jeigu dalinės išvestinės q_{1x_2} ir q_{2x_2} egzistuoja ir yra tolydžios kokioje nors koordinačių pradžios taško aplinkoje, tai egzistuoja lygiai po vieną trajektoriją, artėjančią į koordinačių pradžią kampu $\varphi = 0$ ir $\varphi = \pi$. Visos kitos pakankamai artimos joms trajektorijos tolsta nuo jų, kai $t \rightarrow +\infty$.

Šiuo teoremu įrodyta galima rasti [5] knygoje.

P a s t a b a. Jeigu (5.15) sistemoje matricos A determinantas lygus nuliui, tai įrodytais teiginiais pasinaudoti negalima. Pavyzdžiui, netiesinė sistema

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1^2$$

turi vienintelį pusiausvyros tašką $x_1 = 0, x_2 = 0$, o jos pirmasis artinys

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = 0$$

turi visą tiesę pusiausvyros taškų $x_2 = 0$.

A p i b r ė ž i m a s. Uždarą trajektoriją γ vadinsime *ribiniu ciklu*, jeigu kiek norima mažoje jos aplinkoje néra kitų uždarų trajektorijų.

Atkreipsime dėmesį į tai, kad ne bet kokia uždara trajektorija yra ribinis ciklas ir ne visi ribiniai ciklai elgiasi vienodai. Išskirsime tris skirtingas ribinių ciklų klasės:

1. Ribinį ciklą γ vadinsime *stabiliu*, jeigu visos pakankamai artimos jam trajektorijos viniojasi apie γ iš abiejų pusiu.
2. Ribinį ciklą γ vadinsime *nestabiliu*, jeigu visos pakankamai artimos jam trajektorijos nusivynioja nuo γ iš abiejų pusiu.

3. Ribinį ciklą γ vadinsime *pusiaustabiliu*, jeigu visos pakankamai artimos jam trajektorijos iš vienos pusės γ nusivynoja nuo jo, o iš kitos pusės ją apsivynoja.

P a v y z d y s . Nagrinėsime netiesinę autonominę sistemą

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 - x_1 \cdot |x|^2, \\ \dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2 - x_2 \cdot |x|^2, \end{cases} \quad \mu \in (-\infty, \infty).$$

Polinėse koordinatėse

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi$$

šią sistemą galima perrašyti taip:

$$\begin{cases} \dot{r} = r(\mu - r^2), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

Kiekvienai parametru $\mu \in (-\infty, \infty)$ reikšmei pastaroji sistema turi sprendinį

$$r = 0, \quad \varphi = t + c.$$

Kai $\mu = 0$, turime sprendinį

$$\frac{1}{2} r^{-2} = t + c.$$

Kai $\mu \neq 0$, šios sistemos sprendinys apibrėžiamas formule

$$\frac{1}{\mu} \ln \frac{r}{\sqrt{|r^2 - \mu|}} = t + c.$$

Be to, kai $\mu > 0$, sistema turi dar vieną sprendinį

$$r = \sqrt{\mu}.$$

Bet kuriai parametru μ reikšmei koordinačių pradžios taškas yra nagrinėjamos sistemos pusiausvyros taškas.

Tegu $\mu \leq 0$. Tada $\dot{r} < 0$, kai $r \neq 0$ ir $\dot{r} = 0$, kai $r = 0$. Šiuo atveju visos trajektorijos, išskyrus koordinačių pradžios tašką, yra spiralės ir kiekviena iš jų vyniojasi apie koordinačių pradžią, kai $t \rightarrow +\infty$.

Tegu $\mu > 0$. Tada $\dot{r} > 0$, kai $r \in (0, \sqrt{\mu})$ ir $\dot{r} < 0$, kai $r > \sqrt{\mu}$. Todėl koordinačių pradžios taškas yra nestabilus židinys bet kuriai kitai trajektorijai, esančiai skritulyje $r < \sqrt{\mu}$. Be to, visos šios trajektorijos vyniojasi apie apskritimą $r = \sqrt{\mu}$, kai $t \rightarrow +\infty$. Todėl šis apskritimas yra stabilus ribinis ciklas bet kuriai trajektorijai išskyrus pusiausvyros tašką $r = 0$.

Nagrinėjant realius uždavinius svarbiausios yra tos ribinės aibės taškų, kuriuos pritraukia trajektorijas, t.y. tokios aibės, kai bet kuri trajektorija, esanti tam tikroje traukos srityje, didėjant t artėja prie ribinės aibės. Tokios aibės vadinamos *atraktoriais*. Atraktoriais gali būti pusiausvyros taškai arba ribiniai ciklai.

P a s t a b a . Kai $n \geq 3$ autonominių sistemų ribinių aibų struktūra iki galo dar néra ištirta. Netgi néra ištirti visi galimi atraktoriai. Yra žinoma, kad be įprastų atraktorių, tokius kaip pusiausvyros taškai, ribiniai ciklai arba k -mačiai torai, egzistuoja dar taip vadinti *keisti atraktoriai*. Tai yra apréžtos, pri-traukiančios ribinės aibės, sudėtingos struktūros. Fazinės trajektorijos čia yra begalinės, niekur nesikertančios, trajektorijos. Be to, kai $t \rightarrow +\infty$ šios trajektorijos nepalieka tam tikros uždaros srities ir neartėja prie įprastų atraktorių. Keisti atraktoriai iš esmės skiriasi nuo įprastų. Kai $n \leq 2$, keisti atraktoriai neegzistuoja. Netiesinių svyravimų teorijoje tokį įprastą atraktorių kaip ribinį ciklą atitinka periodinis svyravimas, o keistą atraktorių atitinka chaotiniai auto svyravimai. Jų aprašymui naudojami terminai "determinuotas chaosas," "stochastinė dinamika" ir t.t.

6 SKYRIUS

Dalinių išvestinių lygtys

6.1 TIESINIŲ ANTROS EILĖS LYGČIŲ SU DVIEM NEPRIKLAUSOMAIS KINTAMAISIAIS SUVEDIMAS į KANONINĮ PAVIDALĄ

Tiesinę antros eilės lygtį

$$a(x, y)u_{xy} + 2b(x, y)u_{xy} + c(x, y)u_{yy} + \dots = 0 \quad (6.1)$$

su dviem nepriklausomais kintamaisiais taško (x_0, y_0) aplinkoje galima suvesti į kanoninį pavidalą. Tarkime, funkcijos a, b ir c ir jų pirmosios eilės dalinės išvestinės yra tolydžios kurioje nors taško (x_0, y_0) aplinkoje U .

Iš koeficientų prie antros eiles išvestinių sudarykime kvadratinę formą

$$\Lambda(x, y, \xi, \eta) = a(x, y)\xi^2 + 2b(x, y)\xi\eta + c(x, y)\eta^2. \quad (6.2)$$

Kiekviename fiksuotame aplinkos U taške (x, y) šią formą galima suvesti į kanoninį pavidalą. Iš tiesinės algebrros kurso yra žinoma, kad (6.2) kvadratinės formos, suvestos į kvadratų sumą, teigiamų, neigiamų ir lygių nuliui koeficientų skaičius lygus atitinkamai teigiamų, neigiamų ir lygių nuliui charakteristinio polinomo

$$\begin{vmatrix} a(x, y) - \lambda & b(x, y) \\ b(x, y) & c(x, y) - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

šaknų skaičiui. Jeigu charakteristinio polinomo šaknis pažymėsime $\lambda_1(x, y)$ ir $\lambda_2(x, y)$, tai jų sandauga

$$\lambda_1(x, y)\lambda_2(x, y) = a(x, y)c(x, y) - b^2(x, y). \quad (6.3)$$

Galimi tokie atvejai:

- Šaknys λ_1, λ_2 yra vienodų ženklų ir nelygios nuliui. Taip bus tada ir tik tada, kai

$$b^2 - ac < 0. \quad (6.4)$$

Šiuo atveju (6.1) lygtis yra vadinama *elipsine* lygtimi

- Šaknys λ_1, λ_2 turi skirtinges ženklus ir nelygios nuliui. Taip bus tada ir tik tada, kai

$$b^2 - ac > 0. \quad (6.5)$$

Šiuo atveju (6.1) lygtis yra vadinama *hiperboline* lygtimi.

3. Kuri nors iš šaknų λ_1, λ_2 lygi nuliui. Taip bus tada ir tik tada, kai

$$b^2 - ac = 0. \quad (6.6)$$

Šiuo atveju (6.1) lygtis yra vadinama *paraboline* lygtimi.

P a s t a b a. Šaknys λ_1, λ_2 vienu metu negali būti lygios nuliui. Jeigu abi šaknys yra lygios nuliui, tai lengvai galima išsitikinti, kad koeficientai a, b ir c taip pat yra lygūs nuliui. O tai prieštarauja tam, kad (6.1) lygtis yra antros eilės lygtis.

Vietoje kintamujų x, y apibrėžime naujus nepriklausomus kintamuosius

$$\xi = \xi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y).$$

Tarkime, funkcijos ξ ir η aplinkoje U yra dukart diferencijuojamos, o jakobianas

$$\begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0.$$

Tada funkcijos u išvestinės

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, & u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_{\xi\xi} \xi_{xx} + u_{\eta\eta} \eta_{xx}, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_{\xi\xi} \xi_{yy} + u_{\eta\eta} \eta_{yy}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_{\xi\xi} \xi_{xy} + u_{\eta\eta} \eta_{xy}. \end{aligned}$$

Pasinaudoję šiomis formulėmis, (6.1) lygtį perrašysime taip:

$$A(\xi, \eta)u_{\xi\xi} + 2B(\xi, \eta)u_{\xi\eta} + C(\xi, \eta)u_{\eta\eta} + \dots = 0; \quad (6.7)$$

čia koeficientai

$$A(\xi, \eta) = a\xi_x^2 + 2b\xi_x \xi_y + c\xi_y^2,$$

$$C(\xi, \eta) = a\eta_x^2 + 2b\eta_x \eta_y + c\eta_y^2,$$

$$B(\xi, \eta) = a\xi_x \eta_x + b(\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + c\xi_y \eta_y.$$

Tiesiogiai galima irodyti, kad

$$B^2 - AC = (b^2 - ac) \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix}^2. \quad (6.8)$$

Ši lygybė (dvimačiu atveju) parodo, kad neišsigimus transformacija lygties tipo nekeičia.

Funkcijas ξ ir η parinksime taip, kad (6.7) lygtis įgytų paprasčiausią pavidalą. Taip bus tada ir tik tada, kai dalis (6.7) lygties koeficientų prie antros eilės išvestinių bus lygi nuliui. Prilyginę nuliui koeficientą A , gausime lygtį

$$a\xi_x^2 + 2b\xi_x \xi_y + c\xi_y^2 = 0. \quad (6.9)$$

Šią lygtį atitinka charakteristikų lygtis

$$ay'^2 - 2by' + c = 0. \quad (6.10)$$

Išnagrinėsime tris galimus atvejus:

1. Tegu (6.1) lygtis yra hiperbolinė. Tada charakteristinė lygtis turi du skirtinges integralus

$$\varphi(x, y) = \text{const}, \quad \psi(x, y) = \text{const}.$$

Pagal priešaišą funkcijos a , b ir c yra tolydžiai diferencijuojamos taško (x_0, y_0) aplinkoje U . Iš bendrosios paprastų diferencialinių lygčių teorijos yra žinoma, kad funkcijos φ ir ψ yra dukart diferencijuojamos aplinkoje U (aplinka U iš anksto paimta pakankamai maža). Todėl naujus nepriklausomus kintamuosius ξ ir η galima apibrėžti taip:

$$\xi = \xi(x, y) = \varphi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y) = \psi(x, y).$$

Atlikus tokią transformaciją (6.7) lygyje, koeficientai A ir C bus lygiūs nuliui. Be to, lengvai galima išiti, kad tokios transformacijos jakobianas yra nelygus nuliui. Remiantis (6.8) formulę galima tvirtinti, kad koeficientas $B \neq 0$. Padaliję (6.7) lygtį iš $2B$, suvesime ją į antrajį kanoninį pavidalą

$$u_{\xi\eta} + \dots = 0. \quad (6.11)$$

Keitiniu

$$\xi = \tilde{\xi} + \tilde{\eta}, \quad \eta = \tilde{\xi} - \tilde{\eta}$$

(6.11) lygtis susiveda į pirmajį kanoninį pavidalą

$$u_{\tilde{\xi}\tilde{\xi}} - u_{\tilde{\eta}\tilde{\eta}} + \dots = 0. \quad (6.12)$$

P a s t a b a. Lygti, kurią galima suvesti į (6.11) pavidalą, kartais pasiseka suintegruoti, t.y. rasti formulę, apibrėžiančią visus lygties sprendinius.

P a v y z d y s. Rasti lygties

$$u_{xx} - u_{yy} = 0$$

bendrajį sprendinį. Tai yra hiperbolinė lygtis. Ji yra pirmojo kanoninio pavidalo. Keitiniu

$$\xi = x + y, \quad \eta = x - y$$

ši lygtis susiveda į lygtį

$$u_{\xi\eta} = 0,$$

kuri yra antrojo kanoninio pavidalo. Tegu $u_\xi = v$. Tada

$$v_\eta = 0.$$

Šios lygties bendrasis integralas yra $v = f(\xi)$, f – bet kokia diferencijuojama funkcija. Integruodami lygtį

$$u_\xi = f(\xi),$$

gausime

$$u = \int f(\xi) d\xi + \psi(\eta) = \varphi(\xi) + \psi(\eta);$$

čia φ ir ψ – bet kokios dukart diferencijuojamos funkcijos. Grižę prie senų kintamujų x ir y , gausime nagrinėjamosios lygties bendrą sprendinį:

$$u(x, y) = \varphi(x + y) + \psi(x - y).$$

2. Tarkime, aplinkoje U reiškinys

$$b^2 - ac = 0. \quad (6.13)$$

Šiuo atveju (6.1) lygtis yra parabolinė, o charakteristinė lygtis turi vieną bendrą integralą

$$\varphi(x, y) = \text{const.}$$

Iš bendrosios diferencialinių lygčių teorijos yra žinoma, kad funkcija φ aplinkoje U yra dukart tolydžiai diferencijuojama. Laisvai parinkime kokią nors diferencijuojamą aplinkoje U funkciją ψ tokią, kad jakobianas

$$\begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix} \neq 0 \quad (6.14)$$

(jeigu $\varphi_y \neq 0$, tai galima imti $\psi(x, y) = x$).

Vietoje kintamujų x ir y apibrėžkime naujus nepriklausomus kintamuosius

$$\xi = \xi(x, y) = \varphi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y) = \psi(x, y).$$

Kadangi funkcija φ tenkina (6.9) lygtį, tai (6.7) lygyje koeficientas $A = 0$. Iš (6.8) formulės, (6.13) sąlygos išplaukia, kad koeficientas $B = 0$. Įrodysime, kad koeficientas $C \neq 0$. Jeigu koeficientas C būtų lygus nuliui, tai (6.7) lygtis būtų pirmosios eilės lygtis. Perėjėjoje nuo kintamujų ξ ir η prie senų kintamujų x ir y , gausime (6.1) lygtį, kuri yra antros eilės lygtis. Tačiau padarius nepriklausomų kintamujų transformaciją, lygties eilė nepadidėja. Gauta prieštara rodo, kad $C \neq 0$. Todėl, padaliję (6.7) lygtį iš C , suvesime ją į kanoninį pavidalą

$$u_{\eta\eta} + \dots = 0. \quad (6.15)$$

P a s t a b a. Atkreipsime dėmesį į tai, kad pastarosios lygties nariai, pažymėti daugtaškiu, turi priklausyti nuo u_ξ . Priešingu atveju į šią lygtį galima žiūrėti kaip į paprastą diferencialinę lygtį, kurios kintamasis ξ yra laisvasis parametras.

3. Tarkime, aplinkoje U reiškinys

$$b^2 - ac < 0. \quad (6.16)$$

Šiuo atveju (6.1) lygtis yra elipsinė, o charakteristinė lygtis turi du kompleksiškai jungtinius bendrus integralus. Tegu

$$p(x, y) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y);$$

čia: φ – realioji, o ψ – menamoji funkcijos p dalys. Vietoje kintamujų x ir y galima įvesti naujus nepriklausomus kintamuosius

$$\xi = \xi(x, y) = \varphi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y) = \psi(x, y).$$

Atlikus tokią transformaciją, (6.7) lygties koeficientas B bus lygus nuliui, o koeficientai A ir C sutaps. Norint tuo įsitikinti, reikia atskirti realiają ir menamają lygties

$$ap_x^2 + 2bp_x p_y + cp_y^2 = 0$$

dalis ir pastebėti, kad

$$A = C = \frac{1}{a}(ac - b^2)(\varphi_y^2 + \psi_y^2) \neq 0.$$

Taigi padaliję (6.7) lygtį iš bendros koeficientų A ir C reikšmės, suvesime ją į kanoninį pavidala

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \dots = 0. \quad (6.17)$$

6.2 PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

Daugelis fizikos ir mechanikos uždavinių aprašomi antros eilės lygtimis. Pa-
prasčiausios iš jų yra:

1. *Puasono* (elipsinė) lygtis

$$\Delta u = -f(x)$$

arba, kai $f = 0$, *Laplaso* lygtis

$$\Delta u = 0;$$

čia: $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}$. Šios lygtys aprašo įvairius stacionariuosius procesus ir pusiausvyros uždavinius.

2. *Šilumos laidumo* (parabolinė) lygtis

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t),$$

aprašanti įvairius šiluminius procesus izotropiniame vienalyčiame kūne.

3. *Bangavimo* (hiperbolinė) lygtis

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t),$$

aprašanti garso, elektromagnetinių bangų, hidrodinamikos, stygos ir membranos svyravimų procesus.

Šios lygtys yra geriausiai išnagrinėtos, ir su jomis dažniausiai tenka susidurti spendžiant praktinius uždavinius. Suformuluosime šioms lygtims tris pagrindinius uždavinių tipus.

1. K o š i u ž d a v i n y s formuluojamasis šilumos laidumo arba bangavimo lygtis. Šilumos laidumo lyties atveju reikia rasti funkciją u , kuri $\forall x \in \mathbb{R}^n, t > 0$ tenkintę lygtį

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t)$$

ir $\forall x \in \mathbb{R}^n$ pradinę sąlygą

$$u|_{t=0} = \varphi(x).$$

Bangavimo lyties atveju Koši uždavinys formuluojamasis taip: rasti funkciją u , kuri $\forall x \in \mathbb{R}^n, t > 0$ tenkintę lygtį

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t)$$

ir $\forall x \in \mathbb{R}^n$ pradines sąlygas

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x).$$

Kraštinių sąlygų šiuose uždaviniuose nėra.

2. K r a š t i n i s u ž d a v i n i s formuluojamas Puasono arba Laplaso lygtims. Abiem atvejais reikia rasti funkciją u , kuri srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ tenkintų Puasono (Laplaso) lygtį

$$\Delta u = -f(x) \quad (\Delta u = 0),$$

ir paviršiaus $S = \partial\Omega$ taškuose vieną iš kraštinių sąlygų:

$$u|_S = \varphi(x) - \text{pirmoji kraštinė sąlyga},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S = \psi(x) - \text{antroji kraštinė sąlyga},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S + \sigma u|_S = \mu(x) - \text{trečioji kraštinė sąlyga};$$

čia $\partial u / \partial \mathbf{n}$ – funkcijos u išvestinė išorinės normalės kryptimi. Pradinių sąlygų nėra.

Jeigu Laplaso lygtis nagrinėjama kartu su pirmaja kraštine sąlyga, tai toks uždavinys vadinamas *pirmuoju*, arba *Dirichlé*, uždaviniu, jeigu su antraja – *antruoju*, arba *Noimano*, uždaviniu, o jeigu su trečiaja – *trečiuoju* kraštiniu uždavinu.

3. M i š r u s i s u ž d a v i n i s formuluojamas šilumos laidumo arba bangavimo lygtims. Reikia rasti funkciją u , kuri cilindre $Q_T = \Omega \times (0, T)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ tenkintų šilumos laidumo

$$u_t - a^2 \Delta u = f(x, t)$$

arba bangavimo

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t)$$

lygtį, atitinkamas pradines sąlygas (žr. Koši uždavinį) ir vieną iš kraštinių sąlygų:

$$u|_S = \varphi(x, t) - \text{pirmoji kraštinė sąlyga},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S = \psi(x, t) - \text{antroji kraštinė sąlyga},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_S + \sigma u|_S = \mu(x, t) - \text{trečioji kraštinė sąlyga}.$$

6.3 CHARAKTERISTIKŲ METODAS

Ieškosime vienmatės bangavimo lygties

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad (6.18)$$

sprendinio, tenkinančio pradines sąlygas:

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}; \quad (6.19)$$

čia f , φ , ψ – žinomos funkcijos.

Bangavimo lygtį atitinka charakteristikų lygtis $x'^2 - a^2 = 0$. Integruodami ją, randame dvi charakteristikų klases:

$$x - at = \text{const}, \quad x + at = \text{const}. \quad (6.20)$$

Kadangi (6.18), (6.19) Koši uždavinys yra tiesinis, tai ji patogu išskaidyti į du paprastesnius Koši uždavinius:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) \quad (6.21)$$

ir

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0. \quad (6.22)$$

Iš pradžių rasime (6.21) Koši uždavinio sprendinį. Tuo tikslu vietoje kintamųjų x ir t apibrėžime naujus nepriklausomus kintamuosius

$$\xi = x - at, \quad \eta = x + at.$$

Tada homogeninė bangavimo lygtis virs lygtimi

$$u_{\xi\eta} = 0.$$

Jos bendrasis sprendinys

$$u = c_1(\xi) + c_2(\eta);$$

čia c_1 ir c_2 – bet kokios dukart diferencijuojamos funkcijos. Išstatę į šitą formulę vietoje kintamųjų ξ ir η jų išraiškas kintamaisiais x ir t , gausime homogeninės bangavimo lygties bendrąjį sprendinį

$$u = c_1(x - at) + c_2(x + at). \quad (6.23)$$

Funkcijas c_1 ir c_2 parinksime taip, kad funkcija u tenkintų (6.19) pradines sąlygas, t.y. pareikalausime, kad funkcijos c_1 ir c_2 tenkintų lygčių sistemą

$$c_1(x) + c_2(x) = \varphi(x),$$

$$-ac'_1(x) + ac'_2(x) = \psi(x).$$

Suintegravę antrają lygtį, gausime dviejų lygčių su dviem nežinomomis funkcijomis sistemą. Šios sistemos sprendiniai

$$c_1(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\tau) d\tau - \frac{c}{2a},$$

$$c_2(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\tau) d\tau + \frac{c}{2a};$$

čia c – laisvoji konstanta. Pirmoje formulėje argumentą x pakeiskime $x - at$, o antroje formulėje $x + at$. Istatę gautas funkcijų c_1, c_2 išraiškas į (6.23) formulę, gausime (6.21) Koši uždavinio sprendinį

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a} \int_{x - at}^{x + at} \psi(\tau) d\tau. \quad (6.24)$$


Pastaroji formulė vadinama *Dalamberto* formule.

Tarkime, funkcija ψ yra diferencijuojama, o funkcija φ – dukart diferencijuojama. Tada funkcija u , apibrėžta (6.24) formule, yra dukart diferencijuojama, tenkina homogeninę bangavimo lygtį ir (6.19) pradines sąlygas. Be to, jeigu šitos sąlygos yra patenkintos, tai iš (6.24) formulės išplaukia, kad (6.21) Koši uždavinio sprendinys yra vienintelis.

P a s t a b a . Jeigu (6.21) Koši uždavinio sprendinys nagrinėjamas tik trikampyje, apribotame tiesėmis

$$x - at = \text{const}, \quad x + at = \text{const}, \quad t = 0,$$

tai (6.19) pradines sąlygas pakanka apibrėžti tik šio trikampio pagrinde (žr. 6.2 pav.).



6.2 pav.

Rasime (6.22) Koši uždavinio sprendinį. Tuo tikslu kiekvienam $\tau > 0$ sudarome pagalbinį uždavinį:

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > \tau, \quad (6.25)$$

$$v|_{t=\tau} = 0, \quad v_t|_{t=\tau} = f(x, \tau). \quad (6.26)$$

Jeigu funkcija f yra diferencijuojama, tai pagal Dalambero formulę (6.25), (6.26) Koši uždavinio sprendinys

$$v(x, t, \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(y, \tau) dy.$$

Parodysime, kad funkcija

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t, \tau) d\tau \quad (6.27)$$

yra (6.22) Koši uždavinio sprendinys. Kadangi funkcija v yra (6.25), (6.26) Koši uždavinio sprendinys, tai

$$\begin{aligned} u_t &= v(x, t, t) + \int_0^t v_t(x, t, \tau) d\tau = \int_0^t v_t(x, t, \tau) d\tau, \\ u_{tt} &= v_t(x, t, t) + \int_0^t v_{tt}(x, t, \tau) d\tau = f(x, t) + \int_0^t v_{tt}(x, t, \tau) d\tau, \\ u_{tt} - a^2 u_{xx} &= f(x, t) + \int_0^t [v_{tt}(x, t, \tau) - a^2 v_{xx}(x, t, \tau)] d\tau = f(x, t). \end{aligned}$$

Taigi funkcija u , apibrėžta (6.27) formule, yra (6.22) Koši uždavinio sprendinys¹.

¹Šitas metodas vadinamas Diuamelio principu. Jo esmė yra ta, kad tiesinės nehomogeninių dalinių išvestinių lygties Koši arba mišraus uždavinio su nulinėmis pradinėmis sąlygomis sprendinį galima išreikšti atitinkamu homogeninės lygties sprendiniu. Pavyzdžiui, Koši uždavinio

$$\begin{aligned} u_{tt} + Lu &= f(x, t), & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u|_{t=0} &= 0, & u_t|_{t=0} = 0 \end{aligned}$$

sprendinį galima išreikšti formule

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t, \tau) d\tau,$$

kurioje $v(x, t, \tau)$ yra Koši uždavinio

$$\begin{aligned} v_{tt} + Lv &= 0, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ v|_{t=\tau} &= 0, & v_t|_{t=\tau} = f(x, \tau) \end{aligned}$$

sprendinys, o L – tiesinis diferencialinis operatorius, kurio koeficientai nepriklauso nuo t ir kuriame kintamojo t atžvilgiu yra ne aukštesnės kaip pirmos eilės išvestinės. Analogiškai yra konstruojamas ir Koši uždavinio

$$\begin{aligned} u_t + Mu &= f(x, t), & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u|_{t=0} &= 0 \end{aligned}$$

sprendinys. Čia M – tiesinis diferencialinis operatorius, kurio koeficientai nepriklauso nuo kintamojo t ir kuriame yra išvestinės tik pagal kintamuosius x .

Akivaizdu, kad (6.21), (6.22) Koši uždavinijų sprendinių suma, t.y. funkcija

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2}(\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy + \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(y, \tau) dy d\tau, \end{aligned} \quad (6.28)$$

yra (6.18), (6.19) Koši uždavinio sprendinys. Funkcija u yra dukart diferencijuojama, jeigu funkcijos ψ ir f yra diferencijuojamos, o funkcija φ – dukart diferencijuojama.

P a s t a b a . Naudojant (6.23) formulę, galima rasti ne tik Koši, bet ir mišraus uždavinio sprendinį. Sprendžiant mišrųjų uždavinį, reikia turėti omenyje tai, kad funkcijos c_1 ir c_2 apibrėžtos ne visoms argumentų reikšmėms. Argumentai $x - at$ ir $x + at$ gali ir nepriklausyti funkcijų c_1 , c_2 apibrėžimo sritims. Taigi, sprendžiant mišrų uždavinį, reikia tinkamai pratesti funkcijas c_1 , c_2 arba (tai visiškai ekvivalentu) φ ir ψ .

6.4 FURJÉ ARBA KINTAMUJŲ ATSKYRIMO METODAS

Kintamujų atskyrimo metodą galima taikyti gana plačiai tiesinių lygčių klasei. Lygtis $Mu + Nu = 0$ priklauso šiai klasei, jeigu diferencialinių operatorių M ir N koeficientai yra skirtinės kintamujų funkcijos ir ieškomosios funkcijos u išvestinės jeina į reiškinius Mu ir Nu tik pagal skirtinės kintamuosius. Tarkime, v ir w yra funkcijos, priklausančios nuo šių skirtinės kintamujų ir $u = vw$. Tada lygtį $Mv w + Nv w = 0$ galima suskaidyti į dvjų lygtis. Šių lygčių atskirųjų sprendinių sandauga yra atskirasis lygties $Mu + Nu = 0$ sprendinys. Bendrajį sprendinį gausime pačių sprendinių tiesinį darinį.

Tegu Δ yra vienmatis Laplaso operatorius, t.y. $\Delta = u_{xx}$. Rasime vienmatės bangavimo lygties

$$u_{tt} - u_{xx} = 0, \quad x \in (a, b), \quad t > 0, \quad (6.29)$$

sprendinį, tenkinantį pradines

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in [a, b] \quad (6.30)$$

ir kraštines

$$u + \alpha u_x|_{x=a} = 0, \quad u + \beta u_x|_{x=b} = 0, \quad t \geq 0 \quad (6.31)$$

salygas.

Tegu $u = v(x)T(t)$. Įstatę taip apibrėžtą funkciją į (6.29) lygtį ir atskyre kintamuosius, gausime

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{v_{xx}(x)}{v(x)}.$$

Kairėje šios lygybės pusėje yra kintamojo t , o dešinėje – kintamojo x funkcija. Šios funkcijos sutampa tik tuo atveju, kai jos yra konstantos. Pažymėkime bendrąjį jų reikšmę raide $-\lambda$. Tada funkcija $u = vT$ yra (6.29) lygties sprendinys, jeigu funkcija T yra lygties

$$T'' + \lambda T = 0, \quad (6.32)$$

o funkcija v – lygties

$$-v_{xx} = \lambda v \quad (6.33)$$

sprendinys. Be to, funkcija $u = vT$ tenkins (6.31) kraštines salygas, jeigu šias salygas tenkins funkcija v . Taigi funkcijai v gavome *Šturm–Liuvilio* uždavinį: rasti tas parametras λ reikšmes, kurioms egzistuoja netrivialus (6.33) lygties sprendinys, tenkinantis kraštines salygas

$$v + \alpha v_x|_{x=a} = 0, \quad v + \beta v_x|_{x=b} = 0. \quad (6.34)$$

Tokios parametras λ reikšmės vadinamos *tikrinémis reikšmémis*, o jas atitinkančios netrivialūs sprendiniai – *tikrinémis finkcijomis*.

Tegu $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ yra (6.33), (6.34) uždavinio tikrinės reikšmės ir $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ – jas atitinkančios tikrinės funkcijos, ortonormuotos erdvėje $L_2(a, b)$. Kiekvienam $\lambda = \lambda_k$ rasime bendrąjį (6.32) lygties sprendinį. Neigiamiems λ_k

$$T_k = C_{1k} e^{-\sqrt{|\lambda_k|} t} + C_{2k} e^{\sqrt{|\lambda_k|} t}.$$

Teigiamiems λ_k

$$T_k = C_{1k} \cos \sqrt{\lambda_k} t + C_{2k} \sin \sqrt{\lambda_k} t.$$

Tuo atveju, kai $\lambda_k = 0$,

$$T_k = C_{1k} + t C_{2k}.$$

Kiekviena iš funkcijų $v_k T_k$, $k = 1, 2, \dots$, tenkina (6.29) lygtį ir (6.31) kraštines sąlygas. Todėl funkcija

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$$

taip pat tenkina (6.29) lygtį ir (6.31) kraštines sąlygas. Pareikalavę, kad funkcija u tenkintų (6.30) pradines sąlygas, gausime

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \sum_{k=1}^m \left(a_k \operatorname{ch} \sqrt{|\lambda_k|} t + \frac{b_k}{\sqrt{|\lambda_k|}} \operatorname{sh} \sqrt{|\lambda_k|} t \right) v_k(x) + \\ & + \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(a_k \cos \sqrt{\lambda_k} t + \frac{b_k}{\sqrt{\lambda_k}} \sin \sqrt{\lambda_k} t \right) v_k(x); \end{aligned} \quad (6.35)$$

čia: m – neteigiamų tikrinių reikšmių skaičius, $a_k = (\varphi, v_k)$, $b_k = (\psi, v_k)$ – funkcijų φ ir ψ Furjė koeficientai. Jeigu tikrinė reikšmė $\lambda_m = 0$, tai (6.35) formulėje vietoje funkcijų $\operatorname{ch} \sqrt{|\lambda_m|} t$ ir $\frac{1}{\sqrt{|\lambda_m|}} \operatorname{sh} \sqrt{|\lambda_m|} t$ reikia imti atitinkamai 1 ir t .

Žinant (6.33), (6.34) uždavinio tikrines reikšmes ir tikrines funkcijas, lengvai galima rasti ir nehomogeninės lygties

$$u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), \quad x \in (a, b), \quad t > 0, \quad (6.36)$$

sprendinį, tenkinantį homogenines pradines

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, \quad x \in [a, b] \quad (6.37)$$

ir (6.31) kraštines sąlygas. Jo ieškosime tokiu pavidalu:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} F_k(t) v_k(x).$$

Istate taip apibrėžtą funkciją u į (6.36) lygtį, gausime

$$\sum_{k=1}^{\infty} (F_k''(t) + \lambda_k F_k(t)) v_k(x) = f(x, t).$$

Funkcijos v_k yra tiesiškai nepriklausomos (iroykite). Todėl funkcija F_k , $\forall k = 1, 2, \dots$, turi tenkinti paprastąjį diferencialinę lygtį

$$F_k''(t) + \lambda_k F_k(t) = f_k(t); \quad (6.38)$$

čia $f_k = (f, v_k)$ yra funkcijos f Furjė koeficientai kintamojo x atžvilgiu. Be to, iš (6.37) išplaukia, kad funkcija F_k turi tenkinti pradines sąlygas

$$F_k(0) = 0, \quad F'_k(0) = 0. \quad (6.39)$$

Nehomogeninės (6.38) lygties sprendinys, tenkinantis (6.39) pradines sąlygas,

$$F_k(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \int_0^t \sin \sqrt{\lambda_k} (t - \tau) f_k(\tau) d\tau, & \text{kai } k > m, \\ \frac{1}{\sqrt{|\lambda_k|}} \int_0^t \operatorname{sh} \sqrt{|\lambda_k|} (t - \tau) f_k(\tau) d\tau, & \text{kai } k \leq m. \end{cases}$$

Todėl formalų (6.36), (6.37), (6.31) uždavinio sprendinį galima išreikšti eilute

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \sum_{k=1}^m v_k(x) \frac{1}{\sqrt{|\lambda_k|}} \int_0^t \operatorname{sh} \sqrt{|\lambda_k|} (t - \tau) f_k(\tau) d\tau + \\ & + \sum_{k=1}^{\infty} v_k(x) \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \int_0^t \sin \sqrt{\lambda_k} (t - \tau) f_k(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (6.40)$$

Bendruoju atveju nehomogeninės (6.36) lygties sprendinio, tenkinančio (6.30) pradines ir nehomogeninės kraštines sąlygas

$$u + \alpha u_x|_{x=a} = \nu(t), \quad u + \beta u_x|_{x=b} = \mu(t), \quad t \geq 0, \quad (6.41)$$

galima ieškoti tokiu pavidalu:

$$u = w + \omega.$$

Šiuo atveju funkciją ω reikia parinkti taip, kad ji tenkintų (6.41) kraštines sąlygas. Tada funkcijai w gausime kraštinį uždavinį

$$w_{tt} - w_{xx} = f - \omega_{tt} + \omega_{xx}, \quad x \in (a, b), \quad t > 0,$$

$$w|_{t=0} = \varphi - \omega|_{t=0}, \quad w_t|_{t=0} = \psi - \omega_t|_{t=0}, \quad x \in [a, b],$$

$$w + \alpha w_x|_{x=a} = 0, \quad w + \beta w_x|_{x=b} = 0, \quad t \geq 0,$$

su homogeninėm kraštinėm sąlygom. Savo ruožtu šį uždavinį galima išskaidyti į du uždavinius taip, kad vieno uždavinio pradinė ir kraštinė sąlygos būtų homogeninės, o kito lygtis ir kraštinė sąlyga būtų homogeninės.

Išnagrinėsime vienmatės šilumos laidumo lygties atvejį. Iš pradžių rasime lygties

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad x \in (a, b), \quad t > 0, \quad (6.42)$$

sprendinį, tenkinantį pradinę

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in [a, b], \quad (6.43)$$

ir (6.31) kraštines sąlygas. Šiuo atveju vietoje (6.32) lygties gausime diferencinielinę lygtį

$$T' + \lambda T = 0, \quad (6.44)$$

o (6.33) lygtis ir (6.34) kraštinės sąlygos išliks tos pačios.

Kai $\lambda = \lambda_k$, bendrasis (6.44) lygties sprendinys

$$T_k(t) = C_k e^{-\lambda_k t}.$$

Todėl funkcija $u_k = v_k T_k$, $\forall k = 1, 2, \dots$, tenkina (6.42) lygtį ir (6.31) kraštines sąlygas. Tačiau tada funkcija

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k(x) T_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k e^{-\lambda_k t} v_k(x)$$

taip pat tenkins (6.42) lygtį ir (6.31) kraštines sąlygas. Pareikalavę, kad funkcija u tenkintų (6.43) pradinę sąlygą, gausime formulę

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\lambda_k t} v_k(x), \quad (6.45)$$

kurioje $a_k = (\varphi, v_k)$ yra funkcijos φ Furjė koeficientai.

Nehomogeninės lygties

$$u_t - u_{xx} = f(x, t), \quad x \in (a, b), \quad t > 0, \quad (6.46)$$

sprendinį, tenkinantį pradinę

$$u|_{t=0} = 0, \quad x \in [a, b], \quad (6.47)$$

ir (6.31) kraštines sąlygas, galima išreikšti eilute

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k(x) F_k(t), \quad (6.48)$$

kurioje

$$F_k(t) = \int_0^t e^{-\lambda_k(t-\tau)} f_k(\tau) d\tau$$

yra Koši uždavinio

$$F'_k + \lambda_k F_k = f_k(t), \quad F_k(0) = 0,$$

sprendinys. Čia $f_k = (f, v_k)$ yra funkcijos f Furjė koeficientai.

Bendruoju atveju (6.46) lygties sprendinį, tenkinantį (6.43) pradinę ir (6.41) kraštines sąlygas, galima rasti lygiai taip pat kaip ir bangavimo lygties atveju.

P a s t a b a . Vietoje vienmačio Laplaso operatoriaus čia galima imti dvi matij, trimatį ir aplamai n -matį Laplaso operatorių. Reikia tik rasti atitinkamo Šturmo–Liuvilio uždavinio tikrines reikšmes ir tikrines funkcijas. Be to, vietoj Laplaso operatoriaus galima imti bet kokį bendresnį tiesinį elipsinį operatorių, kurio koeficientai nepriklauso nuo kintamojo t .

P a v y z d ž i a i :

1. Kintamujų atskyrimo metodu rasime kraštinio uždavinio

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in (0, l), t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0 \end{cases} \quad (6.49)$$

sprendinį. Atskirojo bangavimo lygties sprendinio ieškome pavidalu $u = v(x)T(t)$. Įstatę taip apibrėžtą funkciją į lygtį ir atskyrit kintamuosius gausime lygybę

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{v''(x)}{v(x)}.$$

Ji yra teisinga tik tuo atveju, kai abi jos pusės yra pastovios. Pažymėkime bendrą jų reikšmę $-\lambda$. Tada funkcijai T gausime lygtį

$$T'' + \lambda T = 0,$$

o funkcijai v lygtį

$$-v_{xx} = \lambda v.$$

Be to, funkcija v dar turi tenkinti kraštines sąlygas

$$v(0) = 0, \quad v(l) = 0.$$

Teigiamoms λ reikšmėms pastaroji lygtis turi du tiesiškai nepriklausomus sprendinius

$$v_1 = \cos \sqrt{\lambda}x, \quad v_2 = \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Todėl bendrasis jos sprendinys

$$v = c_1 \cos \sqrt{\lambda}x + c_2 \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Pareikalavę, kad jis tenkintų homogenines kraštines sąlygas gausime:

$$c_1 = 0, \quad c_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0.$$

Kadangi ieškomas sprendinys turi būti netrivialus, tai konstanta $c_2 \neq 0$. Taigi λ turi tenkinti lygtį

$$\sin \sqrt{\lambda}l = 0.$$

Išsprendę ją randame tirkines reikšmes $\lambda_k = \left(\frac{\pi k}{l}\right)^2$, $k = 1, 2, \dots$. Kiekvieną tirkinę reikšmę λ_k atitinka tirkinė funkcija

$$v_k = c_{2k} \sin \frac{\pi kx}{l}.$$

Ji apibrėžiama pastovaus daugiklio c_{2k} tikslumu. Konstantas c_{2k} parenkame taip, kad

$$\int_0^l v_k^2(x) dx = 1, \forall k = 1, 2, \dots$$

Iš šių sąlygų randame

$$c_{2k} = \sqrt{\frac{2}{l}}, \quad v_k(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{\pi kx}{l}.$$

Neigiamoms λ reikšmėms du tiesiskai nepriklausomi sprendiniai

$$v_1(x) = e^{\sqrt{-\lambda}x}, \quad v_2(x) = e^{-\sqrt{-\lambda}x}.$$

Bendrasis sprendinys

$$v(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}.$$

Kai $\lambda = 0$,

$$v_1(x) = 1, \quad v_2(x) = x,$$

o bendrasis sprendinys

$$v(x) = c_1 + c_2 x.$$

Pareikalavę, kad v tenkintų homogenines kraštines sąlygas $v(0) = 0$, $v(l) = 0$ abiem atvejais gausime: $c_1 = c_2 = 0$. Tai reiškia, kad neteigiamų tirkinių reikšmių nėra.

Imkime lygtį $T'' + \lambda T = 0$ parametrą $\lambda = \lambda_k$. Tada gausime lygtį, kurios bendrasis sprendinys

$$T_k(t) = a_k \cos \sqrt{\lambda_k}t + b_k \sin \sqrt{\lambda_k}t.$$

Funkcijos v_k ir T_k yra sukonstruotos taip, kad jų sandauga $T_k \cdot v_k$ tenkina (6.49) lygtį ir homogenines kraštines sąlygas. Todėl tokų sandaugų suma

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) v_k(x)$$

taip pat tenkina (6.49) lygtį ir homogenines kraštines sąlygas. Konstantas a_k ir b_k parinksime taip, kad taip apibrėžta funkcija u tenkintų pradines sąlygas. Iš pirmos pradinės sąlygos gauname lygybę

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k v_k(x) = \varphi(x).$$

Padauginę abi šios lygybės pusės iš v_m ir rezultatą suintegruavę nuo 0 iki l randame

$$a_m = \int_0^l \varphi(x)v_m(x) dx. \quad (6.50)$$

Čia pasinaudojome tuo, kad tikrinės funkcijos $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ yra ortonormuotos erdvėje $L_2(0, l)$, t.y.

$$\int_0^l v_k(x)v_m(x) dx = \delta_k^m = \begin{cases} 1, & \text{kai } k = m, \\ 0, & \text{kai } k \neq m. \end{cases}$$

Pareikalavę, kad funkcija u tenkintų antrają pradinę sąlygą gausime lygybę

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sqrt{\lambda_k} v_k(x) = \psi(x).$$

Iš jos lygiai taip pat randame

$$b_m = \frac{1}{\sqrt{\lambda_m}} \int_0^l \psi(x)v_m(x) dx. \quad (6.51)$$

Taigi nagrinėjamo kraštinio uždavinio sprendinys

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \sqrt{\lambda_k} t + b_k \sin \sqrt{\lambda_k} t) v_k(x);$$

čia koeficientai a_k ir b_k yra apibrėžti (6.50) ir (6.51) formulėmis.

6.5 INTEGRALINIŲ FURJĖ TRANSFORMACIJŲ METODAS

Nagrinėsime Koši uždavinį

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (6.52)$$

Irodysime, kad jo sprendinį galima išreikšti *Puasono* formule:

$$u(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy. \quad (6.53)$$

Išvesdami ją naudosime integralinį Furjė transformacijos metodą. Taikydami šį metodą, manysime, kad visi atliekami veiksmai yra teiseti.

Priminsime, kad tiesioginė ir atvirkštinė Furjė transformacijos kintamojo x atžvilgiu apibrėžiamos formulėmis:

$$\hat{u}(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} u(x, t) dx, \quad u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} \hat{u}(\xi, t) d\xi, \quad i = \sqrt{-1}.$$

Funkcijų u_t ir u_{xx} Furjė transformacijos:

$$\begin{aligned} \widehat{u}_t(\xi, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} u_t(x, t) dx = \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} u(x, t) dx \right) = \widehat{u}_t(\xi, t), \\ \widehat{u}_{xx}(\xi, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} u_{xx}(x, t) dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (-i\xi) e^{ix\xi} u_x(x, t) dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (-i\xi)^2 e^{ix\xi} u(x, t) dx = -\xi^2 \widehat{u}(\xi, t). \end{aligned}$$

Pritaikę Furjė transformacijos operatorių abiems šilumos laidumo lygties pusėms, gausime paprastąjį diferencialinį kintamojo t atžvilgiu lygtį

$$\widehat{u}_t + a^2 \xi^2 \widehat{u} = 0.$$

I kintamajį ξ galima žiūrėti kaip į parametrą. Ši lygtis yra tiesinė pirmos eilės lygtis, ir jos bendrasis sprendimys

$$\hat{u}(\xi, t) = C(\xi)e^{-a^2\xi^2 t}.$$

Kadangi

$$\hat{u}(\xi, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} u(x, 0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi),$$

tai

$$\widehat{\varphi}(\xi) = C(\xi)$$

ir

$$\hat{u}(\xi, t) = \widehat{\varphi}(\xi)e^{-a^2\xi^2 t}.$$

Pritaikę šios lygybės abiems pusėms atvirkštinį Furjė transformacijos operatorių, gausime

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} \widehat{\varphi}(\xi) e^{-a^2\xi^2 t} d\xi.$$

Vietoje funkcijos $\widehat{\varphi}$ įstatykime jos integralinę išraišką ir sukeiskime integravimo tvarką. Tada gausime formulę

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(x-y)\xi - a^2\xi^2 t} d\xi \right) \varphi(y) dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t) \varphi(y) dy;$$

čia

$$G(x - y, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(x-y)\xi - a^2\xi^2 t} d\xi.$$

Suskaičiuosime integralą

$$G(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi - a^2\xi^2 t} d\xi.$$

Tuo tikslu išskirsime pilnajių kvadrataj

$$-a^2\xi^2 t - ix\xi = -(a^2\xi^2 t + ix\xi) = -\left[a^2 t \left(\xi + i \frac{x}{2a^2 t} \right)^2 + \frac{x^2}{4a^2 t} \right]$$

ir integralą $G(x, t)$ perrašysime taip:


$$G(x, t) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2t(\xi + i\frac{x}{2a^2t})^2} d\xi. \quad (6.54)$$

Parodysime, kad integralas

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2t(s + i\sigma_0)^2} ds$$

nepriklauso nuo parametru σ_0 .

Tegu l – uždaras kontūras kompleksinėje kintamojo $z = s + i\sigma$ plokštumoje (žr. 6.1 pav.).



6.1 pav.

Pagal Koši teorema

$$\begin{aligned} 0 &= \int_l e^{-a^2tz^2} dz = \int_{-N}^N e^{-a^2t(s+i\sigma_0)^2} ds + \int_{\sigma_0}^0 e^{-a^2t(N+i\sigma)^2} d\sigma + \\ &\quad \int_N^{-N} e^{-a^2ts^2} ds + \int_0^{\sigma_0} e^{-a^2t(-N+i\sigma)^2} d\sigma. \end{aligned} \quad (6.55)$$

Kadangi

$$\left| \int_0^{\sigma_0} e^{-a^2t(\pm N+i\sigma)^2} d\sigma \right| \leq e^{-a^2tN^2} \int_0^{\sigma_0} e^{a^2t\sigma^2} d\sigma \rightarrow 0$$

kai $N \rightarrow \infty$, tai perėję (6.55) formulėje prie ribos, gausime

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2t(s+i\sigma_0)^2} ds = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2ts^2} ds.$$

Be to, integralas

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2ts^2} ds = \frac{1}{a\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{a\sqrt{t}}.$$

Todėl funkcija

$$G(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{1/2}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}. \quad (6.56)$$

Tokiu būdu formaluoj (6.52) Koši uždavinio sprendinį galima išreikšti (6.53) formule. Užrašysime ją tokiu pavidalu:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t) \varphi(y) dy = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy. \quad (6.57)$$

Funkcija G yra vadinama šilumos laidumo lygties fundamentaliuoju sprendiniu (arba Gryno funkcija).

P a s t a b a . Galima įrodyti, kad funkcija u , apibrėžta (6.53) formule, yra (6.52) Koši uždavinio sprendinys, jeigu funkcija φ yra tik tolydi ir aprėžta.

Koši uždavinio

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad (6.58)$$

formalujį sprendinį rasime taikydamি Diuamelio principą. Tuo tikslu $\forall \tau > 0$ rasime formalujį Koši uždavinio

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > \tau, \\ v|_{t=\tau} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

sprendinį. Pagal (6.57) formulę

$$v(x, t, \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t - \tau) f(y, \tau) dy.$$

Tiesiogiai galima patikrinti, kad funkcija

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t, \tau) d\tau = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t - \tau) f(y, \tau) dy d\tau \quad (6.59)$$

yra (6.58) Koši uždavinio formalusis sprendinys.

Sudėję (6.52) ir (6.58) Koši uždavinių sprendinius, gausime funkciją

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t) \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t - \tau) f(y, \tau) dy d\tau, \quad (6.60)$$

kuri yra formalusis Koši uždavinio

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

sprendinys.

Integralinį Furjė transformacijų metodą galima taikyti ne tik įvairių Koši uždavinių sprendimui, bet ir Kraštinių uždavinių sprendimui. Naudojant sinusinę Furjė transformaciją rasime kraštinio uždavinio

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), & x > 0, \\ u|_{x=0} = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (6.61)$$

sprendinį. Tegu funkcija u yra (6.61) kraštinio uždavinio sprendinys. Jos sinusinė tiesioginė ir atvirkštinė Furjė transformacijos kintamojo x atžvilgiu apibrėžiamos taip:

$$\widehat{u}^s(\xi, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u(x, t) \sin x\xi dx, \quad u(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \widehat{u}^s(\xi, t) \sin x\xi d\xi.$$

Pritaikę sinusinę Furjė transformaciją funkcijai u_{tt} gausime

$$\widehat{u}_{tt}(\xi, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u_{tt}(x, t) \sin x\xi dx = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \widehat{u}^s(\xi, t) := \widehat{u}_{tt}^s(\xi, t).$$

Jeigu funkcija u begalybėje kartu su savo išvestine u_x lygi nuliui, tai integruodami dalimis gausime, kad funkcijos u_{xx} Furjė transformacija

$$\begin{aligned} \widehat{u}_{xx}(\xi, t) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u_{xx}(x, t) \sin x\xi dx = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u_x(x, t) \xi \cos x\xi dx = \\ &-\xi^2 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u(x, t) \sin x\xi dx = -\xi^2 \widehat{u}^s(\xi, t). \end{aligned}$$

Taigi pritaikę sinusinę Furjė transformaciją abiejoms (6.61) bangavimo lygties pusėms, gausime tiesinę antros eilės lygtį

$$\widehat{u}_{tt}^s(\xi, t) + a^2 \xi^2 \widehat{u}^s(\xi, t) = 0, \quad t > 0,$$

kurioje kintamasis ξ yra parametras. Šios lygties bendrasis sprendinys

$$\widehat{u}^s(\xi, t) = c_1(\xi) \cos a\xi t + c_2(\xi) \sin a\xi t.$$

Kadangi funkcija u tenkina (6.61) pradines sąlygas, tai jos sinusinė Furjė transformacija \widehat{u}^s turi tenkinti pradines sąlygas

$$\widehat{u}^s|_{t=0} = \widehat{\varphi}^s(\xi), \quad \widehat{u}_t^s|_{t=0} = \widehat{\psi}^s(\xi), \quad \xi > 0.$$

Panaudojė šias sąlygas randame

$$c_1(\xi) = \widehat{\varphi}^s(\xi), \quad c_2(\xi) = \frac{\widehat{\psi}^s(\xi)}{a\xi}.$$

Taigi funkcijos u sinusinė Furjė transformacija

$$\hat{u}^s(\xi, t) = \hat{\varphi}^s(\xi) \cos a\xi t + \frac{\hat{\psi}^s(\xi)}{a\xi} \sin a\xi t.$$

Pritaikę abiejoms šios lygybės pusėms atvirkštinę sinusinę Furjė transformaciją, randame ieškomą funkciją

$$u(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \left(\hat{\varphi}^s(\xi) \cos a\xi t + \frac{\hat{\psi}^s(\xi)}{a\xi} \sin a\xi t \right) \sin x\xi d\xi. \quad (6.62)$$

Integralą dešinėje šios lygybės pusėje išskaidome į du integralus. Pirmasis iš jų

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \hat{\varphi}^s(\xi) \cos a\xi t \sin x\xi d\xi &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \hat{\varphi}^s(\xi) (\sin(x+at)\xi + \sin(x-at)\xi) d\xi = \\ &\frac{1}{2} (\varphi(x+at) + \text{sign}(x-at)\varphi(|x-at|)). \end{aligned}$$

Antrasis

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\hat{\psi}^s(\xi)}{a\xi} \sin a\xi t \sin x\xi d\xi &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\hat{\psi}^s(\xi)}{a\xi} (\cos(x-at)\xi - \cos(x+at)\xi) d\xi = \\ &\frac{1}{2a} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \int_{x-at}^{x+at} \hat{\psi}^s(\xi) \sin s\xi ds d\xi = \frac{1}{2a} \int_{|x-at|}^{x+at} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

Istatę šias integralų išraiškas į (6.62) formulę gauname

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x+at) + \text{sign}(x-at)\varphi(|x-at|)) + \frac{1}{2a} \int_{|x-at|}^{x+at} \psi(s) ds. \quad (6.63)$$

7 SKYRIUS

Skaitiniai diferencialinių lygčių sprendimo metodai

Netiesines paprastąsias diferencialines lygtis bei jų sistemas retai kada pavyksta siuntręti. Dar sudėtingesnė yra situacija yra kai nagrinėjame dalinių išvestinių lygtis arba jų sistemas. Todėl labai aktualūs yra tokį lygčių bei sistemų įvairūs skaitiniai sprendimo metodai.

Šiame skyriuje pateiksime du skaitinius diferencialinių lygčių sprendimo metodus. Pirmasis iš jų yra Rungė – Kuto metodas, antrasis – baigtinių skirtumų metodas. Iš pradžių pateiksime skaitinį paprasųjį diferencialinių lygčių bei jų sistemų sprendimą Rungė – Kuto metodu. Po to skaitinį diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sprendimą baigtinių skirtumų metodu. Pastarajį metodą taikysime skaitiniams elipsinių, parabolinių ir hiperbolinių lygčių sprendimui.

7.1 RUNGE – KUTO METODAS PIRMOS EILĖS PAPRASTAJAI DIFERENCIALINEI LYGČIAI

Nagrinėsime Koši uždavinį

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (7.1)$$

pirmosios eilės paprastajai diferencialinei lygčiai. Jeigu funkcija f kokioje nors srityje turi n -tosios eilės tolydžias dalines išvestines, tai iš paprastųjų diferencialinių lygčių teorijos yra žinoma, kad ieškomas sprendinys turi $(n+1)$ -os eilės tolydžias išvestines ir pagal Teiloro formulę

$$\begin{aligned} y(x) = & y(x_0) + (x - x_0)y'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!}y''(x_0) + \dots + \\ & + \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}y^{(n+1)}(x_0) + o(|x - x_0|^{n+1}) \end{aligned}$$

Tegu $x = x_0 + h$. Tada, atmetę paskutinį nari, gausime apytikslią lygybę

$$y(x_0 + h) - y_0 \approx hy'(x_0) + \frac{h^2}{2!}y''(x_0) + \dots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}y^{(n+1)}(x_0). \quad (7.2)$$

Išvestinių reikšmes taške x_0 galima apskaičiuoti iš (7.1) lygties:

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= f(x_0, y(x_0)) := y'_0, \\ y''(x_0) &= f_x(x_0, y(x_0)) + f_y(x_0, y(x_0)) \cdot y'(x_0) := y''_0, \\ y'''(x_0) &= f_{xx}(x_0, y(x_0)) + 2f_{yx}(x_0, y(x_0)) \cdot y'(x_0) + f_{yy}(x_0, y(x_0)) \cdot y'^2(x_0) + \\ &\quad f_y(x_0, y(x_0)) \cdot y''(x_0) := y'''_0 \end{aligned}$$

ir t.t. Įstatę gautas išvestinių reikšmes į (7.2) formulę gausime apytikslią sprendinio reikšmę. Dideliems n ši formulė tampa labai sudėtinga ir praktikoje ne-naudojama.

Rungė pasiūlė kitą diferencialinių lygčių integravimo metodą, kurį vėliau išvystė Kuta ir kiti mokslininkai. Metodo esmė yra tame, kad funkcijos y pokytį $y(x_0 + h) - y(x_0)$ ieškome pavidalu

$$y(x_0 + h) - y_0 = (\gamma_1 k_1 + \dots + \gamma_r k_r)h; \quad (7.3)$$

čia

$$\begin{aligned} k_i &= f(\xi_i, \eta_i), \quad \xi_i = x_0 + \alpha_i h, \quad \alpha_1 = 0, \quad i = 1, 2, \dots, r, \\ \eta_i &= y_0 + \beta_{i1} k_1 h + \beta_{i2} k_2 h + \dots + \beta_{ii-1} k_{i-1} h. \end{aligned}$$

Taigi

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0), \\ k_2 &= f(x_0 + \alpha_2 h, y_0 + \beta_{21} k_1 h), \\ k_3 &= f(x_0 + \alpha_3 h, y_0 + \beta_{31} k_1 h + \beta_{32} k_2 h), \\ &\dots \quad \dots \\ k_r &= f(x_0 + \alpha_r h, y_0 + \beta_{r1} k_1 h + \beta_{r2} k_2 h + \dots + \beta_{rr-1} k_{r-1} h). \end{aligned}$$

Konstantas γ_i, α_i ir β_{ij} randame sulyginę (7.2) ir (7.3) lygybių dešinių pusiu koeficientus prie vienodų h laipsnių.

Atskirai išnagrinėsime kelis atvejus:

1. Tegu $r = 1$. Tada skirtumas

$$y(x_0 + h) - y(x_0) = \gamma_1 f(x_0, y_0)h.$$

Sulyginę su (7.2) formule gauname $\gamma_1 = 1$. Taigi yra teisinga formulė

$$y(x_0 + h) - y(x_0) \approx f(x_0, y_0)h,$$

kurios paklaida yra $O(h^2)$.

2. Tegu $r = 2$. Tada (7.3) formulę galima užrašyti taip

$$y(x_0 + h) - y_0 = (\gamma_1 k_1 + \gamma_2 k_2)h. \quad (7.4)$$

Norint sulyginti (7.2) ir (7.4) formulėse koeficientus prie vienodų h laipsnių, koeficientą k_2 skleidžiame Teiloro eilute

$$\begin{aligned} k_2 &= f(x_0 + \alpha_2 h, y_0 + \beta_{21} k_1 h) = \\ &= f(x_0, y_0) + \alpha_2 h f_x(x_0, y_0) + \beta_{21} k_1 h f_y(x_0, y_0) + \\ &+ \frac{1}{2} (\alpha_2^2 h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2\alpha_2 \beta_{21} k_1 h^2 f_{xy}(x_0, y_0) + \beta_{21} k_1^2 h^2 f_{yy}(x_0, y_0)) + \dots \end{aligned}$$

Šią išraišką įstatę į (7.4) formulę ir sulyginę koeficientus prie vienodų h laipsnių randame:

$$\begin{aligned}\gamma_1 + \gamma_2 &= 1 && \text{prie } h f(x_0, y_0), \\ \gamma_2 \alpha_2 &= 1/2 && \text{prie } h^2 f_x(x_0, y_0), \\ \gamma_2 \beta_{21} &= 1/2 && \text{prie } h^2 f_y(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Pastaroji sistema turi be galo daug sprendinių. Imdami $\alpha_2 = 1, \beta_{21} = 1$ gausime $\gamma_1 = 1/2, \gamma_2 = 1/2$. Šiuo atveju

$$y(x_0 + h) - y_0 = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)h;$$

čia

$$k_1 = f(x_0, y_0), \quad k_2 = f(x_0 + h, y_0 + k_1 h).$$

Imdami $\alpha_2 = 1/2, \beta_{21} = 1/2$ gausime $\gamma_2 = 1, \gamma_1 = 0$. Todėl

$$y(x_0 + h) - y_0 = k_2 h;$$

čia

$$k_1 = f(x_0, y_0), \quad k_2 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_1 h/2).$$

Abiem atvejais gautų formulų paklaida yra $O(h^3)$.

Tegu $r = 3$. Tada (7.3) formulė užsirašo taip

$$y(x_0 + h) - y_0 = (\gamma_1 k_1 + \gamma_2 k_2 + \gamma_3 k_3)h; \quad (7.5)$$

čia

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_0, y_0), \quad k_2 = f(x_0 + \alpha_2 h, y_0 + \beta_{21} k_1 h), \\ k_3 &= f(x_0 + \alpha_3 h, y_0 + \beta_{31} k_1 h + \beta_{32} k_2 h).\end{aligned}$$

Išskleidę koeficientus k_2 ir k_3 Teiloro eilute įstatome jų reikšmes į (7.5) formulę. Po to, sulyginame koeficientus prie vienodų h laipsnių su ir (7.2) formule. Tada gausime sistemą

$$\begin{cases} \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 1, \\ \gamma_1 \alpha_2 + \gamma_3 \alpha_3 = 1/2, \\ \gamma_2 \alpha_2^2 + \gamma_3 \alpha_3^2 = 1/3, \\ \gamma_3 \beta_{32} \alpha_2 = 1/6, \\ \alpha_2 = \beta_{21}, \\ \alpha_3 = \beta_{31} + \beta_{32}. \end{cases} \quad (7.6)$$

Fiksujotoms α_2 ir α_3 reikšmėms į antram, trečiam ir ketvirtam pastarosios sistemos lygtis galime žiūrėti kaip į trijų tiesinių algebrinių lygčių sistemą kintamujų γ_2 ir γ_3 atžvilgiu. Ji yra išsprendžiama, jeigu determinantas

$$\left| \begin{array}{ccc} \alpha_2 & \alpha_3 & 1/2 \\ \alpha_2^2 & \alpha_3^2 & 1/3 \\ 0 & \beta_{32} \alpha_2 & 1/6 \end{array} \right| = 0,$$

t.y. kai

$$\alpha_2 \alpha_3 (\alpha_3 - \alpha_2) - \beta_{32} \alpha_2^2 (2 - 3\alpha_2) = 0.$$

Iš (7.6) matome, kad $\gamma_3 \neq 0$, $\beta_{32} \neq 0$ ir $\alpha_2 \neq 0$. Todėl pastarąjį lygybę padaline į š α_2 gauname

$$\alpha_3(\alpha_3 - \alpha_2) - \beta_{32}\alpha_2(2 - 3\alpha_2) = 0.$$

Todėl iš pradžių galime koeficientus $\alpha_2, \alpha_3, \beta_{21}, \beta_{31}, \beta_{32}$ parinkti taip, kad jie tenkintų sistemą

$$\begin{cases} \alpha_2 = \beta_{21}, \\ \alpha_3 = \beta_{31} + \beta_{32}, \\ \alpha_3(\alpha_3 - \alpha_2) - \beta_{32}\alpha_2(2 - 3\alpha_2) = 0, \end{cases}$$

o, po to, koeficientus $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ rasti iš sistemos

$$\begin{cases} \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 1, \\ \gamma_2\alpha_2 + \gamma_3\alpha_3 = 1/2, \\ \gamma_3\beta_{32}\alpha_2 = 1/6. \end{cases}$$

Pavyzdžiui, tegu $\alpha_2 = \beta_{21} = 1/2, \alpha_3 = 1$. Tada $\beta_{32} = 2, \beta_{31} = -1, \gamma_3 = 1/6, \gamma_2 = 2/3, \gamma_1 = 1/6$ ir (7.5) formulę galime užrašyti taip

$$y(x_0 + h) - y_0 = \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)h; \quad (7.7)$$

čia

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0), \\ k_2 &= f(x_0 + h/2, y_0 + k_1 h/2), \\ k_3 &= f(x_0 + h, y_0 - k_1 h + 2k_2 h). \end{aligned}$$

Taigi parinkę kokį nors (7.6) sistemos sprendinį gausime (7.5) formulę su konkrečiomis koeficientų reikšmėmis, kurios paklaida yra $O(h^4)$.

P a s t a b o s :

- Galima parodyti, (žr., pavyzdžiui, [8]), kad, kai $r = 4$, yra teisinga formulė

$$y(x_0 + h) - y_0 = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h;$$

čia

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0), \quad k_2 = f(x_0 + h/2, y_0 + k_1 h/2), \\ k_3 &= f(x_0 + h/2, y_0 + k_2 h/2), \\ k_4 &= f(x_0 + h, y_0 + k_3 h), \end{aligned}$$

kurios paklaida yra $O(h^5)$. Pastaroji formulė yra viena iš dažniausiai naudojamų Rungė – Kuto formulų.

- Galima išvesti Rungė – Kuto formules kai $r \geq 5$. Tačiau jos yra gremėždiškos ir praktikoje retai naudojamos.

Taikant vieną ar kitą Rungė – Kuto formulę galima rasti ieškomos funkcijos reikšmę taške $x_0 + h$, t.y. $y(x_0 + h)$. Imdami pradinį tašką $x_1 = x_0 + h$ ir pradinę reikšmę $y_1 = y(x_0 + h)$, analogiškai galime gauti ieškomos funkcijos reikšmę kitame taške $x_1 + h$ ir t.t. Tęsdami tokius skaičiavimus gausime ieškomos funkcijos reikšmes taškuose $x_0 + kh, k = 1, 2, \dots$

7.2 RUNGE – KUTO METODAS PIRMOS EILĖS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SISTEMAI

Runge – Kuto metodą galima taikyti ir pirmos eilės diferencialinių lygčių sistemai. Konkretumo dėlei nagrinėsime Koši uždavinį dviejų pirmos eilės diferencialinių lygčių sistemai

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z), & y(x_0) = y_0, \\ z' = g(x, y, z), & z(x_0) = z_0. \end{cases} \quad (7.8)$$

Ieškomų funkcijų y ir z pokytį taškuose $x_0 + h$ ir x_0 ieškosime pavidalu

$$\begin{cases} y(x_0 + h) - y_0 = (\gamma_1 k_1 + \dots + \gamma_r k_r)h, \\ z(x_0 + h) - z_0 = (\gamma_1^* l_1 + \dots + \gamma_r^* l_r)h, \end{cases} \quad (7.9)$$

čia

$$\begin{aligned} k_i &= f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i), \quad l_i = g(\xi_i^*, \eta_i^*, \zeta_i^*), \\ \xi_i &= x_0 + \alpha_i h, \quad \alpha_1 = 0, \quad \xi_i^* = x_0 + \alpha_i^* h, \quad \alpha_1^* = 0, \\ \eta_i &= y_0 + \beta_{i1} k_1 h + \beta_{i2} k_2 h + \dots + \beta_{ii-1} k_{i-1} h, \\ \eta_i^* &= y_0 + \beta_{i1}^* k_1 h + \beta_{i2}^* k_2 h + \dots + \beta_{ii-1}^* k_{i-1} h, \\ \zeta_i &= y_0 + \delta_{i1} l_1 h + \delta_{i2} l_2 h + \dots + \delta_{ii-1} l_{i-1} h, \\ \zeta_i^* &= y_0 + \delta_{i1}^* l_1 h + \delta_{i2}^* l_2 h + \dots + \delta_{ii-1}^* l_{i-1} h, \end{aligned}$$

$i = 1, 2, \dots, r$. Pagal Teiloro formulę

$$\begin{aligned} y(x) - y(x_0) &\approx hy'(x_0) + \frac{h^2}{2!}y''(x_0) + \dots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}y^{(n+1)}(x_0), \\ z(x) - z(x_0) &\approx hz'(x_0) + \frac{h^2}{2!}z''(x_0) + \dots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}z^{(n+1)}(x_0). \end{aligned} \quad (7.10)$$

Funkcijų y ir z išvestines taške x_0 randame iš (7.8) sistemos

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= f(x_0, y_0, z_0), \quad z'(x_0) = g(x_0, y_0, z_0), \\ y''(x_0) &= f_x(x_0, y_0, z_0) + f_y(x_0, y_0, z_0)y'(x_0) + f_z(x_0, y_0, z_0)z'(x_0), \\ z''(x_0) &= g_x(x_0, y_0, z_0) + g_y(x_0, y_0, z_0)y'(x_0) + g_z(x_0, y_0, z_0)z'(x_0) \end{aligned}$$

ir t.t. Šias išvestinių reikšmes įstatome į (7.10) formulę. Gautoje ir (7.9) formulėse sulyginame koeficientus prie vienodų h laipsnių iki nario h^4 . Tada koeficientų $\alpha_i, \alpha_i^*, \beta_{ij}, \beta_{ij}^*, \delta_{ij}, \delta_{ij}^*$ ir γ_i, γ_i^* atžvilgiu gausime algebrinių lygčių sistemą (žr., pavyzdžiu, [9]). Pastaroji sistema yra simetrinė koeficientų $\alpha_i, \alpha_i^*, \beta_{ij}, \beta_{ij}^*, \delta_{ij}, \delta_{ij}^*$ ir γ_i, γ_i^* atžvilgiu. Todėl galime imti

$$\alpha_i = \alpha_i^*, \quad \beta_{ij} = \beta_{ij}^*, \quad \delta_{ij} = \delta_{ij}^*, \quad \gamma_i = \gamma_i^*.$$

ir, kai $r = 4$, Rungė – Kuto formules apibrėžti taip:

$$\begin{aligned} y(x_0 + h) - y_0 &= \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h, \\ z(x_0 + h) - z_0 &= \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)h; \end{aligned} \quad (7.11)$$

čia

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0, z_0), \quad l_1 = g(x_0, y_0, z_0), \\ k_2 &= f(x_0 + h/2, y_0 + k_1 h/2, z_0 + l_1 h/2), \\ l_2 &= g(x_0 + h/2, y_0 + k_1 h/2, z_0 + l_1 h/2), \\ k_3 &= f(x_0 + h/2, y_0 + k_2 h/2, z_0 + l_2 h/2), \\ l_3 &= g(x_0 + h/2, y_0 + k_2 h/2, z_0 + l_2 h/2), \\ k_4 &= f(x_0 + h, y_0 + k_3 h, z_0 + l_3 h), \quad l_4 = g(x_0 + h, y_0 + k_3 h, z_0 + l_3 h). \end{aligned}$$

Šiuo formuliu paklaida yra $O(h^5)$.

P a s t a b a . Analogiškos Ringė – Kuto formulės yra teisingos ir tuo atveju, kai lygčių skaičius yra didesnis už du.

7.3 RUNGE – KUTO METODAS AUKŠTESNĖS EILĖS PAPRASTAJAI DIFERENCIALINEI LYGČIAI

Kiekviena normalioji n -tos eilė paprastojo diferencialinė lygtis

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad y(x_0) = y_0 \quad (7.12)$$

susiveda į n pirmos eilės paprastųjų diferencialinių lygčių sistemą

$$\begin{cases} w' = f(x, y, u, \dots, v, w), \\ v' = w, \\ \dots \\ y' = u. \end{cases} \quad (7.13)$$

Todėl apytikslį n -tos eilės lyties sprendinį taip pat galima ieškoti Rungė – Kuto metodu. Be to, (7.13) sistemos dešiniosios pusės turi labai paprastą pavidalą. Todėl galima gauti paprastesnes Rungė – Kuto formules.

Paprastumo dėlei nagrinėsime Koši uždavinį antrosios eilės paprastajai diferencialinei lygčiai

$$y'' = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0.$$

Standartiniu būdu ji suvedame į Koši uždavinį dviejų pirmos eilės paprastųjų diferencialinių lygčių sistemai

$$\begin{cases} z' = f(x, y, z), \quad z(x_0) = z_0 := y'_0, \\ y' = z, \quad y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (7.14)$$

Sprendinių y ir z pokyčius ieškome pavidalu

$$\begin{aligned} y(x_0 + h) - y(x_0) &= (\gamma_1 k_1 + \gamma_2 k_2 + \gamma_3 k_3)h, \\ z(x_0 + h) - z(x_0) &= (\gamma_1^* l_1 + \gamma_2^* l_2 + \gamma_3^* l_3)h; \end{aligned} \quad (7.15)$$

čia

$$\begin{aligned} k_i &= f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i), \quad l_i = g(\xi_i^*, \eta_i^*, \zeta_i^*), \\ \xi_i &= x_0 + \alpha_i h, \quad \alpha_1 = 0, \quad \xi_i^* = x_0 + \alpha_i^* h, \quad \alpha_1^* = 0, \\ \eta_i &= y_0 + \beta_{i1} k_1 h + \beta_{i2} k_2 h + \dots + \beta_{ii-1} k_{i-1} h, \\ \eta_i^* &= y_0 + \beta_{i1}^* k_1 h + \beta_{i2}^* k_2 h + \dots + \beta_{ii-1}^* k_{i-1} h, \\ \zeta_i &= y_0 + \delta_{i1} l_1 h + \delta_{i2} l_2 h + \dots + \delta_{ii-1} l_{i-1} h, \\ \zeta_i^* &= y_0 + \delta_{i1}^* l_1 h + \delta_{i2}^* l_2 h + \dots + \delta_{ii-1}^* l_{i-1} h, \end{aligned}$$

$i = 1, 2, 3$. Sulyginę koeficientus prie vienodų h laipsnių (7.15) ir (7.10) formulėse

gausime sistemą

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \beta_{21} = \delta_{21}, & \alpha_2^* &= \beta_{21}^* = \delta_{21}^*, \\ \alpha_3 &= \beta_{31} + \beta_{32} = \delta_{31} + \delta_{32}, & \alpha_3^* &= \beta_{31}^* + \beta_{32}^* = \delta_{31}^* + \delta_{32}^*, \\ \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 &= 1, & \gamma_1^* + \gamma_2^* + \gamma_3^* &= 1, \\ \gamma_2 \alpha_2 + \gamma_3 \alpha_3 &= 1/2, & \gamma_2^* \alpha_2^* + \gamma_3^* \alpha_3^* &= 1/2, \\ \gamma_2 \alpha_2^2 + \gamma_3 \alpha_3^2 &= 1/3, & \gamma_2^* \alpha_2^{*2} + \gamma_3^* \alpha_3^{*2} &= 1/3, \\ \gamma_3 \beta_{32} \alpha_2 &= 1/6, & \gamma_3^* \delta_{32}^* \alpha_2^* &= 1/6, \\ \frac{\alpha_2^*}{\alpha} &= \frac{\beta_{32}}{\delta_{32}^*} = \frac{\beta_{32}^*}{\delta_{32}^*}. \end{aligned}$$

Koeficientai k_i ir l_i (7.14) sistemai gaunami tokie:

$$\begin{aligned} k_1 &= z_0, \quad l_1 = f(x_0, y_0, z_0), \\ k_2 &= z_0 + \delta_{21} h l_1, \quad l_2 = f(x_0 + \alpha_2^* h, y_0 + \beta_{21}^* h z_0, z_0 + \delta_{21}^* h l_1) \\ k_3 &= z_0 + \delta_{31} h l_1 + \delta_{32} h f(x_0 + \alpha_2^* h, y_0 + \beta_{21}^* h z_0, z_0 + \delta_{21}^* h l_1), \\ l_3 &= f(x_0 + \alpha_3^* h, y_0 + \alpha_3^* h z_0 + \beta_{32}^* \delta_{21} h^2 l_1, z_0 + \delta_{31}^* h l_1 \\ &\quad + \delta_{32}^* h f(x_0 + \alpha_2^* h, y_0 + \beta_{21}^* h z_0, z_0 + \delta_{21}^* h l_1)), \end{aligned}$$

o ieškomų funkcijų pokyčiai

$$\begin{aligned} y(x_0 + h) - y(x_0) &= (\gamma_1 k_1 + \gamma_2 k_2 + \gamma_3 k_3) h = h z_0 + h^2 \{(\gamma_2 \delta_{21} + \gamma_3 \delta_{31}) l_1 + \\ &\quad \gamma_3 \delta_{32} f(x_0 + \alpha_2^* h, y_0 + \beta_{21}^* h z_0, z_0 + \gamma_{21}^*) h l_1\} \\ z(x_0 + h) - z(x_0) &= (\gamma_1^* l_1 + \gamma_2^* l_2 + \gamma_3^* l_3) h. \end{aligned}$$

Imdami čia

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \alpha_2^* = \beta_{21} = \beta_{21}^* = \delta_{21} = \delta_{21}^* = 1/3, \\ \alpha_3 &= \alpha_3^* = \beta_{32} = \beta_{32}^* = \delta_{32} = \delta_{32}^* = 2/3, \\ \beta_{31} &= \beta_{31}^* = \delta_{31} = \delta_{31}^* = 0, \\ \gamma_3 &= \gamma_3^* = 3/4, \quad \gamma_2 = \gamma_2^* = 0, \quad \gamma_1 = \gamma_1^* = 1/4 \end{aligned}$$

gausime

$$\begin{aligned} y(x_0 + h) - y(x_0) &= h z_0 + \frac{1}{2} h^2 f(x_0 + h/3, y_0 + h z_0/3, z_0 + h l_1/3) \\ z(x_0 + h) - z(x_0) &= h l_1/4 + \frac{3}{4} h f(x_0 + 2h/3, y_0 + 2h z_0/3 + \frac{2}{9} h^2 l_1, \\ &\quad z_0 + \frac{2}{3} h f(x_0 + h/3, y_0 + h z_0/3, z_0 + h l_1/3)). \end{aligned}$$

Pastarujų formulių tikslumas yra eilės h^4 .

Analogiškas Rungė – Kuto formules galima gauti parinkus kitokias koeficientų reikšmes. Be to, (7.14) sistemai spręsti galima naudoti formules gautas nagrinėjant bendro pavidalo pirmos eilės paprastujų diferencialinių lygčių sistemą (žr., pavyzdžiui, (7.11) formulę).

7.4 BAITINIŲ SKIRTUMŲ METODAS ELIPSIŅIĖS LYGTIES ATVEJU

Baitinių skirtumų metodo esmė yra tokia. Sritis, kurioje sprendžiama diferencialinė lygtis, yra padengiama tinklu ir tinklo linijų susikirtimo taškuose diferencialinė lygtis keičiamā skirtumine. Tinklo linijų susikirtimo su srities kontūru (paviršiumi) taškuose kraštines sąlygas keičiamė i skirtumines sąlygas. Rezultate gauname skirtuminių lygčių sistemą. Sprendžiant šią sistemą reikia išsiaiškinti ar ji turi sprendinį ir ar rastas sprendinys yra vienintelis. Be to, reikia dar pasirinkti sistemos sprendimo metodą ir išsiaiškinti ar rastas sprendinys yra artimas tikrajam diferencialinės lygties sprendiniui.

Apréžtoje srityje $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ su kontūru Γ nagrinėsime elipsinę lygtį

$$L(u) := au_{xx} + bu_{yy} + pu_x + qu_y + du = f(x, y); \quad (7.16)$$

čia koeficientai a, b, p, q, d ir f yra žinomos tolydžios srityje Ω funkcijos. Be to, koeficientai a ir b yra teigiami (elpsiškumo sąlyga).


Tarkime tinklą sudaro dvi tiesių šeimos

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ih, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \\ y &= y_0 + jl, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \end{aligned}$$

Tašką $(x_0 + ih, y_0 + jl)$ žymėsime (x_i, y_j) arba tiesiog (i, j) , o funkcijos u reikšmes šiame taške – u_{ij} , t.y.

$$u_{ij} = u(x_i, y_j).$$


Taškai $(i \pm 1, j), (i, j \pm 1)$ yra vadinami taško (i, j) gretimais taškais (žr. 7.1 pav.).



7.1 pav.

Visumą tinklo taškų, kurie priklauso aibei $\Omega \cup \Gamma$ žymėsime raide $\tilde{\Omega}$. Tinklo taškus, kurių visi gretimi taškai priklauso $\tilde{\Omega}$, vadinsime vidiniais ir žymėsime $\check{\tilde{\Omega}}$. Tinklo tašką, kurio bent vienas gretimas taškas nepriklauso $\tilde{\Omega}$ vadinsime kontūriniu tinklo tašku. Visumą kontūrinių tinklo taškų žymėsime $\tilde{\Gamma}$ (žr. 7.2

pav.).



7.2 pav.

Kiekviename vidiniame tinklo $\tilde{\Omega}$ taške (i, j) ieškomos funkcijos išvestines u_x , u_y , u_{xx} ir u_{yy} pakeiskime, atitinkamai, skirtumais

$$\frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h}, \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2l}, \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2}, \frac{u_{ij+1} - 2u_{ij} + u_{ij-1}}{l^2}.$$


Istatę šias išvestinių reikšmes į (7.16) lygtį taške (i, j) gausime skirtuminę lygtį

$$\begin{aligned} \tilde{L}(u_{ij}) := & a_{ij} \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2} + b_{ij} \frac{u_{ij+1} - 2u_{ij} + u_{ij-1}}{l^2} + \\ & p_{ij} \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h} + q_{ij} \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2l} + d_{ij} u_{ij} = f_{ij}. \end{aligned} \quad (7.17)$$

Galima parodyti (žr., pavyzdžiui, [9]), kad tokios aproksimacijos paklaida yra didis eilės $O(h^2)$, jeigu $h/l = const$.

Sudarant skirtuminę lygtį kiekvieną ieškomos funkcijos išvestinę pakeitėme atitinkamu skirtumu. Tačiau yra galimas ir kitas skirtuminės lygties sudarymo būdas. Jo esmė yra tame, kad visą diferencialinę išraišką keičiame skirtuminę išraišką su neapibrėžtais koeficientais.

Imkime n tinklo taškų, supančių tašką (i, j) . Tašką (i, j) pažymėkime 0, o jų supančius tinklo taškus 1, 2, ..., n . Pavyzdžiui, kai $n = 4$, tašką 0 supančius taškus 1, 2, 3, 4 galima imti taip kaip pavaizduota 7.3 paveikslėlyje.



7.3 pav.

Funkcijos u reikšmę taške j pažymėkime u_j . Sudarykime tiesinį darinį

$$\sum_{j=0}^n c_j u_j.$$

Išskleiskime u_j Teiloro formulės pagalba taško 0 aplinkoje ir gautas u_j reikšmes įstatykime į šį darinį. Tada surinkę koeficientus prie vienodų funkcijos u išvestinių, gausime

$$\sum_{j=0}^n c_j u_j = \sum_{i+k \leq n} \gamma_{ik} \left(\frac{\partial^{i+k} u}{\partial x^i \partial y^k} \right)_0 + R; \quad (7.18)$$

čia R liekamas narys. Jeigu funkcijos u išvestinės iki $n+1$ eilės imtinai yra aprėžtos, tai $R = O(h^{n+1})$, h – mažiausias atstumas tarp taškų 0 ir $1, 2, \dots, n$. Atkreipsime dėmesį į tai, kad koeficientai γ_{ik} tiesiškai išsireiškia per c_j . Neapibrėžtinius koeficientus c_j parenkame taip, kad (7.18) formulės dešinė pusė kuo labiau sutaptų su diferencialinio Lu reiškinio taške 0. Sulyginę koeficientus prie ieškomos funkcijos ir jos pirmos bei antros eilės išvestinių, gausime

$$\gamma_{00} = d_0, \gamma_{10} = p_0, \gamma_{01} = q_0, \gamma_{20} = 1_0, \gamma_{02} = b_0, \gamma_{11} = 0.$$

Kadangi nagrinėjama lygtis yra antros eilės lygtis, tai koeficientai $\gamma_{ik} = 0$, kai $i+k > 2$. Jeigu koeficientus c_j parinkti taip galima, tai iš (7.18) formulės gauname, kad

$$\sum_{j=0}^n c_j u_j = (Lu)_0 + R$$

ir diferencialinę lygtį taške 0 galima pakeisti skirtumine lygtimi

$$\sum_{j=0}^n c_j u_j = f_0.$$

Vienas iš šio metodo privalumu yra tas, kad vietoje stačiakampio tinklo galima imti ir kitokį tinklą (pavyzdžiu, taisiklingų trikampių arba taisiklingų šešekampių).

Išnagrinėsime šį metodą Puasono lygties

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = f(x, y) \quad (7.19)$$

atveju. Tarkime, tinklas yra kvadratinis ir imame keturis tašką 0 supančius taškus 1, 2, 3, 4 (žr. 7.3 pav.). Sukeitę Laplaso operatoriuje kintamuosius x ir y gausime Laplaso operatorių. Be to, tinklo taškai 1, 2, 3, 4 yra išsidėstę simetriškai taško 0 atžvilgiu. Todėl tiesiniame darinyje

$$\tilde{\Delta} u := \sum_{j=0}^n c_j u_j$$

galime imti $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 := c$. Išskleidę u_j Teiloro formule taško 0 aplinkoje, gausime

$$\begin{aligned} u_1 &:= u(x_0 + h, y_0 + h) = u_0 + \left(hD_+ u + \frac{h^2}{2!} D_+^2 u + \frac{h^3}{3!} D_+^3 u + \frac{h^4}{4!} D_+^4 u + \dots \right)_0 \\ u_2 &:= u(x_0 + h, y_0 - h) = u_0 + \left(hD_- u + \frac{h^2}{2!} D_-^2 u + \frac{h^3}{3!} D_-^3 u + \frac{h^4}{4!} D_-^4 u + \dots \right)_0 \\ u_3 &:= u(x_0 - h, y_0 - h) = u_0 - \left(hD_+ u - \frac{h^2}{2!} D_+^2 u + \frac{h^3}{3!} D_+^3 u - \frac{h^4}{4!} D_+^4 u + \dots \right)_0 \\ u_4 &:= u(x_0 - h, y_0 + h) = u_0 - \left(hD_- u - \frac{h^2}{2!} D_-^2 u + \frac{h^3}{3!} D_-^3 u - \frac{h^4}{4!} D_-^4 u + \dots \right)_0 \end{aligned}$$

Čia operatoriai

$$D_+ = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}, \quad D_- = \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}.$$

Istatę šias reikšmes į tiesinį darinį randame

$$\tilde{\Delta}u := c_0 u_0 + 4cu_1 + \left(2 \frac{ch^2}{2!} (D_+^2 + D_-^2)u + 2 \frac{ch^4}{4!} (D_+^4 + D_-^4)u + \dots \right)_0$$

Konstantas c_0 ir c parenkame taip, kad šis reiškinys aproksimuotų Laplaso operatorių, t.y. reikalaujame, kad

$$c_0 + 4c = 0, \quad 2ch^2 = 1, \quad \Rightarrow c = \frac{1}{2h^2}, \quad c_0 = -\frac{2}{h^2}.$$

Tada


$$(\Delta u)_0 \approx \frac{1}{2h^2} (u_1 + u_2 + u_3 + u_4 - 4u_0)$$

ir Puasono lygtį galima pakeisti skirtumine lygtimi

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 - 4u_0 = 2h^2 f_0.$$

Tokios aproksimacijos paklaida yra $O(h^2)$.

Tegu $n = 8$, tinklas yra kvadratinis ir taškų išsidėstimas yra pavaizduotas 7.4 paveikslėlyje.



7.4 pav.

Tada Puasono lygties skirtuminę aproksimaciją galima ieškoti pavidalu

$$L_0 := \sum_{j=0}^8 c_j u_j = c_0 u_0 + c_1(u_1 + u_2 + u_3 + u_4) + c_2(u_5 + u_6 + u_7 + u_8).$$

Išskleidę u_j Teiloro foormule taško 0 aplinkoje, gausime

$$\begin{aligned} L_0 = & (c_0 + 4c_1 + 4c_2)u_0 + h^2(c_1 + 2c_2)(u_{xx} + u_{yy})_0 + \\ & \frac{h^4}{12}(c_1 + 2c_2)(u_{x^4} + u_{y^4})_0 + c_2 h^4 (u_{x^2 y^2})_0 + \\ & \frac{2h^6}{6!}(u_{x^6} + u_{y^6})_0 + \frac{h^6}{12}c_2(u_{x^4 y^2} + u_{x^2 y^4})_0 + \dots \end{aligned} \quad (7.20)$$

Tam, kad reiškinys L_0 aproksimuotų Laplaso operatorių reikia koeficientus c_0, c_1 ir c_2 apibrėžti taip, kad

$$c_0 + 4c_1 + 4c_2 = 0, \quad h^2(c_1 + 2c_2) = 1.$$

Akivaizdu, kad tokią aproksimaciją yra be galio daug. Todėl iš visų tokių aproksimacijų reikia pasirinkti tokią, kuri kuo tiksliau aproksimuotų Laplaso operatorių. Jeigu Laplaso operatorių du kartus diferencijuosime pagal kintamąjį x , po to du kartus pagal kintamąjį y ir gautus reiškinius sudėsime, tai gausime reiškinį

$$\Delta^2 u = (u_{x^4} + u_{y^4}) + 2u_{x^2 y^2}.$$

Gautame reiškinyje koeficientas prie mišrios išvestinės yra du kartus didesnis už koeficientą prie vienodų išvestinių sumos. Pareikalavę, kad ši sąlyga būtų patenkinta (7.20) formulėje, gausime

$$c_2 = \frac{1}{6h^2}, \quad c_1 = \frac{2}{3h^2}, \quad c_0 = -\frac{10}{3h^2}.$$

Kadangi

$$(\Delta u)_0 = (u_{xx} + u_{yy})_0 = f_0,$$

tai

$$L_0 = f_0 + \frac{h^2}{12}(\Delta f)_0 + \frac{2h^4}{6!}(f_{x^4} + 4f_{x^2 y^2} + f_{y^4})_0 + \dots$$

ir Puasono lygtį galima pakeisti tokia skirtumine lygtimi

$$\begin{aligned} \frac{4(u_1 + u_2 + u_3 + u_4) + (u_5 + u_6 + u_7 + u_8) - 20u_0}{6h^2} = \\ f_0 + \frac{h^2}{12}(\Delta f)_0 + \frac{2h^4}{6!}(f_{x^4} + 4f_{x^2 y^2} + f_{y^4})_0 \end{aligned} \quad (7.21)$$

Šios aproksimacijos paklaida yra $O(h^6)$. Tačiau pastarają formulę galima taikyti tik tada, kai funkcija f yra pakankamai paprasta. Priešingu atveju (7.21) formulės dešinėje lygybės pusėje narij prie h^4 atmetame, o narij $(\Delta f)_0$ pakeičiame skirtumine išraiška

$$\frac{1}{h^2}(f_1 + f_2 + f_3 + f_4 - 4f_0).$$

Rezultate gauname Puasono lygties skirtuminę lygtį


$$\begin{aligned} \frac{4(u_1 + u_2 + u_3 + u_4) + (u_5 + u_6 + u_7 + u_8) - 20u_0}{6h^2} = \\ \frac{1}{12}(f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + 8f_0), \end{aligned} \quad (7.22)$$

kurios aproksimacijos tikslumas yra eilės $O(h^4)$.

Tarkime dabar, taškas 0 yra kontūrinis tinklo taškas. Kraštinės sąlygos aproksimavimas kontūriname tinklo taške priklauso nuo kraštinės sąlygos tipo. Iš pradžių nagrinėkime Dirichlė uždavinį, t.y. (7.16) lygti kartu su pirmaja kraštine sąlyga

$$u|_{\Gamma} = \varphi(x, y). \quad (7.23)$$

Kadangi 0 yra kontūrinis tinklo taškas, tai egzistuoja du gretutiniai taškai 1 ir 2, esantis vienoje tinklo tiesėje tokie, kad taškas 1 yra srityje Ω , o taškas 2 tiesės ir kontūro Γ sankirtoje (žr. 7.5 pav.).



7.5 pav.

Tegu δ yra atstumas tarp taškų 0 ir 2, o h atstumas tarp taškų 0 ir 1. Interpoluodami funkcijos u reikšmes taškuose 1 ir 2 randame funkcijos u reikšmę taške 0, t.y.


$$u_0 = \frac{\delta}{\delta + h} u_1 + \frac{h}{\delta + h} u_2.$$

Tokios aproksimacijos paklaida yra eilės $O(h^2)$.

Pabaigoje pateiksime vieną būdą, kaip pakeisti Noimano kraštinę sąlygą

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_{\Gamma} = \varphi(x, y)$$

skirtumine. Tegu 0 yra kontūrinis tinklo taškas. Kontūre Γ randame tašką 0^* tokį, kad iš jo išeinanti normalė eitų per tašką 0. Pasirenkame kokius nors du vidinius ar kontūrinius tinklo taškus 1 ir 2 tokius, kad tiesės l_1 , l_2 einančios per taškus 0, 1 ir 0, 2 yra statmenos (žr. 7.6 pav.).



7.6 pav.

Tada

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial l_1} \cos \varphi_0 + \frac{\partial u}{\partial l_2} \sin \varphi_0 \approx \frac{u_1 - u_0}{h_1} \cos \varphi_0 + \frac{u_2 - u_0}{h_2} \sin \varphi_0;$$

čia kampus tarp normalės \mathbf{n} ir tiesės l_2 , h_1 ir h_2 – atstumai tarp taškų 0, 1 ir 0, 2. Todėl Noimano krašinę sąlygą kontūriname taške 0 galima pakeisti skirtumine lygtimi

$$\frac{u_1 - u_0}{h_1} \cos \varphi_0 + \frac{u_2 - u_0}{h_2} \sin \varphi_0 = \varphi_0.$$

P a s t a b a . Analogišką skirtuminę lygtį galima parašyti ir trečios kraštinės sąlygos atveju.

Parašę skirtumines lygtis kiekviename vidiniame tinklo taške ir prie jų prijungę skirtumines lygtis kontūriniuose tinklo taškuose, gausime tiesinių algebrinių lygčių sistemą, kurioje lygčių skaičius sutampa su nežinomujų skaičiumi (t.y. su vidinių ir kontūrinių taškų skaičiumi). Dirichlė uždavinio atveju galima parodyti, kad visos gautos skirtuminių lygčių sistemos turi vienintelį sprendinį, jei tik nagrinėjamas tinklas yra pakankamai smulkus. Noimano uždavinio atveju sprendinio egzistavimas ir vienatis priklauso nuo papildomų sąlygų.

7.5 BAITINIŲ SKIRTUMŲ METODAS PARABOLINĖS LYGTIES ATVEJU

Nagrinėsime parabolinę lygtį

$$L(u) := u_t - a^2 u_{xx} + bu_x + cu = f(x, t), \quad (7.24)$$

kurioje koeficientai a, b, c ir f yra žinomas tolydžios kintamųjų x ir t funkcijos, $a \neq 0$. Koši uždavinys šiai lygčiai formuluojamamas taip. Pusplokštumėje

$$\mathbb{R}_+^2 = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t > 0\}$$

reikia rasti (7.24) lyties sprendinį, tenkinanti pradinę sąlygą

$$u|_0 = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

φ – žinoma funkcija.

Imkime stačiakampį tinklą, kurio viršūnės (i, j) yra tiesių

$$\begin{aligned} x &= ih, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \\ t &= jl, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \end{aligned}$$

sankirtos taškai. Kiekviename taške $(i, j), j \geq 1$ išvestines u_x ir u_{xx} galime pakeisti skirtumais

$$\frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h}, \text{ ir } \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2}.$$

Išvestinę u_t taške (i, j) galima pakeisti vienu iš skirtumu


$$\frac{u_{ij+1} - u_{ij}}{l}, \quad \frac{u_{ij} - u_{ij-1}}{l}, \quad \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2l}.$$

Taigi (7.24) diferencialinę lygtį taške (i, j) galima pakeisti viena iš skirtuminių lygčių

$$\begin{aligned} L_1(u_{ij}) &:= \frac{u_{ij+1} - u_{ij}}{l} - a_{ij} \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2} + \\ &\quad b_{ij} \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h} + c_{ij} u_{ij} = f_{ij}, \\ L_2(u_{ij}) &:= \frac{u_{ij} - u_{ij-1}}{l} - a_{ij} \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2} + \\ &\quad b_{ij} \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h} + c_{ij} u_{ij} = f_{ij}, \\ L_3(u_{ij}) &:= \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2l} - a_{ij} \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2} + \\ &\quad b_{ij} \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h} + c_{ij} u_{ij} = f_{ij}. \end{aligned} \quad (7.25)$$

Pirmaoji skirtuminė lygtis aproksimuoja diferencialinę lygtį tikslumu $O(l+h^2)$ ir joje yra ieškomos funkcijos u reikšmės keturiose tinklo taškuose (žr. 7.7 pav.).

Antroji skirtuminė lygtis taip pat aproksimuojama diferencialinę lygtį tikslumu $O(l + h^2)$ ir šioje lygtyste ieškomos funkcijos u reikšmės yra apibrėžtos keturiose tinklo taškuose (žr. 7.8 pav.). Trečioji skirtuminė lygtis aproksimuojama diferencialinę lygtį tikslumu $O(l^2 + h^2)$ ir ieškomos funkcijos u reikšmės yra apibrėžtos penkiose tinklo taškuose (žr. 7.9 pav.).



Tinklo taškuose $(i, 0)$ ieškomos funkcijos u reikšmės

$$u_{i0} = \varphi(ih) := \varphi_i, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Pirmoji ir trečioji skirtuminės schemas vadinamos išreikštiniemis, o antroji – neišreikštine.

Puasono lygties

$$u_{tt} - u_{xx} = 0$$

atveju gautas skirtumines lygtis galima perrašyti taip:

$$\begin{aligned} u_{ij+1} &= (1 - 2\alpha)u_{ij} + \alpha(u_{i+1j} + u_{i-1j}), \\ (1 + 2\alpha)u_{ij} - \alpha(u_{i+1j} + u_{i-1j}) &= u_{ij-1}, \\ u_{ij+1} &= 2\alpha(u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}) + u_{ij-1}; \end{aligned} \quad (7.26)$$

čia $\alpha = l/h^2$. Koeficientą α geriausiai parinkti taip, kad gautos skirtuminės lygtys būtų kuo paprastesnės. Nagrinėjamu atveju geriausiai imti $\alpha = 1/2$. Tada gausime tokias tris skirtumines lygtis

$$\begin{aligned} u_{ij+1} &= \frac{1}{2}(u_{i+1j} + u_{i-1j}), \\ 4u_{ij} - (u_{i+1j} + u_{i-1j}) &= 2u_{ij-1}, \\ u_{ij+1} &= u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j} + u_{ij-1}. \end{aligned} \quad (7.27)$$

Praktiniams skaičiavimams geriausiai tinka pirmoji shema. Iš pradžių, naujodant pradines sąlygas, randame funkcijos u reikšmes taškuose $i, 1$, po to naujodant šias reikšmes randamos funkcijos u reikšmės taškuose $i, 2$ ir t.t. Naudojant antrąją schemą reikia spręsti lygčių sistemą. Naudojant trečiąją schemą iš pradžių, kokiui nors būdu reikia rasti funkcijos u reikšmes taškuose $(i, 1)$ Kituose taškuose funkcijos u reikšmės jau randamos lengvai. Tačiau pastaruoju atveju paklaida, atsiradusi kokiame nors žingsnyje pereinant nuo vieno sluoksnio prie kito, kaupiasi, didėja ir po keliu žingsnių visiškai iškreipia sprendinį. Todėl praktikoje ji nenaudojama, nors pastaroji schema diferencialinę lygtį aproksimuojataikliau už kitas dvi. Taigi skaičiuojant vienoms skirtuminėms schemoms paklaidos gali kaupktis ir didėti, o kitoms ne.

Skirtuminė schema vadinama *stabilia*, jeigu skaičiavimo paklaida, pereinant nuo vieno sluoksnio prie kito nedidėja. Priešingu atveju skirtuminė schema vadinama *nestabilia*. Galima parodyti, kad Puasono lygties atveju pirmoji iš (7.27) skirtuminių schemų yra stabili, o trečioji ne.

Mišrusis kraštinis uždavinys (7.24) lygtiai formuluojamas taip. Rasti funkciją u , kuri cilindre

$$Q_T = \{(x, t) : x \in (a, b), t \in (0, T)\}$$

tenkintų (7.24) lygtį, taške $t = 0$ pradinę sąlygą

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in [a, b],$$

o intervalo (a, b) kraštiniose taškuose vieną iš kraštiniių sąlygų¹

$$\begin{aligned} u|_{x=a} &= \mu(t), \quad u|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T], \\ u_x|_{x=a} &= \mu(t), \quad u_x|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T], \\ (u_x + \alpha u)|_{x=a} &= \mu(t), \quad (u_x + \beta u)|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T]. \end{aligned} \quad (7.28)$$

Kadangi lygtis yra sprendžiama stačiakampyje Q_T , tai patogu imti stačiakampi tinklą, kurio viršūnės yra tiesių

$$x = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N, \quad N = (b - a)/h,$$

$$t = jl, \quad j = 0, 1, 2, \dots, M, \quad M = T/l$$

sankirtos taškai. Taškus, kurie yra tiesėse $x = a, x = b$ ir $t = 0$ vadinsime kontūriniais, o likusius cilindro Q_T taškus – vidiniai. Jeigu taškas (i, j) yra vidinis cilindro Q_T taškas, tai (7.24) lygtį šiame taške galima pakeisti viena iš (7.25) skirtuminių lygčių. Jeigu taškas (i, j) yra tiesėje $t = 0$, tai funkcijos u reikšmės taške $(i, 0)$ apibrėžiamos taip:

$$u_{i0} = \varphi_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

Kraštiniose taškuose $x = a$ ir $x = b$ išvestinę u_x keičiame, atitinkamai, skirtu maiš

$$\frac{u_{1j} - u_{0j}}{h} \quad \text{ir} \quad \frac{u_{Nj} - u_{Nj-1}}{h}.$$

Taigi galima sudaryti tris skirtinges nagrinėjamo uždavinio sprendimo schemas:

$$\begin{cases} L_k u_{ij} = f_{ij}, & i = 1, 2, \dots, N-1, j = 0, 1, \dots, M-1, \\ u_{i0} = \varphi_i, & i = 1, 2, \dots, N, \\ l_a u_{0j} = \mu_j, & l_b u_{Nj} = \nu_j, \quad j = 0, 1, \dots, M, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3; \quad (7.29)$$

čia l_a ir l_b yra operatoriai, aproksimuojantis kraštines sąlygas taškuose a ir b . Pavyzdžiu, trečios kraštinės sąlygos atveju

$$l_a u_{0j} = \frac{u_{1j} - u_{0j}}{h} + \alpha u_{0j}, \quad l_b u_{Nj} = \frac{u_{Nj} - u_{N-1j}}{h} + \beta u_{Nj}.$$

¹Skirtingose intervalo (a, b) kraštiniose taškuose galima imti skirtinges kraštines sąlygas.

Homogeninės šilumos laidumo lygties atveju gautas tris skirtumines schemas galima perrašyti taip:

$$\begin{cases} u_{ij+1} = (1 - 2\alpha)u_{ij} + \alpha(u_{i+1j} + u_{i-1j}), & i = 1, \dots, N-1, j = 0, \dots, M-1, \\ u_{i0} = \varphi_i, & i = 1, 2, \dots, N, \\ l_a u_{0j} = \mu_j, \quad l_b u_{Nj} = \nu_j, & j = 0, 1, \dots, M, \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1 + 2\alpha)u_{ij} - \alpha(u_{i+1j} + u_{i-1j}) = u_{ij-1}, & i = 1, \dots, N-1, j = 0, \dots, M-1, \\ u_{i0} = \varphi_i, & i = 1, 2, \dots, N, \\ l_a u_{0j} = \mu_j, \quad l_b u_{Nj} = \nu_j, & j = 0, 1, \dots, M, \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{ij+1} = 2\alpha(u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}) + u_{ij-1}, & i = 1, \dots, N-1, j = 0, \dots, M-1, \\ u_{i0} = \varphi_i, & i = 1, 2, \dots, N, \\ l_a u_{0j} = \mu_j, \quad l_b u_{Nj} = \nu_j, & j = 0, 1, \dots, M; \end{cases}$$

čia $\alpha = l/h^2$.

P a s t a b a . Visose trijose schemose kraštinių sąlygų aproksimacijos paklaida yra $O(h)$. Norint padidinti kraštinių sąlygų aproksimacijos tikslumą galima prie tinklo prijungti dar dvi tieses $x = a - h$ ir $x = a + (N + 1)h$. Tada prie tinklo taškų prisiđeš taškai $(-1, j)$, $(N + 1, j)$ ir išvestinę u_x taškuose $(0, j)$, (N, j) galima aproksimuoti taip:

$$\frac{u_{1j} - u_{-1j}}{2h}, \quad \frac{u_{N+1j} - u_{N-1j}}{2h}.$$

Tokios aproksimacijos paklaida yra $O(h^2)$. Tačiau padidėjus tinklo viršūnių skaičiui padidėja nežinomųjų ir lygčių skaičius. Trukstamas lygtis gausime parašę diferencialinės lygties skirtuminę lygtį taškuose $(0, j)$ ir (N, j) .

Pasiekti kraštinių sąlygų aproksimavimo tikslumą $O(h^2)$ galima ir kitaip. Sudarant skirtuminę tinklą vietoj tiesių $x = a + ih$ galima imti tieses $x = a + ih - h/2$, $i = 0, 1, \dots, N+1$. Tada tiesės $x = a$ ir $x = b$ jau nebūs tinklo tiesės ir funkcijos u reikšmes kraštiniuose taškuose $x = a$, $x = b$ galima aproksimuoti, atitinkamai, taip:

$$\frac{u_{1j} + u_{0j}}{2}, \quad \frac{u_{N+1j} + u_{Nj}}{2},$$

o išvestinės u_x reikšmes taip:

$$\frac{u_{1j} - u_{0j}}{h}, \quad \frac{u_{N+1j} - u_{Nj}}{h}.$$

Sakysime, skirtuminė schema yra išreikštinė, jeigu sudarant skirtuminę lygtį imami tinklo taškai yra išsidėstę taip, kad viršutinėje eilutėje yra tik vienas taškas. Kitaip tariant išreikštinėje schemaje nežinomajį su didžiausiu j indeksu

galima išreikšti nežinomaisiais su indeksais $j - 1$, $j - 2$ ir t.t. Priešingu atveju, kai viršutinėje eilutėje yra daugiau nei vienas taškas, skirtuminė schema vadina ma neišreikštine. Taigi pirmoji ir trečioji iš (7.29) schemų yra išreikštine, o antroji – neišreikštine. Aišku, kad sistemas, sudarytas naudojant išreikštine schema, spręsti yra žymiai paprasčiau. Tačiau čia, kaip ir Koši uždavinio atveju, pasirenkant sprendimo schema iš pradžių reikia išsiaiškinti ar ji yra stabili ar ne.

7.6 BAITINIŲ SKIRTUMŲ METODAS HIPERBOLINĖS LYGTIES ATVEJU

Nagrinėsime hiperbolinę lygtį

$$L(u) := u_{tt} - au_{xx} + bu_x + cu_t + qu = f(x, t), \quad (7.30)$$

kurioje koeficientai a, b, c, q ir f yra žinomos tolydžios kintamųjų x ir t funkcijos, $a \neq 0$ (hiperbolikumo sąlyga). Koši uždavinys šiai lygčiai formuluojamamas taip. Pusplokštumėje

$$\mathbb{R}_+^2 = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t > 0\}$$

reikia rasti (7.30) lyties sprendinį, tenkinanti pradines sąlygas

$$u|_0 = \varphi(x), \quad , u_t|_0 = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (7.31)$$

φ ir ψ – žinomos funkcijos.

Čia, kaip ir parabolinės lyties atveju, pusplokštumę \mathbb{R}_+^2 padengiame stačiakampiu tinklu, kurio viršūnės (i, j) yra tiesių

$$\begin{aligned} x &= ih, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \\ t &= jl, \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \end{aligned}$$


sankirtos taškai. Kiekviename taške $(i, j), j \geq 1$ išvestines u_t , u_x , u_{tt} ir u_{xx} galime pakeisti, atitinkamai, skirtumais

$$\frac{u_{ij+1} - u_{ij}}{2l}, \quad \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h}, \quad \frac{u_{ij+1} - 2u_{ij} + u_{ij-1}}{l^2}, \quad \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2}.$$

Taigi (7.30) diferencialinę lygtį taske (i, j) galima pakeisti skirtumine lygtimi

$$\begin{aligned} \tilde{L}(u_{ij}) := & \frac{u_{ij+1} - 2u_{ij} + u_{ij-1}}{l^2} - a_{ij} \frac{u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}}{h^2} + \\ & b_{ij} \frac{u_{i+1j} - u_{i-1j}}{2h} + c_{ij} \frac{u_{ij+1} - u_{ij-1}}{2l} + q_{ij} u_{ij} = f_{ij}, \end{aligned} \quad (7.32)$$

Pastaroji skirtuminė lygtis aproksimuojant diferencialinę lygtį tikslumu $O(l^2 + h^2)$ ir joje yra ieškomos funkcijos u reikšmės penkiose tinklo taškuose (žr. 7.10 pav.).



7.10 pav.

Tiesėje $t = 0$, t.y. tinklo taškuose $(i, 0)$ pirmąją pradinę salygą keičiame tokia

$$u_{i0} = \varphi(ih) := \varphi_i, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Antrą pradinę sąlygą galima pakeisti skirtumu

$$\frac{u_{i1} - u_{i0}}{l} = \psi(ih) := \psi_i, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Tokios aproksimacijos paklaida yra $O(l)$. Norint padidinti aproksimavimo tikslumą galima antrą pradinę sąlygą pakeisti skirtumu

$$\frac{u_{i1} - u_{i-1}}{2l} = \psi(ih) := \psi_i, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Tokios aproksimacijos paklaida yra $O(l^2)$. Tačiau šiuo atveju reikia dar papildomai parašyti (7.30) diferencialines lygties skirtumines lygtis tinklo taškuose $(i, 0)$.

Mišrusis kraštinius uždavinys (7.30) lygčiai formuluojamamas taip. Rasti funkciją u , kuri cilindre

$$Q_T = \{(x, t) : x \in (a, b), t \in (0, T)\}$$

tenkintų (7.30) lygtį, taške $t = 0$ pradines sąlygas

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in [a, b], \quad (7.33)$$

o intervalo (a, b) kraštiniose taškuose vieną iš kraštinių sąlygų¹

$$\begin{aligned} u|_{x=a} &= \mu(t), \quad u|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T], \\ u_x|_{x=a} &= \mu(t), \quad u_x|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T], \\ (u_x + \alpha u)|_{x=a} &= \mu(t), \quad (u_x + \beta u)|_{x=b} = \nu(t), \quad t \in [0, T]. \end{aligned} \quad (7.34)$$

Kadangi lygtis yra sprendžiama stačiakampyje Q_T , tai patogu imti stačiakampi tinklą, kurio viršūnės yra tiesių

$$x = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N, \quad N = (b - a)/h,$$

$$t = jl, \quad j = 0, 1, 2, \dots, M, \quad M = T/l$$

sankirtos taškai. Taškus, kurie yra tiesėse $x = a, x = b$ ir $t = 0$ vadinsime kontūriniais, o likusius cilindro Q_T taškus – vidiniai. Jeigu taškas (i, j) yra vidinis cilindro Q_T taškas, tai (7.30) lygtį šiame taške keičiame (7.32) skirtumine lygtimi. Jeigu taškas (i, j) yra tiesėje $t = 0$, tai funkcijos u reikšmės taške $(i, 0)$ apibrėžiamos taip:

$$u_{i0} = \varphi_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

Kraštiniuose taškuose $x = a$ ir $x = b$ išvestinę u_x keičiame, atitinkamai, skirtu-

$$\frac{u_{1j} - u_{0j}}{h} \quad \text{ir} \quad \frac{u_{Nj} - u_{Nj-1}}{h}.$$

Tokių aproksimacijų paklaida yra $O(h)$. Padidinti išvestinės u_x aproksimacijos tikslumą galima lygiai taip kaip ir parabolinės lygties atveju.

¹Skirtingose intervalo (a, b) kraštiniose taškuose galima imti skirtinges kraštines sąlygas.

Taigi gavome tokią nagrinėjamo kraštinio uždavinio sprendimo schemą:

$$\begin{cases} \tilde{L}u_{ij} = f_{ij}, & i = 1, 2, \dots, N-1, j = 0, 1, \dots, M-1, \\ u_{i0} = \varphi_i, & i = 1, 2, \dots, N, \\ l_a u_{0j} = \mu_j, & l_b u_{Nj} = \nu_j, \quad j = 0, 1, \dots, M, \end{cases} \quad (7.35)$$

čia l_a ir l_b yra operatoriai, aproksimuojanties kraštines sąlygas taškuose a ir b (žr. 7.5 skyreli).


Norint, kad skirtuminių lygčių sistemos sprendinys būtų artimas nagrinėjamo uždavinio sprendiniui, čia, kaip ir parabolinės lygties atveju, tinklo žingsnių h ir l pasirinkti visiškai laisvai nagalima. Tuo lengvai galima įsitikinti nagrinėant Koši uždavinį

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{xx} &= 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u|_{t=0} &= \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Šiuo atveju bangavimo lygti keičiame skirtumine lygtimi

$$u_{ij+1} = 2u_{ij} - u_{1j-1} + \alpha u^2(u_{i+1j} - 2u_{ij} + u_{i-1j}), \quad \alpha = l/h.$$

Funkcijos u reikšmes taškuose (i, j) , $j = 0, 1$ randame iš pradinių sąlygų. Po to, iš skirtuminės lygties, randamos funkcijos u reikšmės taškuose (i, j) , $j = 2, 3, \dots$. Iš taško $P = (i, j)$ brėžiame du spindulius einančius per taškus $(i-1, j-1)$ ir $(i+1, j-1)$ iki susikirtimini su x ašimi taškuose A ir B . (žr. 7.11 pav.).



7.11 pav.

Sprendinio reikšmę u_{ij} nusako tinklo taškai esanti atkarpoje $[A, B]$. Bangavimo lygties charakteristikos yra tiesės $x \pm t = const$. Jos, eidamos per tašką P iškerta x ašyje atkarpa $[C, D]$. Iš dalinių išvestinių lygčių teorijos yra žinoma, kad bangavimo lygties sprendinį u taške (i, j) apibrėžia pradinės sąlygos duotos atkarpoje $[C, D]$. Jeigu $\alpha > 1$, tai atkarpa $[A, B]$ yra atkarpos $[C, D]$ viduje. Jeigu pradines sąlygas keisime tik atkarpose $[C, A]$ ir $[B, D]$, tai keisime bangavimo lygties sprendinio reikšmę taške P , tačiau nekeisime skirtuminės lygties reikšmės šiam taške. Vadinas, kai $\alpha > 1$, t.y. $l > h$ skirtuminių lygčių sistemos sprendinys gali ir nearėti į diferencialinės lygties sprendinį. Todėl sąlyga $\alpha \leq 1$ yra būtina, kad skirtuminės lygties sprendinys artėtų į diferencialinės lygties sprendinį.

P a s t a b a . Kitokias hiperbolinių lygčių (taip kaip ir elipsinių lygčių) skirtumines schemas galima gauti neapibrėžtų koeficientų metodu.

LITERATŪRA

- [1] Ambrazevičius A. – Matematinės fizikos lygtys. D. 1. Vilnius: "Aldorija", 1996. 380 p.
- [2] Axiezeris N. I. – Variacinio skaičiavimo paskaitos. Maskva: 1954. 248 p. rus.
- [3] Bibikovas J. N – Bendras paprastųjų diferencialinių lygčių kursas. Lenigradas: LGU, 1981, 232 p. rus.
- [4] Golokvosčius P. – Diferencialines lygtys. Vilnius: TEV, 2000, 512 p.
- [5] Kodingtonas A., Levinsonas N. – Paprastųjų diferencialinių lygčių teorija. - M.: I*L 1958. - 476p. rus.
- [6] Arnoldas V. – Matematiniai klasikinės mechanikos metodai. M.: Nauka, 1979 —???p.
- [7] Poluektovas R. A., Pichas J. A., Švitovas I. A. – Dinaminiai ekologinių sistemų modeliai. - L.: Gidrometeoizdat, 1980, 288 p. rus.
- [8] Kvedaras B., Sapagovas M. – Skaičiavimo metodai. Vilnius: "Mintis", 1974, 516 p.
- [9] Berezinas I.S., Židkovas N.P. – Skaičiavimo metodai. D. 2. Maskva: "Fiz-Mat", 1959. 620 p.
- [10] Samarskis A.A., Michailovas A.P. – Matematinis modeliavimas (idėjos, metodai, pavyzdžiai). Maskva, "FizMatLit" 1997. ??? p.